

v.z.w. ARABEL



ARABEL a.s.b.l.

NIEUWSBRIEF VAN DE
BELGISCHE ARACHNOLOGISCHE VERENIGING



FEUILLE DE CONTACT DE LA
SOCIÉTÉ ARACHNOLOGIQUE DE BELGIQUE

VOORZITTER / PRÉSIDENT :	Rop Bosmans Ooievaarstraat 98 9000 Gent
ONDERVOORZITTER / VICE-PRÉSIDENT :	Jan Bosselaers Rerum Novarumlaan 2 2340 Beerse
SECRETARIS / SECRÉTAIRE :	Rudy Jocqué Veeweidestraat 92, 3040 Huldenberg
PENNINGMEESTER / TRÉSORIER :	Johan Van Keer Bormstraat 204 bus 3 1880 Kapelle-op-den-Bos
WEBMASTER :	Arnaud Henrard Rue de Namur 69/2 1300 Wavre
EDUCATIEVE ACTIVITEITEN / ACTIVITÉS ÉDUCATIVES	Marc Alderweireldt Begoniastraat 5 9090 Melle
REDACTEUR NIEUWSBRIEF / REDACTEUR FEUILLE DE CONTACT	Léon Baert leopold I-plein 3A 8400 Oostende
BEHEERDER BEELDENBANK / ADMINISTRATEUR PHOTOOTHÈQUE	Koen van Keer Boomgaardstraat 79 2018 Antwerpen
BEHEERDER DATABANK / ADMINISTRATEUR BANQUE DE DONNEES	Frederik Hendrickx Hoekskenstraat 11 9070 Heusden
LIDGELD / COTISATION:	20 Euro
REKENING / COMPTE:	IBAN: BE65 0014 4419 4196 BIC: GEBABEBB Vermelding: "Lidgeld / cotisation ARABEL"

Geciteerd in / Cité dans : **Zoological Record.**

Leescommissie / Commission de lecture: Marc Alderweireldt, Léon Baert, Robert Bosmans, Arnaud Henrard, Rudy Jocqué, Kevin Lambeets, Isabelle Sauvage, Koen Van Keer.

Redactie / Rédaction : Léon Baert.

Vertalingen naar het Frans / Traductions en français: Léon Baert.

Vertalingen naar het Engels / Traductions en anglais: Rudy Jocqué.

Een herziene soortenlijst van de Belgische spinnen (Araneae)

Robert Bosmans* & Koen Van Keer**

*University Ghent, Terrestrial Ecology Unit
Ledeganckstraat 35, B-9000 Gent, Belgium

**Boomgaardstraat 79, B-2018 Antwerpen

Samenvatting

De auteurs geven een overzicht van de soorten die sinds de laatste catalogus van de spinnen van België BOSMANS (2009) als nieuw werden vermeld. Het aantal steeg van 703 soorten, waarvan 2 onvoldoende gedocumenteerd, naar 718, waarvan 1 onvoldoende gedocumenteerd. Het aantal waargenomen exotische spinnen nam sterk toe van 27 naar 34. Er wordt tevens een overzicht gegeven van alle wijzigingen in de arachnologische nomenclatuur sinds 2009. Ten slotte wordt een nieuwe soortenlijst voorgelegd.

Résumé

Les auteurs donnent un résumé des espèces nouvelles pour la faune de Belgique depuis le dernier catalogue de BOSMANS (2009). Le nombre d'espèces s'est élevé de 703, dont 2 insuffisamment documentées, jusqu'à 718, dont 1 insuffisamment documentée. Le nombre d'araignées exotiques observées a augmenté considérablement de 27 espèces à 34. Les auteurs donnent également un suivi de tous les changements nomenclatureaux à partir de 2009. Finalement, une nouvelle check-list de la faune aranéologique belge est présentée.

Summary

The authors present a survey of all species new to the Belgian fauna, since the last catalogue of BOSMANS (2009). The present number of species raised from 703, of which 2 were insufficiently documented, to 718 of which 1 is insufficiently documented. The number of exotic spiders found in Belgium grew considerably from 27 to 34. A survey of all nomenclatural changes since 2009 is given. Finally, a new checklist for the Belgian arachnological fauna is presented.

1. Inleiding

Het arachnologische onderzoek in de wereld en Europa staat niet stil. De verspreiding van de Europese soorten begint beter en beter gekend te worden en nog steeds worden, maar dan vooral in de Mediterrane regio, talrijke nieuwe soorten beschreven. In België worden bijna jaarlijks nog soorten voor de eerste keer waargenomen. Het gaat dan om zeldzame soorten die aangetroffen worden omdat voordien in de het geschikte habitat niet werd gezocht, om soorten die door de opwarming van de aarde op een natuurlijke manier hun areaal naar het noorden kunnen uitbreiden of ten slotte om soorten die door de sterk toegenomen wereldhandel en -transport in ons land terecht komen.

Deze laatste zijn al lang een punt van discussie of ze al of niet in een landelijke soortenlijst dienen te worden opgenomen. Het feit of spinnen zich bij ons al of niet kunnen voortplanten, binnenshuis of buitenshuis, wordt hier gehanteerd als criterium voor opname. Hierbij zijn ook de soorten die zich recent bij ons hebben gevestigd en neozone soorten worden genoemd. De overige worden exoten genoemd, en zijn in een aparte lijst opgenomen. Het is niet uitgesloten dat sommige van hen zich hier in de toekomst ook zullen inburgeren.

In het verleden werden reeds vier soortenlijsten van de Belgische spinnen gepubliceerd. KEKENBOSCH, BOSMANS & BAERT (1977), BOSMANS & MAELFAIT (1986), BOSMANS & VANUYTVEN (2001) en BOSMANS (2009). Het aantal soorten wordt getoond in Tabel 1.

Twee ervan waren onvoldoende gedocumenteerd, omdat ze slechts mondeling gemeld werden op een vergadering van de Belgische Arachnologische Vereniging of omdat er naamverwisseling mogelijk was met andere verwante soorten. Zeven jaar later wordt nu een nieuwe stand van zaken opgemaakt in de vorm van een overzichtslijst van de sindsdien nieuw aangetroffen soorten.

Tabel 1. Aantal soorten in catalogi van de Belgische spinnen.

	Aantal soorten
1. KEKENBOSCH, BOSMANS & BAERT (1977)	613
2. BOSMANS & MAELFAIT (1986)	600
3. BOSMANS & VANUYTVEN (2001)	679
4. BOSMANS (2009)	703
5. BOSMANS & VAN KEER (2017)	718

Ook het onderzoek naar onderlinge verwantschappen en het maken van revisies staat niet stil en dit geeft dikwijls aanleiding tot wijzigingen in de gangbare nomenclatuur. Het leek ons interessant om ook de wijzigingen sinds 2009 samen te vatten. De naamgeving is gebaseerd op de WORLD SPIDER CATALOG, 2017.

2. Nieuwe soorten voor België sinds Bosmans, 2009

2.1. Soorten die tot de inheemse fauna worden gerekend

Familie Agelenidae

***Coelotes atropos* (Walckenaer, 1830)(Britse bostrechtterspin)**

BOSMANS & VANUYTVEN (2001) stelden vast dat de oude Belgische citaties van BECKER (1882) als foute determinaties dienden te worden beschouwd, omdat alle Belgisch geverifieerd materiaal in werkelijkheid *Coelotes terrestris* (Wider, 1834) betrof. DE BAKKER *et al.* (2012) troffen te Wellin in de provincie Luxembourg nu toch exemplaren van *C. atropos* aan, zodat de soort opnieuw in de Belgische lijst kan worden opgenomen.

Familie Araneidae

***Zygiella montana* (C.L. Koch, 1834)(Bergsectorspin)**

De eerste waarneming van deze soort in België gebeurde te Ovifat in de provincie Luik. Ze werd door JANSEN (2010) gemeld onder de naam *Parazygiella montana*. Dit is een Midden-Europese soort die eerder op grotere hoogte voorkomt. Door verwarring met de verwante *Zygiella x-notata* (Clerck, 1757) wordt het voorkomen in België misschien onderschat.

WUNDERLICH beschreef in 2004 drie nieuwe genera voor soorten die vroeger in het genus *Zygiella* werden geplaatst: *Parazygiella* voor *Zygiella montana*, *Leviellus* voor *Zygiella kochi* (Thorell, 1870) en *Stroemiella* voor *Zygiella stroemi* (Thorell, 1870). In een uitgebreide, fylogenetische studie van de onderfamilie Zygiellinae door GREGORIČ *et al.* (2015) wordt het genus *Parazygiella* Wunderlich, 2004 in de synonymie van *Zygiella* F. O. Pickard-Cambridge, 1902 geplaatst, zodat de bij ons voorkomende soort opnieuw als *Zygiella montana* moet vermeld worden. Verder beschouwen deze auteurs *Leviellus* en *Stroemiella* als synoniemen (zie verder onder *Leviellus stroemi*).

Familie Dictynidae

***Emblyna brevidens* (Kulczyński, 1897)**

Deze soort werd voor het eerst in België aangetroffen in de provincie Limburg in het natuurreserveaat De Maten te Genk (OGER, 2014). Het is een Centraal- en Midden-Europese soort die nog niet in Nederland werd waargenomen.

Familie Eresidae

***Eresus sandaliatus* (Martini & Goeze, 1778)**

De enige gepubliceerde waarneming van een *Eresus* soort is die van BECKER (1881, 1896) als *Eresus niger*. Dit materiaal is echter niet bewaard, zodat er niet met zekerheid kon worden vastgesteld of het *Eresus kollari* dan wel *E. sandaliatus* betrof. Beide soorten kunnen namelijk in België voorkomen. Zowel PEETERS & VAN KEER (2009), als ŘEZÁČ *et al.* (2008) gaan er echter vanuit dat de door Becker gemelde soort *Eresus kollari* betrof. VAN KEER *et al.* (2008) konden de aanwezigheid van *Eresus sandaliatus* bevestigen.

Familie Gnaphosidae

***Scotophaeus quadripunctatus* (Linnaeus, 1758)**

DE KONINCK (2010) citeerde deze soort voor het eerst in België. Hij trof een enkel exemplaar aan in het postsorteercentrum van Turnhout. *Scotophaeus quadripunctatus* komt voor in heel Europa maar wordt zelden aangetroffen.

Familie Linyphiidae

***Abacoproeces saltuum* (L. Koch, 1872)**

VAN KEER & JACOBS (2015) vermelden deze soort als nieuw voor België. Ze troffen ze aan in het natuurreservaat van de Kalmthoutse Heide.

***Oreonetides quadridentatus* (Wunderlich, 1972)**

BAERT & KEKENBOSCH (2012) troffen deze soort aan te Treignes in de provincie Namur. Ze is gekend van Duitsland, Oostenrijk, het Groothertogdom Luxemburg en de Franse Pyreneeën en is nieuw voor België.

***Porrhomma cambridgei* Merrett, 1994**

VAN KEER *et al.* (2016) troffen deze soort aan in het natuurreservaat van het Zwin (West-Vlaanderen) en in de vallei van de Viroin (Namur). Tot nu toe werd deze soort aangetroffen in Groot Brittannië, Nederland, Duitsland, Tsjechië, Zwitserland en Italië.

Familie Philodromidae

***Philodromus fuscomarginatus* (De Geer, 1778)**

Op de ARABEL-vergadering van 26 september 2015 meldde Johan Van Keer dat deze soort door Van der Krieken in de Viroin werd aangetroffen [Nieuwsbr. Belg. Arachnol. Ver. (2015): 30(3), 158]. De eigenlijke publicatie is in voorbereiding.

Familie Salticidae

***Evarcha michailovi* Logunov, 1992**

ALDERWEIRELDT & JANSSEN (2016) onderzochten al het geciteerde Belgisch materiaal van *Evarcha laetabunda* (C. Koch, 1846) et dit bleek allemaal verkeerd gedetermineerd te zijn. *Evarcha laetabunda* wordt van de lijst van België geschrapt en vervangen door *E. michailovi*.

***Sibianor larae* Logunov, 2001**

VAN KEER *et al.* (2010) vermelden deze soort voor het eerst in België van de provincie Namur. Voorheen werd ze verward met *Sibianor aurocinctus* (Ohlert, 1865). Nazicht van een aantal collecties bracht aan het licht dat de soort wel vaker in België werd aangetroffen [zie o. a. verslag ARABEL-vergadering in Nieuwsbr. Belg. Arachnol. Ver. (2010), 25(2): 184-185].

Familie Theridiidae

***Episinus maculipes* Cavanna, 1876**

HENRARD (2010) vermeldt een koppeltje van deze soort op de kliffen van de "Rochers de Freyr" langs de Maas te Hastière (prov. Namur). Het is eerder een zuidelijke soort die in Frankrijk tot Fontainebleau voorkomt maar ook Zuid Engeland al bereikt heeft. De vangst illustreert de toename van zuidelijke soorten in België.

***Theridion asopi* Vanuytven, 2014**

Na lang wachten beschreef VANUYTVEN (2014) eindelijk deze kogelspin die nieuw is voor België en de wereld. Voorheen werden nog maar 2 soorten als nieuw beschreven van België: *Diplocephalus caecus* Denis, 1952 en *Pseudomaro aenigmaticus* Denis, 1966. *Theridion asopi* komt voor in België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Zwitserland en Italië.

Familie Thomisidae

***Ozyptila rauda* (Simon, 1875)**

In het bekende determinatieboek "Thirion Spinnengids" vermeldde ROBERTS (1998) dat de soort in Oost-België zou voorkomen. Tot nu toe werden echter geen waarnemingen voor ons land gepubliceerd (BOSMANS, 2009). Het voorkomen in België kan nu bevestigd worden door de publicatie van JANSSEN (2013), waarin de soort wordt vermeld van Meeuwen-Gruitrode in de provincie Limburg.

***Ozyptila westringi* (Thorell, 1873)**

De aanwezigheid van deze soort in België werd gemeld door Léon Baert van een heideveld in de buurt van Brugge [*Nieuwsbr. Belg. Arachnol. Ver.* (2016): 31(1)]: 51. Gedetailleerde data van deze vondst moeten nog gepubliceerd worden.

2.2. Soorten die werden ingevoerd en waarvan is vastgesteld dat ze zich bij ons voortplanten

Familie Oecobiidae

***Oecobius amboseli* Shear & Benoit, 1974**

Het areaal van deze soort omvat Uganda, Kenya, Tanzania, Ethiopië en Egypte. Een populatie komt ook voor in de kelders van het Afrikamuseum in Tervuren en ze werd ook aangetroffen in een warenhuis te Duffel (HENRARD *et al.*, 2014). Een introductie vanuit Centraal-Afrika naar Tervuren kan verondersteld worden. Ook in Nederland en Denemarken werd ze geïntroduceerd (IJLAND, 2013; TOFT & WUNDERLICH, 2012).

2.3. Soorten die werden ingevoerd en waarvan (voorlopig) niet is vastgesteld dat ze zich bij ons voortplanten

Familie Agelenidae

***Eratigena fuesslini* (Pavesi, 1873)**

VAN DER KRIEKEN (2011) trof rond zijn buitenverblijf in Pétigny in de provincie Namur een wijfje aan van *Tegenaria fuesslini*. Volgens BOLZERN *et al.* (2013) komt de soort met zekerheid voor in Portugal, Spanje, Zuid Frankrijk, Italië en Zwitserland, en mogelijk ook in Duitsland, Kroatië en Oekraïne (onbevestigde waarnemingen). VAN DER KRIEKEN (op. cit.) oppert zelf dat het exemplaar mogelijk meegereisd is vanuit Spanje. Tenzij in de toekomst meerdere exemplaren worden gevonden wordt de soort nu als ingevoerd beschouwd.

Familie Amaurobiidae

***Amaurobius erberi* (Keyserling, 1863)**

Een volwassen mannelijk exemplaar van deze soort werd in januari 2013 in Gent gevonden door Kris Decler en gemeld via de meldingssite Waarnemingen.be van Natuurpunt (<https://waarnemingen.be/waarneming/view/73317370>). De spin werd tussen een houtstapel aangetroffen, die meegebracht werd uit West-Vlaamse natuurreservaten. De determinatie werd bevestigd door Johan Van Keer, die het exemplaar in zijn collectie bewaart. De soort is zeer algemeen in Mediterraan Europa en wordt meer en meer noordelijk aangetroffen.

***Callobius nomeus* (Chamberlin, 1919)**

VAN KEER (2014) [verslag in *Nieuwsbr. Belg. Arachnol. Ver.* (2014), 29(3): 92] vermeldt de vondst van de soort *Callobius nomeus* in een container te Duffel op 11 april 2014. De soort is afkomstig uit Noord-Amerika.

Familie Ctenidae

***Phoneutria boliviensis* (F. O. Pickard-Cambridge, 1897)**

Van deze Midden- en Zuid-Amerikaanse soort werd een volwassen vrouwelijk exemplaar in versuifte staat aangetroffen in een Deurnese supermarkt [*Nieuwsbr. Belg. Arachnol. Ver.* (2015), 30(1): 54].

Familie Eutichuridae

***Cheiracanthium furculatum* Karsch, 1879**

BOSSELAERS (2013) trof een volwassen wijfje van deze soort aan in een doosje met druiven afkomstig van een lokale supermarkt. De soort is wijd verbreid in subtropisch Afrika en is er verantwoordelijk voor 70% van de geregistreerde incidenten met spinnenbeten.

Familie Hexathelidae

***Macrothele calpeiana* (Walckenaer, 1805)**

Een levend exemplaar van deze soort werd aangetroffen in Esen, Diksmuide in de provincie West-Vlaanderen (VAN KEER, 2010). Léon Baert meldt de soort tijdens de ARABEL-vergadering van 26 april 2014 [verslag in *Nieuwsbr. Belg. Arachnol. Ver.* (2014), 29(1,2): 47]. Verschillende exemplaren zijn aangetroffen in een plantenkwekerij in Mons. Zij werden blijkbaar ingevoerd met olijfbomen uit Andalusië.

Familie Linyphiidae

***Erigone dentosa* (O. P.-Cambridge, 1894)**

KEKENBOSCH & BAERT (2013) troffen een mannetje *Erigone* aan in bodemvallen in het stedelijke kerkhof van Anderlecht (Brussel). De palpen waren uitgestulpt, maar toch kon de soort worden gedetermineerd als *Erigone dentosa*, gekend van Noord-Amerika.

Familie Philodromidae

***Thanatus vulgaris* Simon, 1870)**

Kekenbosch (2008) citeert de vondst van een vrouwtje van deze soort te Ganshoren (Brussel). Ze werd aangetroffen in een doos met krekels, verkocht als voer voor reptielen. *Thanatus vulgaris* werd al in Frankrijk en Groot-Brittannië aangetroffen, maar nog niet in België, Nederland of Luxemburg.

Familie Theraphosidae

***Grammostola rosea* (Walckenaer, 1837)**

Deze Zuid Amerikaanse vogelspin werd aangetroffen in de haven van Antwerpen (VAN KEER, 2010, sub *Grammostola cala*).

***Phormictopus cancerides* (Latreille, 1806)**

Deze Midden- en Zuid Amerikaanse vogelspin werd aangetroffen in de haven van Antwerpen (VAN KEER, 2010).

Familie Theridiidae

***Coleosoma floridanum* Banks, 1900**

Johan Van Keer meldt de vondst van deze soort in de Antwerpse Zoo in het reptielenpaviljoen [verslag in *Nieuwsbr. Belg. Arachnol. Ver.* (2014), 29(3): 92]. In verschillende Europese landen werd deze soort al in tropische serres aangetroffen en ze kan er zich ook voortplanten (zie o. a. VAN HELSDINGEN, 1995; BLICK *et al.*, 2005).

***Steatoda nobilis* (Thorell, 1875)**

VAN KEER (2010) meldt de vondst van deze soort in een tuincentrum te Rijkevorsel en dit op 21 november 2009. *Steatoda nobilis* is een Mediterrane soort die werd geïntroduceerd in Noord- en Zuid-Amerika. Het exemplaar uit Rijkevorsel zat in een lading uit China (!). Mogelijk kan ze zich in de toekomst ook bij ons definitief vestigen.

3. Voorgestelde naamwijzigingen sinds Bosmans, 2009

Dat de naamgeving van soorten verandert, is voor velen een vervelende zaak. Goed gekende soorten krijgen een vreemde, heel andere naam en het vraagt gewenning om zich daaraan aan te passen. Toch getuigen deze naamwijzigingen van een steeds betere kennis van de verwantschappen tussen spinnen en zijn ze een noodzakelijk kwaad. Sinds de laatste versie van de catalogus van de spinnen van België

(BOSMANS, 2009) publiceerde Norman Platnick verschillende nieuwe versies van zijn "World Spider Catalog" en werd dit project overgenomen door het team van Wolfgang Nentwig van de Universiteit in Bern in Zwitserland. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende nieuwe wijzigingen, die in de loop van de jaren 2009-2017 zijn doorgevoerd (WORLD SPIDER CATALOG, 2017).

Familie Agelenidae

Er zijn talrijke veranderingen bij de Agelenidae, die niet altijd evident lijken.

Genus *Coelotes* Blackwall, 1841

MILLER *et al.* (2010) plaatsten de genera *Coelotes* en *Eurocoelotes* opnieuw in de Agelenidae, waarin ze ook vroeger werden geklasseerd.

Genus *Eratigena* Bolzern, Burckhardt & Hänggi, 2013

BOLZERN *et al.* (2013) reviseerden het genus *Tegenaria* en splitsten het op in meerdere genera, waarvan in België het genus *Eratigena* van belang is. De volgende soorten werden getransfereerd: *Eratigena agrestis* (Walckenaer, 1802), *Eratigena atrica* (C. L. Koch, 1843), *Eratigena picta* (Simon, 1870) en *Eratigena saeva* (Blackwall, 1844).

***Eratigena atrica* C. L. Koch, 1843 & *Eratigena saeva* Blackwall, 1844**

BOLZERN *et al.* (2013) beschouwen *Tegenaria saeva* Blackwall, 1844 (nu *Eratigena s.*) als een junior synoniem van *T. atrica* C. L. Koch, 1843. *Tegenaria saeva* zou dus van de Belgische lijst geschrapt moeten worden. Tijdens de ARABEL-vergadering van 14 mei 2016 werd hierover gediscussieerd. De aanwezige leden beslisten om beide namen te behouden, omdat bij ons twee duidelijk te onderscheiden 'vormen' voorkomen. Wanneer beiden niet meer als dusdanig zouden worden benoemd, kan mogelijk informatie verloren gaan.

***Inermocoelotes inermis* (L. Koch, 1855)**

Volgens MIKHAILOV (2010) is het genus *Eurocoelotes* Wang, 2002 een junior synoniem van *Inermocoelotes* Ovtchinnikov, 1999. De soort *Eurocoelotes inermis* (L. Koch) wordt daarom naar het genus *Inermocoelotes* verplaatst.

***Tegenaria ferruginea* (Panzer, 1804), *T. pagana* C.L. Koch, 1840 en *T. silvestris* L. Koch, 1872**

Deze soorten waren naar het genus *Malthonica* overgeplaatst, maar BOLZERN *et al.* (2013) maakten deze transfer ongedaan.

Familie Araneidae

Zoals reeds gemeld onder *Zygiella montana* (zie hoger) werd het genus *Stroemiellus* Wunderlich, 2004 door GREGORIČ *et al.* (2015) in de synonymie van *Leviellus* geplaatst. De soort *Stroemiellus stroemi* wordt dus nu *Leviellus stroemi* genoemd.

[Familie Corinnidae]

In een uitgebreide studie over de morfologie en de phylogenie van de Dionychae (spinnen met twee klauwen) stelde RAMÍREZ (2014) een aantal belangrijke wijzigingen voor die betrekking hebben op de nomenclatuur van de Belgische spinnen. De familie Corinnidae werd namelijk opgesplitst in drie: Corinnidae, Phrurolithidae en Trachelidae. Van de Belgische soorten wordt enerzijds het genus *Phrurolithus* voortaan in de nieuwe familie Phrurolithidae geklasseerd, anderzijds wordt het genus *Cetonana* in de nieuwe familie Trachelidae geplaatst. Vertegenwoordigers van de Corinnidae komen niet meer in België voor.

Familie Dictynidae

***Brigittea civica* (Lucas, 1850) & *B. latens* (Fabricus, 1775)**

Reeds in 1967 stelde Lehtinen voor een aantal Dictynidae het genus *Brigittea* voor (LEHTINEN, 1967). Deze stelling werd lang niet gevolgd maar wordt nu wel algemeen aanvaard.

Familie Gnaphosidae

***Arboricaria subopaca* (Westring, 1861)**

Bosmans, in BOSMANS & BLICK (2000) creëerde voor een aantal boombewonende *Micaria* -soorten het genus *Arboricaria*. Dit werd echter door de vroegere specialist ter zake niet aanvaard. Ten onrechte blijkt nu, want zopas bracht MIKHAILOV (2016) bewijzen aan dat er voldoende morfologische verschillen zijn met het genus *Micaria* om *Arboricaria* als geldig te aanvaarden.

Familie Hahniidae

***Iberina candida* (Simon, 1875) & *I. montana* (Blackwall, 1841)**

Het genus *Iberina* werd in 1875 door Simon gecreëerd voor een blinde soort uit de Pyreneeën: *Iberina mazarredoi*. LEHTINEN (1967) stelde dat ook de soorten *Hahnina candida* en *H. montana* op genitaal-morfologische basis naar dit genus zouden moeten worden overgeplaatst. In een revisie van Europese Hahniidae verdedigde ook LEDOUX (2014) met succes deze stelling, zodat de klassering in het genus *Iberina* nu wel aanvaard wordt.

Familie Linyphiidae

Genus *Agyneta* Hull, 1911

Het genus *Meioneta* verschilt enkel van *Agyneta* door het ontbreken van een trichobothrium op metatarsus IV bij *Meioneta*. Reeds in 1973 stelde SAARISTO (1973) een synonymie tussen de twee genera voor, omdat dit geen gangbaar criterium is om genera te onderscheiden. Dit werd echter tegengesproken door WUNDERLICH (1973). Na een uitgebreide studie door DUPÉRRÉ (2013) wordt de synonymie toch algemeen aanvaard en wordt *Meioneta* Hull, 1920 een junior synoniem van *Agyneta* Hull, 1911. De volgende soorten worden daardoor van *Meioneta* naar *Agyneta* getransfereerd: *Agyneta affinis* (Kulczyński), *A. fuscipalpa* (C. L. Koch), *Agyneta innotabilis* (O.P.-Cambridge), *A. mollis* (O.P.-Cambridge), *A. rurestris* (C. L. Koch) en *A. simplicatarsis* (Simon).

***Centromerus brevipalpus* (Menge, 1886)**

De voormalige naam *Centromerus brevivulvatus* Dahl, 1912 dient vervangen te worden door de veel oudere beschikbare naam *C. brevipalpus* (Menge, 1886).

***Styloctetor compar* (Westring, 1861)**

BREITLING *et al.* (2015) deden een uitgebreid onderzoek naar zogenaamde “fantoomspinnen”, spinnen die in het verleden beschreven zijn en wel een naam hebben maar waarvan niemand weet welke soorten het feitelijk zijn. Zo onderzochten ze het typemateriaal van *Erigone compar* Westring, 1861, in catalogi geklasseerd als *Gongyliidiellum compar*. Ze ontdekten dat het typemateriaal niets anders was dan *Styloctetor stativus* (Simon, 1881). De oudst beschreven soort heeft prioriteit, zodat de naam van deze soort *Styloctetor compar* (Westring) wordt.

Familie Lycosidae

***Alopecosa farinosa* (Herman, 1872)**

BREITLING *et al.* (2016) toonden aan dat de naam *Alopecosa accentuata* (Latreille, 1817) dient vervangen worden door *A. farinosa* (Herman, 1879). Ze verklaren *Alopecosa accentuata* een nomen dubium.

***Pardosa purbeckensis* F.O.P.-Cambridge, 1895**

Tot nu toe werd *Pardosa purbeckensis* slechts als een ondersoort of een variëteit van *Pardosa agrestis* (Westring, 1861) beschouwd. Uit het onderzoek van CHIARLE *et al.* (2013) blijkt echter dat het twee soorten betreft die een duidelijk verschillend baltsgedrag vertonen. Naast de morfologische verschillen van bv. de sterk behaarde metatarsi van het eerste paar poten is dit voldoende om *Pardosa purbeckensis* als volwaardige soort te beschouwen.

Piratula Roewer, 1960

Het genus *Piratula* werd reeds in 1960 voorgesteld voor een aantal *Pirata* soorten (ROEWER, 1960), maar dit werd toen niet aanvaard. OMELKO *et al.* (2011) vonden voldoende aanwijzingen om het genus toch te valideren. De Belgische soorten van dit genus zijn *Pirata hygrophila* Thorell, *P. knorri* (Scopoli) en *P. latitans* (Blackwall). BLICK *et al.* (2016) voegden hieraan om genitaal-morfologische redenen nog *Pirata uliginosus* (Thorell) toe. De vroegere soorten van het genus *Pirata* zijn dus nu *Pirata piraticus* (Clerck), *Pirata piscatorius* (Clerck), *Pirata tenuitarsis* Simon, *Piratula hygrophila* (Thorell), *Piratula knorri* (Scopoli), *Piratula latitans* (Blackwall) en *Piratula uliginosa* (Thorell).

[Familie Miturgidae]

In een uitgebreide studie over de morfologie en de phylogenie van de Dionychae (spinnen met twee klauwen) stelde RAMÍREZ (2014) een aantal wijzigingen voor die belangrijk zijn voor de nomenclatuur van de Belgische spinnen. De soorten van het geslacht *Cheiracanthium* worden voortaan in de familie Eutichuridae geklasseerd. De soorten van het geslacht *Zora* worden getransfereerd naar de de Miturgidae.

Familie Philodromidae

In een uitgebreide studie van de krabspinnen van Noord Amerika stelde SCHICK (1965) het nieuwe genus *Rhyssodromus* voor o. a. de bij ons ook voorkomende soorten *Philodromus fallax* (Sundevall, 1833) en *P. histrio* (Latreille, 1819). Deze moeten nu als *Rhyssodromus fallax* en *R. histrio* geciteerd worden.

Familie Phrurolithidae

De familie Phrurolithidae werd reeds in 1892 door Banks als aparte familie voorgesteld (BANKS, 1892), maar niet algemeen aanvaard. In dezelfde studie die bij de Miturgidae wordt vermeld, revalideert RAMÍREZ (2014) de familie. In België maken de soorten *Phrurolithus festivus* (C. L. Koch, 1835) en *P. minimus* C. L. Koch, 1839 voortaan deel uit van de aparte familie van de Phrurolithidae.

Familie Salticidae

Sitticus Simon, 1901

PRÓSZYŃSKI (2016) creëerde voor de soort *Sitticus pubescens* het genus *Sittipub*, zodat de soort als *Sittipub pubescens* moet geciteerd worden.

Een soortgelijke ingreep gebeurde voor de soorten *Sitticus floricola* en *Sitticus caricis*, die nu *Sittiflor floricola* (C.L. Koch, 1837) en *Sittiflor caricis* (Westring, 1861) heten.

Dezelfde auteur verplaatste *Sitticus distinguendus* en *Sitticus saltator* naar het genus *Attulus*, waardoor nu naar de soorten moet verwezen worden als *Attulus distinguendus* (Simon, 1868) en *Attulus saltator* (O.P. Cambridge, 1868).

Familie Theridiidae

Anelosimus pulchellus (Walckenaer, 1802) en A. vittatus (C. L. Koch, 1834)

In de vorige catalogus (BOSMANS, 2009) werden deze twee soorten om zeer complexe redenen overgeplaatst van *Anelosimus* naar het nieuwe genus *Seycellocesa*. In de laatste versie van de WORLD SPIDER CATALOG (2017) wordt dit niet meer aanvaard.

Lasaeola coracina (C. L. Koch, 1838)

WUNDERLICH (2015) verplaatste deze soort van *Dipoena* naar *Lasaeola*. Alhoewel dit niet voldoende wordt geargumenteed, wordt dit in de WORLD SPIDER CATALOG (2017) aanvaard.

Familie Trachelidae

De soort *Cetonana laticeps* (Canestrini, 1868) wordt voortaan in de nieuwe familie Trachelidae geplaatst (RAMÍREZ, 2014). Dit is dus een nieuwe familie voor de Belgische fauna.

[Familie Zoridae]

De familie Zoridae F. O. Pickard-Cambridge, 1893 wordt door RAMÍREZ (2014) als een junior synoniem van de familie Miturgidae Simon, 1886 beschouwd. De soorten van het genus *Zora* worden dus nu in de familie Miturgidae geklasseerd.

4. Bespreking

In de laatste versie van de catalogus van de Belgische spinnen, vermeldt BOSMANS (2009) 701 soorten, waarvan 2 “vermoedelijk voorkomend (wegens onvoldoende bewijsmateriaal).


Van de “vermoedelijk voorkomende soorten” is er ondertussen één waarvan verifieerbare gegevens zijn gepubliceerd: *Ozyptila rauda* (JANSSEN 2013). Van *Philodromus buchari* Kubcová, 2004 zijn er nog steeds geen verdere gegevens gepubliceerd.

Sinds 2009 werden 13 nieuwe soorten toegevoegd aan de lijst van de Belgische spinnen:

Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872)
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830)
Emblyna brevidens (Kulczyński, 1897)
Episinus maculipes Cavanaugh, 1876
Oreonetides quadridentatus (Wunderlich, 1972)
Ozyptila rauda (Simon, 1875)
Ozyptila westringi (Thorell, 1873)
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778)
Porrhomma cambridgei Merrett, 1994
Scotophaeus quadripunctatum (Linnaeus, 1758)
Sibianor larae Logunov, 2001
Theridion asopi Vanuytven, 2014
Zygiella montana (C.L. Koch, 1834)

Het actuele aantal Belgische spinnen bedraagt nu 718 soorten. Twaalf hiervan kwamen in België oorspronkelijk niet voor, maar planten zich nu wel degelijk hier voort (=exoten die zich mogelijk vestigen in België). Eén soort (*Philodromus buchari*) is nog steeds onvoldoende gedocumenteerd.

Figuur 2. Toename van het aantal aangetroffen soorten spinnen in België.



Het aantal ingevoerde soorten dat zich bij ons niet voortplant nam opnieuw toe en steeg van 27 naar 34. Het is goed mogelijk dat een aantal hiervan zich alsnog aan het Belgische klimaat zal aanpassen. De meest recente lijsten worden gegeven in appendix 1 en 2, met respectievelijk een lijst van de in België voorkomende families en soorten.

Dankwoord

Johan Van Keer en Pierre Oger worden bedankt voor het nalezen van deze nieuwe soortenlijst.

Geciteerde werken

- ALDERWEIRELDT, M. & JANSSEN, M., 2016. The occurrence of *Evarcha michaelovi* Logunov, 1992 in Belgium, replacing *Evarcha laetabunda* (C.L. Koch, 1846) on the Belgian spider checklist. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 31: 115-118.
- BAERT, L. & KEKENBOSCH, R., 2012. *Oreonetides quadridentatus* (Wunderlich, 1972) (Araneae: Linyphiidae, Linyphiinae), espèce nouvelle pour l'aranéofaune belge. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 27: 43-46.
- BANKS, N., 1892. A classification of North American spiders. *The Canadian Entomologist*, 24: 88-97.
- BECKER, L., 1881. Communications Arachnologiques. Exploration de la vallée de l'Ourthe. Espèces nouvelles pour la faune de Belgique. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 25: CLI-CLIII.
- BECKER, L., 1882. Les Arachnides de Belgique. I. *Annales du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique*, 10: 1-246.
- BECKER, L., 1896. Les arachnides de Belgique. III. *Annales du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique*, 12: 1-378.
- BLICK, T., HAENGGI, A. & WITTENBERG, R., 2005. 5 Spiders and Allies - Arachnida, in: Wittenberg, R. (ed.) (2005) An inventory of alien species and their threat to biodiversity and economy in Switzerland. *CABI Bioscience Switzerland Centre report to the Swiss Agency for Environment, Forests and Landscape*, 416 pp.
- BLICK, T., FINCH, O.-D., HARMS, K. H., KIECHLE, J., KIELHORN, K.-H., KREUELS, M., MALTEN, A., MARTIN, D., MUSTER, C., NÄHRIG, D., PLATEN, R., RÖDEL, I., SCHEIDLER, M., STUMPF, H. & TOLKE, D., 2016. Rote Liste und Gesamtartenliste der Spinnen (Arachnida: Araneae) Deutschlands. 3. Fassung, Stand April 2008, einzelne Änderungen und Nachträge bis August 2015. *Naturschutz und Biologische Vielfalt*, 70(4): 383-510.
- BOLZERN, A., BURCKHARDT, D. & HÄNGGI, A., 2013. Phylogeny and taxonomy of European funnel-web spiders of the *Tegenaria-Malthonica* complex (Araneae: Agelenidae) based upon morphological and molecular data. *Zoological Journal of the Linnean Society*, 168: 723-848.
- BOSMANS, R., 2009. Een herziene soortenlijst van de Belgische spinnen (Araneae). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 24: 33-58.
- BOSMANS, R. & BLICK, T., 2000. Contribution to the knowledge of the genus *Micaria* in the West-palearctic region, with description of the new genus *Arboricaria* and three new species (Araneae Gnaphosidae). *Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova*, 78: 443-476.
- BOSMANS, R. & MAELFAIT, J.-P., 1986. Herziene soortenlijst van de Belgische spinnen. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 3: 9-29.
- BOSMANS, R. & VANUYTVEN, H., 2001. Een herziene soortenlijst van de Belgische Spinnen (Araneae). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 16: 44-80.
- BOSSELAERS, J., 2013. An alien in the grapes: a potentially aggressive African spider imported into Belgium. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 28: 22-28.
- BREITLING, R., LEMKE, M., BAUER, T., HOHNER, M., GRABOLLE, A. & BLICK, T., 2015. Phantom spiders: notes on dubious spider species from Europe. *Arachnologische Mitteilungen*, 50: 65-80.
- BREITLING, R., BAUER, T., SCHÄFER, M., MORANO, E., BARRIENTOS, J. A. & BLICK, T., 2016. Phantom spiders 2: More notes on dubious spider species from Europe. *Arachnologische Mitteilungen/Arachnology Letters*, 52: 50-77.
- CHIARLE, A., KRONESTEDT, T. & ISAIA, M., 2013. Courtship behavior in European species of the genus *Pardosa* (Araneae, Lycosidae). *Journal of Arachnology*, 41(2): 108-125.

- DE BAKKER, D., VERSTEIRT, V. & BAERT, L., 2012. Patience rewarded: the presence in Belgium of *Coelotes atropos* (Walckenaer, 1830) (Araneae: Agelenidae) finally confirmed. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 27: 27-30.
- DE KONINCK, H., 2010. *Scotophaeus quadripunctatus* (Linnaeus, 1758), nieuw voor de Belgische spinnenfauna (Araneae: Gnaphosidae). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 25: 50-51.
- DENIS, J., 1945. Sur quelques *Theridion* appartenant à la faune de France. *Bulletin de la Société Entomologique de France*, 49(1944): 111-117.
- DUPÉRRÉ, N., 2013. Taxonomic revision of the spider genera *Agyneta* and *Tennesseelum* (Araneae, Linyphiidae) of North America north of Mexico with a study of the embolic division within Micronetinae sensu Saaristo & Tanasevitch 1996. *Zootaxa*, 3674: 1-189.
- GREGORIČ, M., AGNARSSON, I., BLACKLEDGE, T. A. & KUNTNER, M., 2015. Phylogenetic position and composition of Zygiellinae and *Caerostris*, with new insight into orb-web evolution and gigantism. *Zoological Journal of the Linnean Society*, 175: 225-243.
- HENRARD, A., 2010. *Episinus maculipes* Cavanna, 1876 (Araneae; Theridiidae), new to the Belgian arachnofauna. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 25: 120-123.
- HENRARD, A., VAN KEER, J. & JOCQUÉ, R., 2014. On the spider species *Oecobius amboseli* Shear & Benoit, 1974 (Araneae; Oecobiidae) newly found in Belgium and Rwanda. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 29: 1-8.
- IJLAND, S., 2013. *Oecobius amboseli* Shear & Benoit, 1974 (Araneae, Oecobiidae) found in the Netherlands and Ethiopia. *Spined, Nieuwsbrief Spinnenwerkgroep Nederland*, 33: 39-40.
- JANSEN, L., 2010. Eerste waarneming van *Parazygiella montana* (C. L. Koch, 1834) in België. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 25: 44-45.
- JANSSEN, M., 2013. Over enkele zeldzame spinnen in Vlaanderen en België. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 28: 29-31.
- KEKENBOSCH, R., 2008. Captures d'*Hasarius adansoni* (Audouin, 1826) et de *Thanatus vulgaris* (Simon, 1870). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 23 (1): 26-27.
- KEKENBOSCH, J., BOSMANS, R. & BAERT, L., 1977. Soortenlijst der Belgische Spinnen. *Studiedocumenten van het koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen*, 11: 1-36.
- KEKENBOSCH, R. & BAERT, L., 2013. Découverte d'*Erigone dentosa* (O.P.-Cambridge, 1894) (Araneae: Linyphiidae, Erigoninae) en Belgique. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 28: 32-34.
- LEDoux, J.-C., 2014. Les Hahniidae de la faune française (Araneae). *Revue Arachnologique*, (2) 1: 29-40
- LEHTINEN, P. T., 1967. Classification of the cribellate spiders and some allied families, with notes on the evolution of the suborder Araneomorpha. *Annales Zoologici Fennici*, 4: 199-468.
- MILLER, J. A., GRISWOLD, C. E. & HADDAD, C. R., 2010. Taxonomic revision of the spider family Penestomidae (Araneae, Entelegynae). *Zootaxa*, 2534: 1-3.
- MIKHAILOV, K. G., 2010. *Inermocoelotes* Ovtshinnikov, 1999, a valid genus (Aranei: Amaurobiidae: Coelotinae). *Arthropoda Selecta*, 19: 101-102.
- MIKHAILOV, K. G., 2016. On the spider genus *Arboricaria* with the description of a new species (Araneae, Gnaphosidae). *ZooKeys*, 558: 153-169.
- OGER, P., 2014. First record of *Emblyna brevidens* (Kulczyński, 1897) (Araneae: Dictynidae) for Belgium. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 29(3): 60-64.
- OMELKO, M. M., MARUSIK, Y. M. & KOPONEN, S., 2011. A survey of the east Palearctic Lycosidae (Aranei). 8. The genera *Pirata* Sundevall, 1833 and *Piratula* Roewer, 1960 in the Russian Far East. *Arthropoda Selecta*, 20: 195-232.
- PEETERS, L. & VAN KEER, K., 2009. Aanwezigheid van *Eresus sandaliatus* (Martini & Goeze, 1778) (Araneae: Eresidae) in België. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 24(1-3): 153-154.
- PRÓSZYŃSKI, J., 2016. Delimitation and description of 19 new genera, a subgenus and a species of Salticidae (Araneae) of the world. *Ecologica Montenegrina*, 7: 4-32.
- RAMÍREZ, M. J., 2014. The morphology and phylogeny of dionychan spiders (Araneae: Araneomorphae). *Bulletin of the American Museum of Natural History*, 390: 1-374.
- ŘEZÁČ, M., PEKAR, S. & JOHANNESSEN J., 2008. Taxonomic review and phylogenetic analysis of central European *Eresus* species (Araneae: Eresidae). *Zoologica Scripta*, 37:263-287.

- ROBERTS, M. J., 1998. *Spinnengids*. Tirion, Baarn, Netherlands, 397 pp.
- ROEWER, C. F., 1960. Solifugen und Opilioniden - Araneae Orthognathae, Haplogynae und Entelegynae (Contribution à l'étude de la faune d'Afghanistan 23). *Göteborgs Kungliga Vetenskaps och Vitterhets Samhälles Handlingar*, 8(7): 1-53.
- SAARISTO, M. I., 1973. Taxonomical analysis of the type-species of *Agyneta*, *Anomalaria*, *Meioneta*, *Aprolagus*, and *Syedrula* (Araneae, Linyphiidae). *Annales Zoologici Fennici*, 10: 451-466.
- SCHICK, R. X., 1965. The crab spiders of California (Araneae, Thomisidae). *Bulletin of the American Museum of Natural History*, 129: 1-180.
- TOFT, S. & WUNDERLICH, J., 2012. *Oecobius amboseli* Shear & Benoit 1974 (Araneae: Oecobiidae), a recently to Denmark and Europe introduced species. *Beiträge zur Araneologie*, 7: 247-250.
- VAN DER KRIEKEN, B., 2011. *Tegenaria fuesslini* Pavesi, 1873 (Aranea: Agelenidae), een nieuwe soort voor de Belgische fauna. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 26(2-3): 179-181.
- VAN DIJCK, H., MAES, D. & BRICHET, L., 2001. Toepassen van een multisoortenbenadering bij planning en evaluatie in het Vlaamse natuurbehoud. Rapport Universitair Centrum Antwerpen (in opdracht van Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Natuur, Wilrijk.
- VAN HELSDINGEN, P.J., 1995. Een stukje tropen in Nederland. *Nieuwsbrief SPINED*, 9: 4-6.
- VAN KEER, K., 2010. An update on the verified reports of imported spiders (Araneae) from Belgium. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 25: 210-214.
- VAN KEER, K., 2014. Verslag van de 100^{ste} vergadering van ARABEL van zaterdag 2014 in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 29(3): 92.
- VAN KEER, K., 2015. Verslag Algemene Vergadering ARABEL: 31 januari 2015. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 30(1): 54.
- VAN KEER, K., VAN KEER, J., DE KONINCK, H. & VANUYTVEN, H., 2008. "Loch Ness monster" found; first verified record of *Eresus* sp. for Belgium. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 29(3): 60-64.
- VAN KEER, K., OGER, P. & MAINGEOT, M., 2010. First record of *Sibianor laevis* Logunov, 2001 (Araneae: Salticidae) for Belgium. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 25: 46-49.
- VAN KEER, J. & JACOBS, M., 2015. *Abacoproeces saltuum* (L. Koch, 1872) (Araneae, Linyphiidae), a new species for the Belgian spider fauna. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 30(1): 13-15.
- VAN KEER, J., LAMBRECHTS, J., JACOBS, M. & KEKENBOSCH R., 2016. *Porrhomma cambridgei* Merrett, 1994 (Araneae, Linyphiidae), a species new to the Belgian fauna. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 31(1): 25-29.
- VANUYTVEN, H., 2014. *Theridion asopi* n. sp., a new member of the *Theridion melanurum* group (Araneae: Theridiidae) in Europe. *Arachnology*, 16(4): 127-134.
- WORLD SPIDER CATALOG (2017) *World Spider Catalog*. Natural History Museum Bern, online at <http://wsc.nmbe.ch>, version 18.5, accessed on 1 May 2017.
- WUNDERLICH, J., 1973. Zur Spinnenfauna Deutschlands, XV. Weitere seltene und bisher unbekannte Arten sowie Anmerkungen zur Taxonomie und Synonymie (Arachnida: Araneae). *Senckenbergiana Biologica*, 54: 405-428.
- WUNDERLICH, J., 2004. The fossil spiders (Araneae) of the families Tetragnathidae and Zygiellidae n. stat. in Baltic and Dominican amber, with notes on higher extant and fossil taxa. *Beiträge zur Araneologie*, 3: 899-955.
- WUNDERLICH, J., 2015. Descriptions of the new subgenera *Parvidipoena* and *Simonola* of the genus *Lasaeola* Simon 1881 s. l. which include two tiny European species (Araneae: Theridiidae). *Beiträge zur Araneologie*, 9: 437-445.

APPENDIX 1. Aantal zich in België voortplantende spinnen en aantal aangetroffen exoten per familie.

Familie	Nederlandse naam	Aantal zich voortplantende soorten	Aantal exoten
Agelenidae	Trechterspinnen	17	1
Amaurobiidae	Nachtkardespinnen	4	2
Anapidae	Dwergkogelspinnen	1	
Anyphaenidae	Buisspinnen	1	
Araneidae	Wielwebspinnen	39	1
Atypidae	Mijnsipinnen	2	
Clubionidae	Struikzakspinnen	22	
Ctenidae	Kamspinnen		3
Cybaeidae	Waterspinnen (alleen Argyroneta)	1	
Dictynidae	Kaardertjes	17	
Dysderidae	Celspinnen	4	
Eresidae	Koepelspinnen	1	
Eutichuridae	Spoorspinnen	6	1
Gnaphosidae	Bodemjachtspinnen	46	
Hahniidae	Kamstaartjes	9	
Hexathelidae			1
Linyphiidae	Dwerg- en hangmatspinnen	267	2
Liocranidae	Bodemzakspinnen	13	
Lycosidae	Wolfspinnen	47	
Mimetidae	Spinneneters	4	
Miturgidae	Stekelpootspinnen	5	
Nephilidae	Gouden wielwebspinnen		1
Nesticidae	Holenspinnen	1	
Oecobiidae	Spiraalspinnen	2	
Oonopidae	Dwergcelspinnen	3	
Oxyopidae	Lynxspinnen	3	
Philodromidae	Renspinnen	19	1
Pholcidae	Trilspinnen	6	2
Phrurolithidae	Fruolielen	2	
Pisauridae	Kraamwebspinnen, Visserspinnen	3	
Salticidae	Springspinnen	47	4
Scytodidae	Lijmspuiters	1	
Segestriidae	Zesoogspinnen	3	
Selenopidae	Platte muurspinnen		1
Sparassidae	Jachtkrabspinnen	1	1
Tetragnathidae	Strekspinnen	15	
Theraphosidae	Echte vogelspinnen		3
Theridiidae	Kogelspinnen	59	10
Theridiosomatidae	Paraplusipinnen	1	
Thomisidae	Krabspinnen	38	
Titanoecidae	Rotskaardespinnen	1	
Trachelidae		1	
Uloboridae	Wielwebkaardespinnen	3	
Zodariidae	Mierenjagerspinnen	2	
Zoropsidae	Valse wolfsspinnen	1	
TOTAAL		718	34

ANNEX 2. Soortenlijst van de Belgische spinnen

Familie	Genus	Soort	Auteur	Veranderingen	Nederlandse naam
Agelenidae	<i>Agelena</i>	<i>labyrinthica</i>	(Clerck, 1757)		Gewone labyrinthspin
Agelenidae	<i>Allagelena</i>	<i>gracilens</i>	(C.L. Koch, 1841)		Kleine doolhofspin
Agelenidae	<i>Coelotes</i>	<i>atropos</i>	(Walckenaer, 1830)	De Bakker <i>et al.</i> , 2012	Britse trechterspin
Agelenidae	<i>Coelotes</i>	<i>terrestris</i>	(Wider, 1834)	Transfer van Amaurobiidae	Gewone bostrechterspin
Agelenidae	<i>Eratigena</i>	<i>agrestis</i>	(Walckenaer, 1802)	<i>T. agrestis</i>	Veldtrechterspin
Agelenidae	<i>Eratigena</i>	<i>atrica</i>	(C.L. Koch, 1843)	<i>T. atrica</i>	Gewone huisspin
Agelenidae	<i>Eratigena</i>	<i>saeva</i>	Blackwall, 1844	<i>T. saeva</i>	Blackwalls huisspin
Agelenidae	<i>Eratigena</i>	<i>picta</i>	(Simon, 1870)	<i>Malthonica p.</i>	Spiraaltrechterspin
Agelenidae	<i>Histopona</i>	<i>torpida</i>	(C.L. Koch, 1837)		Slanke Bostrechterspin
Agelenidae	<i>Inermocoelotes</i>	<i>inermis</i>	(L. Koch, 1855)	Transfer v. Amaurobiidae; <i>Eurocoelotes i.</i>	Leemtrechterspin
Agelenidae	<i>Tegenaria</i>	<i>domestica</i>	(Clerck, 1757)		Grijze huisspin
Agelenidae	<i>Tegenaria</i>	<i>ferruginea</i>	(Panzer, 1804)	<i>Malthonica f.</i>	Bonte trechterspin
Agelenidae	<i>Tegenaria</i>	<i>pagana</i>	C.L. Koch, 1840	<i>Malthonica p.</i>	Zuidelijke huisspin
Agelenidae	<i>Tegenaria</i>	<i>parietina</i>	(Fourcroy, 1785)		Grote huisspin
Agelenidae	<i>Tegenaria</i>	<i>silvestris</i>	L. Koch, 1872	<i>Malthonica s.</i>	Steentrechterspin
Agelenidae	<i>Textrix</i>	<i>caudata</i>	L. Koch, 1872		Zwarte staartspin
Agelenidae	<i>Textrix</i>	<i>denticulata</i>	(Olivier, 1789)		Gewone staartspin
Amaurobiidae	<i>Amaurobius</i>	<i>fenestralis</i>	(Ström, 1768)		Huiskaardespun
Amaurobiidae	<i>Amaurobius</i>	<i>ferox</i>	(Walckenaer, 1830)		Grote kaardespun
Amaurobiidae	<i>Amaurobius</i>	<i>similis</i>	(Blackwall, 1861)		Muurkaardespun
Amaurobiidae	<i>Callobius</i>	<i>claustrarius</i>	(Hahn, 1833)		Boskaardespun
Anapidae	<i>Comaroma</i>	<i>simoni</i>	Bertkau, 1889		Harnasspinnetje
Anyphaenidae	<i>Anyphaena</i>	<i>accentuata</i>	(Walckenaer, 1802)		Struikspun
Araneidae	<i>Aculepeira</i>	<i>ceropegia</i>	(Walckenaer, 1802)		Eikenbladspun
Araneidae	<i>Agalenatea</i>	<i>redii</i>	(Scopoli, 1763)		Brede wielwebspun
Araneidae	<i>Araneus</i>	<i>alsine</i>	(Walckenaer, 1802)		Sinaasappelspun
Araneidae	<i>Araneus</i>	<i>angulatus</i>	Clerck, 1757		Schouderkruisspun
Araneidae	<i>Araneus</i>	<i>diadematus</i>	Clerck, 1757		Kruisspun
Araneidae	<i>Araneus</i>	<i>marmoreus</i>	Clerck, 1757		Marmerspun
Araneidae	<i>Araneus</i>	<i>quadratus</i>	Clerck, 1757		Viervlek wielwebspun
Araneidae	<i>Araneus</i>	<i>sturmi</i>	(Hahn, 1831)		Witruit wielwebspun
Araneidae	<i>Araneus</i>	<i>triguttatus</i>	(Fabricius, 1793)	(Fabricius, 1775)	Drievlek wielwebspun
Araneidae	<i>Araniella</i>	<i>alpica</i>	(L. Koch, 1869)		Dennenkomkommerspun
Araneidae	<i>Araniella</i>	<i>cucurbitina</i>	(Clerck, 1757)		Gewone komkommerspun
Araneidae	<i>Araniella</i>	<i>displicata</i>	(Hentz, 1847)		Bonte komkommerspun
Araneidae	<i>Araniella</i>	<i>inconspicua</i>	(Simon, 1874)		Stippelloze komkommerspun
Araneidae	<i>Araniella</i>	<i>opisthographa</i>	(Kulczynski, 1905)		Tweelingkomkommerspun
Araneidae	<i>Araniella</i>	<i>proxima</i>	(Kulczynski, 1885)		Noordse komkommerspun
Araneidae	<i>Argiope</i>	<i>bruennichi</i>	(Scopoli, 1772)		Tijgerspun (Wespspun)
Araneidae	<i>Cercidia</i>	<i>prominens</i>	(Westring, 1851)		Stekelrugje
Araneidae	<i>Cyclosa</i>	<i>conica</i>	(Pallas, 1772)		Kegelspun
Araneidae	<i>Cyclosa</i>	<i>oculata</i>	(Walckenaer, 1802)		Zesknobbelspun
Araneidae	<i>Gibbaranea</i>	<i>bituberculata</i>	(Walckenaer, 1802)		Struikknobbelspun
Araneidae	<i>Gibbaranea</i>	<i>gibbosa</i>	(Walckenaer, 1802)		Boomknobbelspun
Araneidae	<i>Gibbaranea</i>	<i>omoeda</i>	(Thorell, 1870)		Sparrenknobbelspun
Araneidae	<i>Hypsosinga</i>	<i>albovittata</i>	(Westring, 1851)		Witvlekpyjamaspun
Araneidae	<i>Hypsosinga</i>	<i>heri</i>	(Hahn, 1831)		Moeraspyjamaspun
Araneidae	<i>Hypsosinga</i>	<i>pygmaea</i>	(Sundevall, 1831)		Graspyjamaspun

Familie	Genus	Soort	Auteur	Veranderingen	Nederlandse naam
Araneidae	<i>Hypsosinga</i>	<i>sanguinea</i>	(C.L. Koch, 1844)		Heidepyjamaspin
Araneidae	<i>Larinioides</i>	<i>cornutus</i>	(Clerck, 1757)		Rietkruisspin
Araneidae	<i>Larinioides</i>	<i>patagiatus</i>	(Clerck, 1757)		Vale wielwebspin
Araneidae	<i>Larinioides</i>	<i>sclopetarius</i>	(Clerck, 1757)		Brugspin
Araneidae	<i>Leviellus</i>	<i>stroemi</i>	(Thorell, 1870)	<i>Stroemiella s.</i>	Boomsectorspin
Araneidae	<i>Mangora</i>	<i>acalypha</i>	(Walckenaer, 1802)		Driestreepspin
Araneidae	<i>Neoscona</i>	<i>adianta</i>	(Walckenaer, 1802)		Heidewielwebspin
Araneidae	<i>Nuctenea</i>	<i>umbratica</i>	(Clerck, 1757)		Platte wielwebspin
Araneidae	<i>Singa</i>	<i>hamata</i>	(Clerck, 1757)		Bonte pyjamaspin
Araneidae	<i>Singa</i>	<i>nitidula</i>	C.L. Koch, 1844		Beekpyjamaspin
Araneidae	<i>Zilla</i>	<i>diodia</i>	(Walckenaer, 1802)		Maskerspinnetje
Araneidae	<i>Zygiella</i>	<i>atrica</i>	(C.L. Koch, 1845)		Struiksectorspin
Araneidae	<i>Zygiella</i>	<i>montana</i>	(C.L. Koch, 1834)	<i>Parazygiella montana</i> ; Jansen, 2010	Bergsectorspin
Araneidae	<i>Zygiella</i>	<i>x-notata</i>	(Clerck, 1757)		Venstersectorspin
Atypidae	<i>Atypus</i>	<i>affinis</i>	Eichwald, 1830		Gewone mijnspin
Atypidae	<i>Atypus</i>	<i>piceus</i>	(Sulzer, 1776)		Kalkmijns spin
Clubionidae	<i>Clubiona</i>	<i>brevipes</i>	Blackwall, 1841		Eikenzakspin
Clubionidae	<i>Clubiona</i>	<i>caerulescens</i>	L. Koch, 1867		Glanzende zakspin
Clubionidae	<i>Clubiona</i>	<i>comta</i>	C.L. Koch, 1839		Bonte zakspin
Clubionidae	<i>Clubiona</i>	<i>corticalis</i>	(Walckenaer, 1802)		Schorszakspin
Clubionidae	<i>Clubiona</i>	<i>diversa</i>	O. P.-Cambridge, 1862		Vale zakspin
Clubionidae	<i>Clubiona</i>	<i>frisia</i>	Wunderlich & Schuett, 1995		Beekzakspin
Clubionidae	<i>Clubiona</i>	<i>frutetorum</i>	L. Koch, 1867		Struweelzakspin
Clubionidae	<i>Clubiona</i>	<i>genevensis</i>	L. Koch, 1866		Graszakspin
Clubionidae	<i>Clubiona</i>	<i>germanica</i>	Thorell, 1871		Duitse zakspin
Clubionidae	<i>Clubiona</i>	<i>juvenis</i>	Simon, 1878		Zeggezakspin
Clubionidae	<i>Clubiona</i>	<i>leucaspis</i>	Simon, 1932		Witrugzakspin
Clubionidae	<i>Clubiona</i>	<i>lutescens</i>	Westring, 1851		Griendzakspin
Clubionidae	<i>Clubiona</i>	<i>neglecta</i>	O. P.-Cambridge, 1862		Kortkaakzakspin
Clubionidae	<i>Clubiona</i>	<i>pallidula</i>	(Clerck, 1757)		Boomzakspin
Clubionidae	<i>Clubiona</i>	<i>phragmitis</i>	C.L. Koch, 1843		Rietzakspin
Clubionidae	<i>Clubiona</i>	<i>pseudoneglecta</i>	Wunderlich, 1994		Langkaakzakspin
Clubionidae	<i>Clubiona</i>	<i>reclusa</i>	O. P.-Cambridge, 1863		Zompzakspin
Clubionidae	<i>Clubiona</i>	<i>stagnatilis</i>	Kulczynski, 1897		Moeraszakspin
Clubionidae	<i>Clubiona</i>	<i>subsultans</i>	Thorell, 1875		Dennenzakspin
Clubionidae	<i>Clubiona</i>	<i>subtilis</i>	L. Koch, 1867		Kleine zakspin
Clubionidae	<i>Clubiona</i>	<i>terrestris</i>	Westring, 1851		Gewone zakspin
Clubionidae	<i>Clubiona</i>	<i>trivialis</i>	C.L. Koch, 1843		Moszakspin
Cybaeidae	<i>Argyroneta</i>	<i>aquatica</i>	(Clerck, 1757)		Waterspin
Dictynidae	<i>Altella</i>	<i>lucida</i>	(Simon, 1874)		Steppekaardertje
Dictynidae	<i>Argenna</i>	<i>patula</i>	(Simon, 1874)		Kwelderkaardertje
Dictynidae	<i>Argenna</i>	<i>subnigra</i>	(O. P.-Cambridge, 1861)		Bodemkaardertje
Dictynidae	<i>Brigittea</i>	<i>civica</i>	(Lucas, 1850)	<i>D. civica</i>	Wandkaardertje
Dictynidae	<i>Brigittea</i>	<i>latens</i>	(Fabricius, 1775)	<i>D. latens</i>	Zwart kaardertje
Dictynidae	<i>Cicurina</i>	<i>cicur</i>	(Fabricius, 1793)		Herfststrooiselspin
Dictynidae	<i>Dictyna</i>	<i>arundinacea</i>	(Linnaeus, 1758)		Heidekaardertje
Dictynidae	<i>Dictyna</i>	<i>major</i>	(Menge, 1869)		Noords kaardertje
Dictynidae	<i>Dictyna</i>	<i>pusilla</i>	(Thorell, 1856)		Bruin kaardertje
Dictynidae	<i>Dictyna</i>	<i>uncinata</i>	Thorell, 1856		Struikkaardertje

Familie	Genus	Soort	Auteur	Veranderingen	Nederlandse naam
Dictynidae	<i>Emblyna</i>	<i>brevidens</i>	(Kulczyński, 1897)		Korttandkaardertje
Dictynidae	<i>Lathys</i>	<i>humilis</i>	(Blackwall, 1855)		Dennenkaardertje
Dictynidae	<i>Lathys</i>	<i>stigmatisata</i>	(Menge, 1869)		Kurkentrekkerkaardertje
Dictynidae	<i>Mastigusa</i>	<i>arietina</i>	(Thorell, 1871)		Kleinoogzweppalpspin
Dictynidae	<i>Mastigusa</i>	<i>macrophthalma</i>	(Kulczynski, 1897)		Grootoogzweppalpspin
Dictynidae	<i>Nigma</i>	<i>flavescens</i>	(Walckenaer, 1830)		Geel kaardertje
Dictynidae	<i>Nigma</i>	<i>walckenaeri</i>	(Roewer, 1951)		Groen kaardertje
Dysderidae	<i>Dysdera</i>	<i>crocata</i>	C.L. Koch, 1838		Roodwitte celspin
Dysderidae	<i>Dysdera</i>	<i>erythrina</i>	(Walckenaer, 1802)		Boscelspin
Dysderidae	<i>Harpactea</i>	<i>hombergi</i>	(Scopoli, 1763)		Schorscelspin
Dysderidae	<i>Harpactea</i>	<i>rubicunda</i>	(C. L. Koch, 1838)		Grote schorscelspin
Eresidae	<i>Eresus</i>	<i>sandaliatus</i>	(Martini & Goeze, 1778)	<i>E. kollari, sandaliatus</i>	Lentevuurspin
Eutichuridae	<i>Cheiracanthium</i>	<i>erraticum</i>	(Walckenaer, 1802)	Transfer van Miturgidae	Heidespoorspin
Eutichuridae	<i>Cheiracanthium</i>	<i>montanum</i>	L. Koch, 1877	Transfer van Miturgidae	Boomspoorspin
Eutichuridae	<i>Cheiracanthium</i>	<i>pennyi</i>	O. P.-Cambridge, 1873	Transfer van Miturgidae	Penny's spoorspin
Eutichuridae	<i>Cheiracanthium</i>	<i>punctorium</i>	(Villers, 1789)	Transfer van Miturgidae	Grote spoorspin
Eutichuridae	<i>Cheiracanthium</i>	<i>virescens</i>	(Sundevall, 1833)	Transfer van Miturgidae	Groene spoorspin
Gnaphosidae	<i>Arboricaria</i>	<i>subopaca</i>	(Westring, 1861)	<i>Micaria s.</i>	Boomstammierspin
Gnaphosidae	<i>Callilepis</i>	<i>nocturna</i>	(Linnaeus, 1758)		Mierendief
Gnaphosidae	<i>Drassodes</i>	<i>cupreus</i>	(Blackwall, 1834)		Gewone muisspin
Gnaphosidae	<i>Drassodes</i>	<i>lpidosus</i>	(Walckenaer, 1802)		Rotsmuisspin
Gnaphosidae	<i>Drassodes</i>	<i>pubescens</i>	(Thorell, 1856)		Harige muisspin
Gnaphosidae	<i>Drassodex</i>	<i>hypocrita</i>	(Simon, 1878)		Gekke muisspin
Gnaphosidae	<i>Drassyllus</i>	<i>lutetianus</i>	(L. Koch, 1866)		Moeraskampoot
Gnaphosidae	<i>Drassyllus</i>	<i>praeficus</i>	(L. Koch, 1866)		Zonnekampoot
Gnaphosidae	<i>Drassyllus</i>	<i>pumilus</i>	(C.L. Koch, 1839)		Moskampoot
Gnaphosidae	<i>Drassyllus</i>	<i>pusillus</i>	(C.L. Koch, 1833)		Kleine kampoot
Gnaphosidae	<i>Drassyllus</i>	<i>villicus</i>	(Thorell, 1875)		Gedeukte kampoot
Gnaphosidae	<i>Gnaphosa</i>	<i>leporina</i>	(L. Koch, 1866)		Heiderichelkaak
Gnaphosidae	<i>Gnaphosa</i>	<i>lucifuga</i>	(Walckenaer, 1802)		Nachtrichelkaak
Gnaphosidae	<i>Gnaphosa</i>	<i>lugubris</i>	(C.L. Koch, 1839)		Stepperichelkaak
Gnaphosidae	<i>Gnaphosa</i>	<i>nigerrima</i>	L. Koch, 1877		Moerasrichelkaak
Gnaphosidae	<i>Gnaphosa</i>	<i>opaca</i>	Herman, 1879		Kleine richelkaak
Gnaphosidae	<i>Haplodrassus</i>	<i>cognatus</i>	(Westring, 1861)		Schorsmuisspin
Gnaphosidae	<i>Haplodrassus</i>	<i>dalmatensis</i>	(L. Koch, 1866)		Gestreepte muisspin
Gnaphosidae	<i>Haplodrassus</i>	<i>kulczynskii</i>	Lohmander, 1942		Steppemuisspin
Gnaphosidae	<i>Haplodrassus</i>	<i>moderatus</i>	(Kulczynski, 1897)		Veenmuisspin
Gnaphosidae	<i>Haplodrassus</i>	<i>signifer</i>	(C.L. Koch, 1839)		Heidemuisspin
Gnaphosidae	<i>Haplodrassus</i>	<i>silvestris</i>	(Blackwall, 1833)		Bosmuisspin
Gnaphosidae	<i>Haplodrassus</i>	<i>umbratilis</i>	(L. Koch, 1866)		Zandmuisspin
Gnaphosidae	<i>Kishidaia</i>	<i>conspicua</i>	(L. Koch, 1866)		Viervlekmuisspin
Gnaphosidae	<i>Micaria</i>	<i>albovittata</i>	(Lucas, 1846)		Prachtmierspin
Gnaphosidae	<i>Micaria</i>	<i>dives</i>	(Lucas, 1846)		Bosmierspin
Gnaphosidae	<i>Micaria</i>	<i>formicaria</i>	(Sundevall, 1831)		Steppemierspin
Gnaphosidae	<i>Micaria</i>	<i>fulgens</i>	(Walckenaer, 1802)		Gewone mierspin
Gnaphosidae	<i>Micaria</i>	<i>guttulata</i>	(C.L. Koch, 1839)		Zuidelijke mierspin
Gnaphosidae	<i>Micaria</i>	<i>pulicaria</i>	(Sundevall, 1831)		Zandmierspin
Gnaphosidae	<i>Micaria</i>	<i>silesiaca</i>	L. Koch, 1875		Europese mierspin
Gnaphosidae	<i>Phaeocedus</i>	<i>braccatus</i>	(L. Koch, 1866)		Zesvlekmuisspin
Gnaphosidae	<i>Poecilochroa</i>	<i>variana</i>	(C.L. Koch, 1839)		Gebandeerde muisspin
Gnaphosidae	<i>Scotophaeus</i>	<i>blackwalli</i>	(Thorell, 1871)		Stalmuursluiper

Familie	Genus	Soort	Auteur	Veranderingen	Nederlandse naam
Gnaphosidae	<i>Scotophaeus</i>	<i>quadripunctatus</i>	(Linnaeus, 1758)	De Koninck, 2010	Dolkmuursluiper
Gnaphosidae	<i>Scotophaeus</i>	<i>scutulatus</i>	(L. Koch, 1866)		Huismuursluiper
Gnaphosidae	<i>Trachyzelotes</i>	<i>pedestris</i>	(C.L. Koch, 1837)		Stekelkaakkampoot
Gnaphosidae	<i>Zelotes</i>	<i>aeneus</i>	(Simon, 1878)		Rotskampoot
Gnaphosidae	<i>Zelotes</i>	<i>apricorum</i>	(L. Koch, 1876)		Graskampoot
Gnaphosidae	<i>Zelotes</i>	<i>electus</i>	(C.L. Koch, 1839)		Duinkampoot
Gnaphosidae	<i>Zelotes</i>	<i>erebeus</i>	(Thorell, 1871)		Herfstkampoot
Gnaphosidae	<i>Zelotes</i>	<i>gallicus</i>	Simon, 1914		Grimm's tandpoot
Gnaphosidae	<i>Zelotes</i>	<i>latreillei</i>	(Simon, 1878)		Latreille's kampoot
Gnaphosidae	<i>Zelotes</i>	<i>longipes</i>	(L. Koch, 1866)		Stekelkampoot
Gnaphosidae	<i>Zelotes</i>	<i>petrensis</i>	(C.L. Koch, 1839)		Steppekampoot
Gnaphosidae	<i>Zelotes</i>	<i>subterraneus</i>	(C.L. Koch, 1833)		Noordse kampoot
Hahniidae	<i>Antistea</i>	<i>elegans</i>	(Blackwall, 1841)		Moeraskamstaartje
Hahniidae	<i>Cryphoea</i>	<i>silvicola</i>	(C.L. Koch, 1834)		Kleine bostrechterspin
Hahniidae	<i>Hahnia</i>	<i>helveola</i>	Simon, 1875		Boskamstaartje
Hahniidae	<i>Hahnia</i>	<i>nava</i>	(Blackwall, 1841)		Heidekamstaartje
Hahniidae	<i>Hahnia</i>	<i>ononidum</i>	Simon, 1875		Kwastpalpkamstaartje
Hahniidae	<i>Hahnia</i>	<i>pusilla</i>	C.L. Koch, 1841		Kleinste kamstaartje
Hahniidae	<i>Iberina</i>	<i>candida</i>	(Simon, 1875)	<i>Hahnia c.</i>	Klein kamstaartje
Hahniidae	<i>Iberina</i>	<i>montana</i>	(Blackwall, 1841)	<i>Hahnia m.</i>	Gewoon kamstaartje
Hahniidae	<i>Tuberta</i>	<i>maerens</i>	(O. P.-Cambridge, 1863)		Schroefpalpspin
Linyphiidae	<i>Abacoproeces</i>	<i>saltuum</i>	L. Koch, 1872	Van Keer & Jacobs, 2015	Bermgroefkopje
Linyphiidae	<i>Acartauchenius</i>	<i>scurrilis</i>	(O. P.-Cambridge, 1872)		Bleek haarkopje
Linyphiidae	<i>Agyneta</i>	<i>affinis</i>	(Kulczynski, 1898)	<i>Meioneta affinis</i>	Concaaf probleemspinnetje
Linyphiidae	<i>Agyneta</i>	<i>cauta</i>	(O. P.-Cambridge, 1902)		Gezadeld dikpalpje
Linyphiidae	<i>Agyneta</i>	<i>conigera</i>	(O. P.-Cambridge, 1863)		Gewoon slankpalpje
Linyphiidae	<i>Agyneta</i>	<i>decora</i>	(O. P.-Cambridge, 1871)		Gezaagd dikpalpje
Linyphiidae	<i>Agyneta</i>	<i>fuscipalpa</i>	(C.L. Koch, 1836)	<i>Meioneta f.</i>	Getand probleemspinnetje
Linyphiidae	<i>Agyneta</i>	<i>innotabilis</i>	(O. P.-Cambridge, 1863)	<i>Meioneta i.</i>	Grootoogprobleemspinnetje
Linyphiidae	<i>Agyneta</i>	<i>mollis</i>	(O. P.-Cambridge, 1871)	<i>Meioneta m.</i>	Slank probleemspinnetje
Linyphiidae	<i>Agyneta</i>	<i>ramosa</i>	Jackson, 1912		Mosslankpalpje
Linyphiidae	<i>Agyneta</i>	<i>rurestris</i>	(C.L. Koch, 1836)	<i>Meioneta r.</i>	Veldprobleemspinnetje
Linyphiidae	<i>Agyneta</i>	<i>saxatilis</i>	(Blackwall, 1844)	<i>Meioneta s.</i>	Spits probleemspinnetje
Linyphiidae	<i>Agyneta</i>	<i>simplicitarsis</i>	(Simon, 1884)	<i>Meioneta s.</i>	Breed probleemspinnetje
Linyphiidae	<i>Agyneta</i>	<i>subtilis</i>	(O. P.-Cambridge, 1863)		Tandloos dikpalpje
Linyphiidae	<i>Allomengea</i>	<i>scopigera</i>	(Grube, 1859)		Alert stekelpalpje
Linyphiidae	<i>Allomengea</i>	<i>vidua</i>	(L. Koch, 1879)		Klein stekelpalpje
Linyphiidae	<i>Anguliphantes</i>	<i>angulipalpis</i>	(Westring, 1851)		Geknikte bodemwevertje
Linyphiidae	<i>Aphileta</i>	<i>misera</i>	(O. P.-Cambridge, 1882)		Veenmossplintje
Linyphiidae	<i>Araeoncus</i>	<i>crassiceps</i>	(Westring, 1861)		Arrogant voorkopje
Linyphiidae	<i>Araeoncus</i>	<i>humilis</i>	(Blackwall, 1841)		Bescheiden voorkopje
Linyphiidae	<i>Asthenargus</i>	<i>paganus</i>	(Simon, 1884)		Bleek haakpalpje
Linyphiidae	<i>Baryphma</i>	<i>maritimum</i>	(Crocker & Parker, 1970)		Helmgrasputkopje
Linyphiidae	<i>Baryphma</i>	<i>pratense</i>	(Blackwall, 1861)		Weideputkopje
Linyphiidae	<i>Baryphma</i>	<i>trifrons</i>	(O. P.-Cambridge, 1863)		Kustputkopje

Familie	Genus	Soort	Auteur	Veranderingen	Nederlandse naam
Linyphiidae	<i>Bathyphantes</i>	<i>approximatus</i>	(O. P.-Cambridge, 1871)		Moeraswevertje
Linyphiidae	<i>Bathyphantes</i>	<i>gracilis</i>	(Blackwall, 1841)		Gewoon wevertje
Linyphiidae	<i>Bathyphantes</i>	<i>nigrinus</i>	(Westring, 1851)		Donker wevertje
Linyphiidae	<i>Bathyphantes</i>	<i>parvulus</i>	(Westring, 1851)		Kleinste wevertje
Linyphiidae	<i>Bathyphantes</i>	<i>setiger</i>	F.O. P.-Cambridge, 1894		Harig wevertje
Linyphiidae	<i>Bathyphantes</i>	<i>simillimus</i>	(L. Koch, 1879)		Bergbeekwevertje
Linyphiidae	<i>Bolyphantes</i>	<i>alticeps</i>	(Sundevall, 1833)		Hoog voorkopje
Linyphiidae	<i>Bolyphantes</i>	<i>luteolus</i>	(Blackwall, 1833)		Gevlekt voorkopje
Linyphiidae	<i>Caviphantes</i>	<i>saxetorum</i>	(Hull, 1916)		Kiezeldwergspin
Linyphiidae	<i>Centromerita</i>	<i>bicolor</i>	(Blackwall, 1833)		Groot haarpalpje
Linyphiidae	<i>Centromerita</i>	<i>concinna</i>	(Thorell, 1875)		Klein haarpalpje (Heidepionierspinnetje)
Linyphiidae	<i>Centromerus</i>	<i>arcanus</i>	(O. P.-Cambridge, 1873)		Tangpalpje
Linyphiidae	<i>Centromerus</i>	<i>brevipalpus</i>	(Menge, 1866)	<i>C. brevivulvatus</i>	Bostongpalpje
Linyphiidae	<i>Centromerus</i>	<i>capucinus</i>	(Simon, 1884)		Kampalpje
Linyphiidae	<i>Centromerus</i>	<i>dilutus</i>	(O. P.-Cambridge, 1875)		Middelste tongspinnetje
Linyphiidae	<i>Centromerus</i>	<i>incilium</i>	(L. Koch, 1881)		Glad tandpalpje
Linyphiidae	<i>Centromerus</i>	<i>leruthi</i>	Fage, 1933		Leruths tandpalpje
Linyphiidae	<i>Centromerus</i>	<i>levitarsis</i>	(Simon, 1884)		Veenhengelspin
Linyphiidae	<i>Centromerus</i>	<i>pabulator</i>	(O. P.-Cambridge, 1875)		Kegelpalpje
Linyphiidae	<i>Centromerus</i>	<i>persimilis</i>	(O. P.-Cambridge, 1912)		Drietonetje
Linyphiidae	<i>Centromerus</i>	<i>prudens</i>	(O. P.-Cambridge, 1873)		Porseleinspinnetje
Linyphiidae	<i>Centromerus</i>	<i>semiater</i>	(L. Koch, 1879)		Moerastongpalpje
Linyphiidae	<i>Centromerus</i>	<i>serratus</i>	(O. P.-Cambridge, 1875)		Fijn zaagpalpje
Linyphiidae	<i>Centromerus</i>	<i>sylvaticus</i>	(Blackwall, 1841)		Gewoon zaagpalpje
Linyphiidae	<i>Ceratinella</i>	<i>brevipes</i>	(Westring, 1851)		Gewoon schildspinnetje
Linyphiidae	<i>Ceratinella</i>	<i>brevis</i>	(Wider, 1834)		Zwart schildspinnetje
Linyphiidae	<i>Ceratinella</i>	<i>scabrosa</i>	(O. P.-Cambridge, 1871)		lepelschildspinnetje
Linyphiidae	<i>Cinetata</i>	<i>gradata</i>	(Simon, 1881)		Bulrugje
Linyphiidae	<i>Cnephalocotes</i>	<i>obscurus</i>	(Blackwall, 1834)		Donker tepelpalpje
Linyphiidae	<i>Collinsia</i>	<i>distincta</i>	(Simon, 1884)		Stomphoekpalpje
Linyphiidae	<i>Collinsia</i>	<i>inerrans</i>	(O. P.-Cambridge, 1885)		Pionierdwergspin
Linyphiidae	<i>Dicymbium</i>	<i>nigrum</i>	(Blackwall, 1834)		Donker bolkopje
Linyphiidae	<i>Dicymbium</i>	<i>nigrum brevisetosum</i>	Locket, 1962		Kortharig bolkopje
Linyphiidae	<i>Dicymbium</i>	<i>tibiale</i>	(Blackwall, 1836)		Dikpootbolkopje
Linyphiidae	<i>Diplocephalus</i>	<i>caecus</i>	Denis, 1952		Blind dubbelkopje
Linyphiidae	<i>Diplocephalus</i>	<i>cristatus</i>	(Blackwall, 1833)		Gewoon dubbelkopje
Linyphiidae	<i>Diplocephalus</i>	<i>graecus</i>	(O. P. -Cambridge, 1872)		Grieks dubbelkopje
Linyphiidae	<i>Diplocephalus</i>	<i>latifrons</i>	(O. P.-Cambridge, 1863)		Tweeklauwdubbelkopje
Linyphiidae	<i>Diplocephalus</i>	<i>lusiscus</i>	(Simon, 1872)		Sikkeldubbelkopje
Linyphiidae	<i>Diplocephalus</i>	<i>permixtus</i>	(O. P.-Cambridge, 1871)		Drieklauwdubbelkopje
Linyphiidae	<i>Diplocephalus</i>	<i>picinus</i>	(Blackwall, 1841)		Gewoon vals dubbelkopje
Linyphiidae	<i>Diplostyla</i>	<i>concolor</i>	(Wider, 1834)		Langtongspinnetje

Familie	Genus	Soort	Auteur	Veranderingen	Nederlandse naam
Linyphiidae	<i>Dismodicus</i>	<i>bifrons</i>	(Blackwall, 1841)		Hoog bolkopje
Linyphiidae	<i>Dismodicus</i>	<i>elevatus</i>	(C.L. Koch, 1838)		Hoogste bolkopje
Linyphiidae	<i>Donacochara</i>	<i>speciosa</i>	(Thorell, 1875)		Bleek langpalpje
Linyphiidae	<i>Drapetisca</i>	<i>socialis</i>	(Sundevall, 1833)		Schorskoloniespin
Linyphiidae	<i>Drepanotylus</i>	<i>uncatus</i>	(O. P.-Cambridge, 1873)		Haakhangmatspin
Linyphiidae	<i>Entelecara</i>	<i>acuminata</i>	(Wider, 1834)		Voorkopstruikdwergspin
Linyphiidae	<i>Entelecara</i>	<i>congenera</i>	(O. P.-Cambridge, 1879)		Bolkopstruikdwergspin
Linyphiidae	<i>Entelecara</i>	<i>erythropus</i>	(Westring, 1851)		Platkopstruikdwergspin
Linyphiidae	<i>Entelecara</i>	<i>flavipes</i>	(Blackwall, 1834)		Putkopstruikdwergspin
Linyphiidae	<i>Entelecara</i>	<i>omissa</i>	O. P.-Cambridge, 1902		Moerasstruikdwergspin
Linyphiidae	<i>Erigone</i>	<i>arctica</i>	(White, 1852)		Schorredwergspin
Linyphiidae	<i>Erigone</i>	<i>atra</i>	Blackwall, 1833		Storingsdwergspin
Linyphiidae	<i>Erigone</i>	<i>dentipalpis</i>	(Wider, 1834)		Auronautje
Linyphiidae	<i>Erigone</i>	<i>longipalpis</i>	(Sundevall, 1830)		Langpalpstoringsdwergspin
Linyphiidae	<i>Erigone</i>	<i>promiscua</i>	(O. P.-Cambridge, 1873)		Verwisselbare storingsdwergspin
Linyphiidae	<i>Erigonella</i>	<i>hiemalis</i>	(Blackwall, 1841)		Putkopruwborstje
Linyphiidae	<i>Erigonella</i>	<i>ignobilis</i>	(O. P.-Cambridge, 1871)		Bolkopruwborstje
Linyphiidae	<i>Erigonoplus</i>	<i>globipes</i>	(L. Koch, 1872)		Zwelpootje
Linyphiidae	<i>Erigonoplus</i>	<i>justus</i>	(O. P.-Cambridge, 1875)		Puntkopje
Linyphiidae	<i>Evansia</i>	<i>merens</i>	O.P.-Cambridge, 1900		Sikkelmierspin
Linyphiidae	<i>Floronia</i>	<i>bucculenta</i>	(Clerck, 1757)		Prachtpalpje (Floronia)
Linyphiidae	<i>Formiphantes</i>	<i>leptyphantiformis</i>	(Strand, 1907)		Bleek bodemwevertje
Linyphiidae	<i>Frontinellina</i>	<i>frutetorum</i>	(C.L. Koch, 1834)		Dubbelhangmatspin
Linyphiidae	<i>Glyphesis</i>	<i>cottonae</i>	(La Touche, 1945)		Dwergbultkopje
Linyphiidae	<i>Glyphesis</i>	<i>servulus</i>	(Simon, 1881)		Neuskopje (Neusdwergspin)
Linyphiidae	<i>Gnathonarium</i>	<i>dentatum</i>	(Wider, 1834)		Knobbeldwergtandkaak
Linyphiidae	<i>Gonatium</i>	<i>hilare</i>	Thorell, 1875		Drievingerpalpje
Linyphiidae	<i>Gonatium</i>	<i>rubellum</i>	(Blackwall, 1841)		Knobbelpalpje
Linyphiidae	<i>Gonatium</i>	<i>rubens</i>	(Blackwall, 1833)		Doornpalpje
Linyphiidae	<i>Gongylidiellum</i>	<i>latebricola</i>	(O. P.-Cambridge, 1871)		Vingerpalpje
Linyphiidae	<i>Gongylidiellum</i>	<i>murcidum</i>	Simon, 1884		Duimpalpje
Linyphiidae	<i>Gongylidiellum</i>	<i>vivum</i>	(O. P.-Cambridge, 1875)		Nagelpalpje
Linyphiidae	<i>Gongylidium</i>	<i>rufipes</i>	(Linnaeus, 1758)		Oranjepoot
Linyphiidae	<i>Halorates</i>	<i>reprobis</i>	(O. P.-Cambridge, 1879)		Slikkenspinnetje
Linyphiidae	<i>Helophora</i>	<i>insignis</i>	(Blackwall, 1841)		Breedtongspinnetje
Linyphiidae	<i>Hilaira</i>	<i>excisa</i>	(O. P.-Cambridge, 1871)		Knobbelrugje
Linyphiidae	<i>Hylyphantes</i>	<i>graminicola</i>	(Sundevall, 1830)		Lang kurkentrekkertje
Linyphiidae	<i>Hylyphantes</i>	<i>nigritus</i>	(Simon, 1881)		Kort kurkentrekkertje
Linyphiidae	<i>Hypomma</i>	<i>bituberculatum</i>	(Wider, 1834)		Moerasknobbelpopje
Linyphiidae	<i>Hypomma</i>	<i>cornutum</i>	(Blackwall, 1833)		Bermknobbelpopje
Linyphiidae	<i>Hypomma</i>	<i>fulvum</i>	(Bösenberg, 1902)		Pijlpalpje
Linyphiidae	<i>Hypselistes</i>	<i>jacksoni</i>	(O. P.-Cambridge, 1902)		Jackson's dubbelkopje
Linyphiidae	<i>Incestophantes</i>	<i>crucifer</i>	(Menge, 1866)		Laag voorkopje
Linyphiidae	<i>Jacksonella</i>	<i>falconeri</i>	(Jackson, 1908)		Simpelpalpje

Familie	Genus	Soort	Auteur	Veranderingen	Nederlandse naam
Linyphiidae	<i>Kaestneria</i>	<i>dorsalis</i>	(Wider, 1834)		Korttongwevertje
Linyphiidae	<i>Kaestneria</i>	<i>pullata</i>	(O. P.-Cambridge, 1863)		Variabel wevertje
Linyphiidae	<i>Karita</i>	<i>paludosa</i>	Duffey, 1971		Zompwevertje
Linyphiidae	<i>Labulla</i>	<i>thoracica</i>	(Wider, 1834)		Schaduwhangmatspin
Linyphiidae	<i>Lepthyphantes</i>	<i>leprosus</i>	(Ohlert, 1865)		Huiswevertje
Linyphiidae	<i>Lepthyphantes</i>	<i>minutus</i>	(Blackwall, 1833)		Groter bodemwevertje
Linyphiidae	<i>Leptorhoptrum</i>	<i>robustum</i>	(Westring, 1851)		Donker langpalpje
Linyphiidae	<i>Leptothrix</i>	<i>hardyi</i>	(Blackwall, 1850)		Pruikspinnetje
Linyphiidae	<i>Lessertia</i>	<i>denticelis</i>	(Simon, 1884)		Spiraaldwergtandkaak
Linyphiidae	<i>Linyphia</i>	<i>hortensis</i>	Sundevall, 1830		Tuinhangmatspin
Linyphiidae	<i>Linyphia</i>	<i>tenuipalpis</i>	Simon, 1884		Grote heidehangmatspin
Linyphiidae	<i>Linyphia</i>	<i>triangularis</i>	(Clerck, 1757)		Herfsthangmatspin
Linyphiidae	<i>Lophomma</i>	<i>punctatum</i>	(Blackwall, 1841)		Perforaatje
Linyphiidae	<i>Macrargus</i>	<i>carpenteri</i>	(O. P.-Cambridge, 1894)		Dennestrooiselspin
Linyphiidae	<i>Macrargus</i>	<i>rufus</i>	(Wider, 1834)		Winterstrooiselspin
Linyphiidae	<i>Maro</i>	<i>lehtineni</i>	Saaristo, 1971		Lehtinen's dwergspin
Linyphiidae	<i>Maro</i>	<i>lepidus</i>	Casemir, 1961		Geschubde dwergspin
Linyphiidae	<i>Maro</i>	<i>minutus</i>	O. P.-Cambridge, 1906		Kleinste dwergspin
Linyphiidae	<i>Maro</i>	<i>sublestus</i>	Falconer, 1915		Zeldzame dwergspin
Linyphiidae	<i>Maso</i>	<i>gallicus</i>	Simon, 1894		Veerdwergstekelpoot
Linyphiidae	<i>Maso</i>	<i>sundevalli</i>	(Westring, 1851)		Gewoon Dwergstekelpootje
Linyphiidae	<i>Megalepthyphantes</i>	<i>nebulosus</i>	(Sundevall, 1830)		Kielpalpwever
Linyphiidae	<i>Metopobactrus</i>	<i>prominulus</i>	(O. P.-Cambridge, 1872)		Kalkgrasdwergspin
Linyphiidae	<i>Micrargus</i>	<i>apertus</i>	(O. P.-Cambridge, 1871)		Moerasbosputkopje
Linyphiidae	<i>Micrargus</i>	<i>herbigradus</i>	(Blackwall, 1854)		Vingerpalpputkopje
Linyphiidae	<i>Micrargus</i>	<i>laudatus</i>	(O. P.-Cambridge, 1881)		Zeldzaam putkopje
Linyphiidae	<i>Micrargus</i>	<i>subaequalis</i>	(Westring, 1851)		Plat putkopje
Linyphiidae	<i>Microctenonyx</i>	<i>subitaneus</i>	(O. P.-Cambridge, 1875)		Tuingroefkopje
Linyphiidae	<i>Microlinyphia</i>	<i>impigra</i>	(O. P.-Cambridge, 1871)		Zweephangmatspin
Linyphiidae	<i>Microlinyphia</i>	<i>pusilla</i>	(Sundevall, 1830)		Kleine heidehangmatspin
Linyphiidae	<i>Microneta</i>	<i>viaria</i>	(Blackwall, 1841)		Lentestrooiselspin
Linyphiidae	<i>Minicia</i>	<i>marginella</i>	(Wider, 1834)		Behaard ballonkopje
Linyphiidae	<i>Minyriolus</i>	<i>pusillus</i>	(Wider, 1834)		Deukkopje
Linyphiidae	<i>Mioxena</i>	<i>blanda</i>	(Simon, 1884)		Bleek dwergspinnetje
Linyphiidae	<i>Moebelia</i>	<i>penicillata</i>	(Westring, 1851)		Schorsdwergspin
Linyphiidae	<i>Monocephalus</i>	<i>castaneipes</i>	(Simon, 1884)		Breed groefkopje
Linyphiidae	<i>Monocephalus</i>	<i>fuscipes</i>	(Blackwall, 1836)		Smal groefkopje
Linyphiidae	<i>Nematogmus</i>	<i>sanguinolentus</i>	(Walckenaer, 1842)		Bleek tepelpalpje
Linyphiidae	<i>Neriere</i>	<i>clathrata</i>	(Sundevall, 1830)		Kruidhangmatspin
Linyphiidae	<i>Neriere</i>	<i>emphana</i>	(Walckenaer, 1842)		Zwartstuithangmatspin
Linyphiidae	<i>Neriere</i>	<i>furtiva</i>	(O. P.-Cambridge, 1871)		Steppehangmatspin
Linyphiidae	<i>Neriere</i>	<i>hammeni</i>	(van Helsdingen, 1963)		Van der Hammens hangmatspin
Linyphiidae	<i>Neriere</i>	<i>montana</i>	(Clerck, 1757)		Lentehangmatspin
Linyphiidae	<i>Neriere</i>	<i>peltata</i>	(Wider, 1834)		Struikhangmatspin
Linyphiidae	<i>Neriere</i>	<i>radiata</i>	(Walckenaer, 1842)		Zomerhangmatspin
Linyphiidae	<i>Notioscopus</i>	<i>sarcinatus</i>	(O. P.-Cambridge, 1872)		Spleetkopje

Familie	Genus	Soort	Auteur	Veranderingen	Nederlandse naam
Linyphiidae	<i>Nusoncus</i>	<i>nasutus</i>	Schenkel, 1925		Neusgroefkopje
Linyphiidae	<i>Obscuriphantes</i>	<i>obscurus</i>	(Blackwall, 1841)		Dolkwevertje
Linyphiidae	<i>Oedothorax</i>	<i>agrestis</i>	(Blackwall, 1853)		Gewone akkerdwergspin
Linyphiidae	<i>Oedothorax</i>	<i>apicatus</i>	(Blackwall, 1850)		Knobbelakkerdwergspin
Linyphiidae	<i>Oedothorax</i>	<i>fuscus</i>	(Blackwall, 1834)		Gewone velddwergspin
Linyphiidae	<i>Oedothorax</i>	<i>gibbosus</i>	(Blackwall, 1841)		Bultvelddwergspin
Linyphiidae	<i>Oedothorax</i>	<i>retusus</i>	(Westring, 1851)		Bolkopvelddwergspin
Linyphiidae	<i>Oreonetides</i>	<i>quadridentata</i>	(Wunderlich, 1972)	Baert <i>et al.</i> , 2012; <i>O. quadridentatus</i>	Viertandhangmatspin
Linyphiidae	<i>Oreonetides</i>	<i>vaginata</i>	(Thorell, 1872)	<i>O. vaginatus</i>	Rechthoekhangmatspin
Linyphiidae	<i>Oryphantes</i>	<i>angulatus</i>	(O. P.-Cambridge, 1881)		Hoogveenbodemwevertje
Linyphiidae	<i>Ostearius</i>	<i>melanopygius</i>	(O. P.-Cambridge, 1879)		Zwartgatje
Linyphiidae	<i>Palliduphantes</i>	<i>ericaeus</i>	(Blackwall, 1853)		Heidebodemwevertje
Linyphiidae	<i>Palliduphantes</i>	<i>insignis</i>	(O. P.-Cambridge, 1913)		Sikkelbodemwevertje
Linyphiidae	<i>Palliduphantes</i>	<i>pallidus</i>	(O. P.-Cambridge, 1871)		Geknot bodemwevertje
Linyphiidae	<i>Panamomops</i>	<i>sulcifrons</i>	(Wider, 1834)		Gewoon stierekopje
Linyphiidae	<i>Parapelecopsis</i>	<i>nemoraloides</i>	(O. P.-Cambridge, 1884)		Gegroefd zusterballonkopje
Linyphiidae	<i>Parapelecopsis</i>	<i>nemoralis</i>	(Blackwall, 1841)		Gegroefd ballonkopje
Linyphiidae	<i>Pelecopsis</i>	<i>elongata</i>	(Wider, 1834)		Accidentje
Linyphiidae	<i>Pelecopsis</i>	<i>mengei</i>	(Simon, 1884)		Griendoeverballonkopje
Linyphiidae	<i>Pelecopsis</i>	<i>parallela</i>	(Wider, 1834)		Neusballonkopje
Linyphiidae	<i>Pelecopsis</i>	<i>radicicola</i>	(L. Koch, 1872)		Bescheiden ballonkopje
Linyphiidae	<i>Peponocranium</i>	<i>ludicrum</i>	(O. P.-Cambridge, 1861)		Heideballonkopje
Linyphiidae	<i>Peponocranium</i>	<i>orbiculatum</i>	(O. P.-Cambridge, 1882)		Mosballonkopje
Linyphiidae	<i>Pityohyphantes</i>	<i>phrygianus</i>	(C.L. Koch, 1836)		Lepelhangmatspin
Linyphiidae	<i>Pocadicnemis</i>	<i>juncea</i>	Locket & Millidge, 1953		Bleek heidegroefkopje
Linyphiidae	<i>Pocadicnemis</i>	<i>pumila</i>	(Blackwall, 1841)		Bleek bosgroefkopje
Linyphiidae	<i>Poeciloneta</i>	<i>variegata</i>	(Blackwall, 1841)		Bont wevertje
Linyphiidae	<i>Porrhomma</i>	<i>campbelli</i>	F.O. P.-Cambridge, 1894		Campbells kleinoogje
Linyphiidae	<i>Porrhomma</i>	<i>cambridgei</i>	Merrett, 1994	Van Keer <i>et al.</i> , 2016	Cambridges kleinoogje
Linyphiidae	<i>Porrhomma</i>	<i>convexum</i>	(Westring, 1851)		Grondkleinoogje
Linyphiidae	<i>Porrhomma</i>	<i>egeria</i>	Simon, 1884		Kelderkleinoogje
Linyphiidae	<i>Porrhomma</i>	<i>errans</i>	(Blackwall, 1841)		Boskleinoogje
Linyphiidae	<i>Porrhomma</i>	<i>microcavense</i>	Wunderlich, 1990		Molkleinoogje
Linyphiidae	<i>Porrhomma</i>	<i>microphthalmum</i>	(O. P.-Cambridge, 1871)		Auronautkleinoogje
Linyphiidae	<i>Porrhomma</i>	<i>montanum</i>	Jackson, 1913		Glad kleinoogje
Linyphiidae	<i>Porrhomma</i>	<i>myops</i>	Simon, 1884		Bergkleinoogje
Linyphiidae	<i>Porrhomma</i>	<i>oblitum</i>	(O. P.-Cambridge, 1871)		Vergeten kleinoogje
Linyphiidae	<i>Porrhomma</i>	<i>pallidum</i>	Jackson, 1913		Bleek kleinoogje
Linyphiidae	<i>Porrhomma</i>	<i>pygmaeum</i>	(Blackwall, 1834)		Gewoon kleinoogje
Linyphiidae	<i>Porrhomma</i>	<i>rosenhaueri</i>	(L. Koch, 1872)		Grotkleinoogje
Linyphiidae	<i>Praestigia</i>	<i>duffeyi</i>	(Millidge, 1954)		Klokspinnetje
Linyphiidae	<i>Prinerigone</i>	<i>vagans</i>	(Audouin, 1826)		Moerasdwergspin
Linyphiidae	<i>Pseudocarorita</i>	<i>thaleri</i>	(Saaristo, 1971)		Thalers dwergspin
Linyphiidae	<i>Pseudomaro</i>	<i>aenigmaticus</i>	Denis, 1966		Feministje

Familie	Genus	Soort	Auteur	Veranderingen	Nederlandse naam
Linyphiidae	<i>Saaristoa</i>	<i>abnormis</i>	(Blackwall, 1841)		Driepunthangmatspin
Linyphiidae	<i>Saaristoa</i>	<i>firma</i>	(O. P.-Cambridge, 1900)		Driehoekhangmatspin
Linyphiidae	<i>Saloca</i>	<i>diceros</i>	(O. P.-Cambridge, 1871)		Gehoordnd sierkopje (Moerasbossierkopje)
Linyphiidae	<i>Satilatlas</i>	<i>britteni</i>	(Jackson, 1913)		Donker Dwergstekelpootje
Linyphiidae	<i>Sauron</i>	<i>rayi</i>	(Simon, 1881)		Duivelspinnetje
Linyphiidae	<i>Savignia</i>	<i>frontata</i>	Blackwall, 1833		Torenkopje
Linyphiidae	<i>Silometopus</i>	<i>ambiguus</i>	(O.P.-Cambridge, 1905)		Elegant putkopje
Linyphiidae	<i>Silometopus</i>	<i>bonessi</i>	Casemir, 1970		Hoogveengroefkopje
Linyphiidae	<i>Silometopus</i>	<i>elegans</i>	(O. P.-Cambridge, 1872)		Elegant groefkopje
Linyphiidae	<i>Silometopus</i>	<i>incurvatus</i>	(O. P.-Cambridge, 1873)		Oranje heideputkopje
Linyphiidae	<i>Silometopus</i>	<i>reussi</i>	(Thorell, 1871)		Plat groefkopje
Linyphiidae	<i>Sintula</i>	<i>corniger</i>	(Blackwall, 1856)		Hoorndpalpje
Linyphiidae	<i>Stemonyphantes</i>	<i>lineatus</i>	(Linnaeus, 1758)		Paardekopje
Linyphiidae	<i>Styloctetor</i>	<i>romanus</i>	(O. P.-Cambridge, 1872)		Elegant dwergspinnetje
Linyphiidae	<i>Styloctetor</i>	<i>compar</i>	(Westring, 1861)	<i>S. stativus</i>	Bosplaatkopje
Linyphiidae	<i>Syedra</i>	<i>gracilis</i>	(Menge, 1869)		Weideplaatkopje
Linyphiidae	<i>Tallusia</i>	<i>experta</i>	(O. P.-Cambridge, 1871)		Wimpelpalpje
Linyphiidae	<i>Tapinocyba</i>	<i>biscissa</i>	(O. P.-Cambridge, 1872)		Gevorkt groefkopje
Linyphiidae	<i>Tapinocyba</i>	<i>insecta</i>	(L. Koch, 1869)		Bleek weidegroefkopje
Linyphiidae	<i>Tapinocyba</i>	<i>pallens</i>	(O. P.-Cambridge, 1872)		Bleek mosgroefkopje
Linyphiidae	<i>Tapinocyba</i>	<i>praecox</i>	(O. P.-Cambridge, 1873)		Puntig groefkopje
Linyphiidae	<i>Tapinocyboides</i>	<i>pygmaeus</i>	(Menge, 1869)		Dwerggroefkopje
Linyphiidae	<i>Tapinopa</i>	<i>longidens</i>	(Wider, 1834)		Langtandje
Linyphiidae	<i>Taranucnus</i>	<i>setosus</i>	(O.P.Cambridge 1863)		Sikkelpalpje
Linyphiidae	<i>Tenuiphantes</i>	<i>alacris</i>	(Blackwall, 1853)		Ardennenwevertje
Linyphiidae	<i>Tenuiphantes</i>	<i>cristatus</i>	(Menge, 1866)		Knobbelpalpwevertje
Linyphiidae	<i>Tenuiphantes</i>	<i>flavipes</i>	(Blackwall, 1854)		Zwart wevertje
Linyphiidae	<i>Tenuiphantes</i>	<i>mengei</i>	(Kulczynski, 1887)		Veldwevertje
Linyphiidae	<i>Tenuiphantes</i>	<i>tenebricola</i>	(Wider, 1834)		Schaduwwevertje
Linyphiidae	<i>Tenuiphantes</i>	<i>tenuis</i>	(Blackwall, 1852)		Bodemwevertje
Linyphiidae	<i>Tenuiphantes</i>	<i>zimmermanni</i>	(Bertkau, 1890)		Boswevertje
Linyphiidae	<i>Theonina</i>	<i>cornix</i>	(Simon, 1881)		Dubbelknotsje
Linyphiidae	<i>Thyreosthenius</i>	<i>biovatus</i>	(O. P.-Cambridge, 1875)		Miergroefkopje
Linyphiidae	<i>Thyreosthenius</i>	<i>parasiticus</i>	(Westring, 1851)		Bodemgroefkopje
Linyphiidae	<i>Tiso</i>	<i>vagans</i>	(Blackwall, 1834)		Krulpalpje
Linyphiidae	<i>Tmeticus</i>	<i>affinis</i>	(Blackwall, 1855)		Wrattenkaakje
Linyphiidae	<i>Trematocephalus</i>	<i>cristatus</i>	(Wider, 1834)		Doorkijkkopje
Linyphiidae	<i>Trichoncus</i>	<i>hackmani</i>	Millidge, 1956		Strandkontrastpootje
Linyphiidae	<i>Trichoncus</i>	<i>saxicola</i>	(O. P.-Cambridge, 1861)		Gevorkt kontrastpootje
Linyphiidae	<i>Trichopterna</i>	<i>cito</i>	(O. P.-Cambridge, 1872)		Stekelloos putkopje
Linyphiidae	<i>Trichopternoides</i>	<i>thorelli</i>	(Westring, 1861)		Moeraswevertje
Linyphiidae	<i>Troxochrus</i>	<i>cirrifrons</i>	(O. P.-Cambridge, 1871)		Harig groefkopje
Linyphiidae	<i>Troxochrus</i>	<i>scabriculus</i>	(Westring, 1851)		Griendwevertje

Familie	Genus	Soort	Auteur	Veranderingen	Nederlandse naam
Linyphiidae	<i>Typhochrestus</i>	<i>digitatus</i>	(O. P.-Cambridge, 1872)		Klein wevertje
Linyphiidae	<i>Typhochrestus</i>	<i>simoni</i>	Lessert, 1907		Getand groefkopje
Linyphiidae	<i>Walckenaeria</i>	<i>acuminata</i>	Blackwall, 1833		Periskoopspinnetje
Linyphiidae	<i>Walckenaeria</i>	<i>alticeps</i>	(Denis, 1952)		Gehoordnd schaduwduubbelkopje
Linyphiidae	<i>Walckenaeria</i>	<i>antica</i>	(Wider, 1834)		Duinvoorkopje
Linyphiidae	<i>Walckenaeria</i>	<i>atrotibialis</i>	(O. P.-Cambridge, 1878)		Gewoon contrastpootje
Linyphiidae	<i>Walckenaeria</i>	<i>capito</i>	(Westring, 1861)		Bol dubbelkopje
Linyphiidae	<i>Walckenaeria</i>	<i>corniculans</i>	(O. P.-Cambridge, 1875)		Harig knobbelsierkopje
Linyphiidae	<i>Walckenaeria</i>	<i>cucullata</i>	(C.L. Koch, 1836)		Dubbelsierkopje
Linyphiidae	<i>Walckenaeria</i>	<i>cuspidata</i>	Blackwall, 1833		Klein knobbelsierkopje
Linyphiidae	<i>Walckenaeria</i>	<i>dysderoides</i>	(Wider, 1834)		Wratsierkopje
Linyphiidae	<i>Walckenaeria</i>	<i>furcillata</i>	(Menge, 1869)		Gespleten doorkijkkopje
Linyphiidae	<i>Walckenaeria</i>	<i>incisa</i>	(O. P.-Cambridge, 1871)		Oogsierkopje
Linyphiidae	<i>Walckenaeria</i>	<i>kochi</i>	(O. P.-Cambridge, 1872)		Tweeknopje
Linyphiidae	<i>Walckenaeria</i>	<i>mitrata</i>	(Menge, 1868)		Mijtertje
Linyphiidae	<i>Walckenaeria</i>	<i>monoceros</i>	(Wider, 1834)		Kuifje
Linyphiidae	<i>Walckenaeria</i>	<i>nodosa</i>	O. P.-Cambridge, 1873		Bolsierkopje
Linyphiidae	<i>Walckenaeria</i>	<i>nudipalpis</i>	(Westring, 1851)		Middelste vals sierkopje
Linyphiidae	<i>Walckenaeria</i>	<i>obtusa</i>	Blackwall, 1836		Groot vals sierkopje
Linyphiidae	<i>Walckenaeria</i>	<i>stylifrons</i>	(O. P.-Cambridge, 1875)		Plat sierkopje
Linyphiidae	<i>Walckenaeria</i>	<i>unicornis</i>	O. P.-Cambridge, 1861		Eenhoortje
Linyphiidae	<i>Walckenaeria</i>	<i>vigilax</i>	(Blackwall, 1853)		Klein vals sierkopje
Linyphiidae	<i>Wiehlea</i>	<i>calcarifera</i>	(Simon, 1884)		Bodemdwergspin
Liocranidae	<i>Agraecina</i>	<i>lineata</i>	(Simon, 1878)		Zuidelijke lantaarnspin
Liocranidae	<i>Agroeca</i>	<i>brunnea</i>	(Blackwall, 1833)		Grote lantaarnspin
Liocranidae	<i>Agroeca</i>	<i>cuprea</i>	Menge, 1873		Gouden lantaarnspin
Liocranidae	<i>Agroeca</i>	<i>dentigera</i>	Kulczynski, 1913		Dopheilantaarnspin
Liocranidae	<i>Agroeca</i>	<i>inopina</i>	O. P.-Cambridge, 1886		Donkere lantaarnspin
Liocranidae	<i>Agroeca</i>	<i>lusatica</i>	(L. Koch, 1875)		Duinlantaarnspin
Liocranidae	<i>Agroeca</i>	<i>proxima</i>	(O. P.-Cambridge, 1871)		Heidelantaarnspin
Liocranidae	<i>Apostenus</i>	<i>fuscus</i>	Westring, 1851		Mossluiper
Liocranidae	<i>Liocranoeca</i>	<i>striata</i>	(Kulczynski, 1882)		Gestreepte lantaarnspin
Liocranidae	<i>Liocranum</i>	<i>rupicola</i>	(Walckenaer, 1830)		Bonte steensluiper
Liocranidae	<i>Scotina</i>	<i>celans</i>	(Blackwall, 1841)		Bonte bodemzakspin
Liocranidae	<i>Scotina</i>	<i>gracilipes</i>	(Blackwall, 1859)		Langpootbodemzakspin
Liocranidae	<i>Scotina</i>	<i>palliardii</i>	(L. Koch, 1881)		Kleinste bodemzakspin
Lycosidae	<i>Alopecosa</i>	<i>barbipes</i>	(Sundevall, 1833)		Paaspanterspin
Lycosidae	<i>Alopecosa</i>	<i>cuneata</i>	(Clerck, 1757)		Dikpootpanterspin
Lycosidae	<i>Alopecosa</i>	<i>cursor</i>	(Hahn, 1831)		Zandpanterspin
Lycosidae	<i>Alopecosa</i>	<i>fabrilis</i>	(Clerck, 1757)		Grote panterspin
Lycosidae	<i>Alopecosa</i>	<i>farinosa</i>	(Herman, 1872)	<i>A. accentuata</i>	Pinksterpanterspin
Lycosidae	<i>Alopecosa</i>	<i>inquilina</i>	(Clerck, 1757)		Bergpanterspin
Lycosidae	<i>Alopecosa</i>	<i>pulverulenta</i>	(Clerck, 1757)		Gewone panterspin
Lycosidae	<i>Alopecosa</i>	<i>striatipes</i>	(C.L. Koch, 1839)		Streeppootpanterspin
Lycosidae	<i>Alopecosa</i>	<i>trabalis</i>	(Clerck, 1757)		Geelborstpanterspin

Familie	Genus	Soort	Auteur	Veranderingen	Nederlandse naam
Lycosidae	<i>Arctosa</i>	<i>cinerea</i>	(Fabricius, 1777)		Grindwolfspin
Lycosidae	<i>Arctosa</i>	<i>figurata</i>	(Simon, 1876)		Grote zandwolfspin
Lycosidae	<i>Arctosa</i>	<i>leopardus</i>	(Sundevall, 1833)		Moswolfspin
Lycosidae	<i>Arctosa</i>	<i>lutetiana</i>	(Simon, 1876)		Leliewolfspin
Lycosidae	<i>Arctosa</i>	<i>perita</i>	(Latreille, 1799)		Gewone zandwolfspin
Lycosidae	<i>Aulonia</i>	<i>albimana</i>	(Walckenaer, 1805)		Withandje
Lycosidae	<i>Hygrolycosa</i>	<i>rubrofasciata</i>	(Ohlert, 1865)		Trommelwolfspin
Lycosidae	<i>Pardosa</i>	<i>agrestis</i>	(Westring, 1861)		Steenwolfspin
Lycosidae	<i>Pardosa</i>	<i>agricola</i>	(Thorell, 1856)		Ruigtewolfspin
Lycosidae	<i>Pardosa</i>	<i>alacris</i>	(C.L. Koch, 1833)		Roodpolsbosspin
Lycosidae	<i>Pardosa</i>	<i>amentata</i>	(Clerck, 1757)		Tuinwolfspin
Lycosidae	<i>Pardosa</i>	<i>bifasciata</i>	(C.L. Koch, 1834)		Gestreepte wolfspin
Lycosidae	<i>Pardosa</i>	<i>hortensis</i>	(Thorell, 1872)		Geelarpje
Lycosidae	<i>Pardosa</i>	<i>lugubris</i>	(Walckenaer, 1802)		Zwartstaartboswolfspin
Lycosidae	<i>Pardosa</i>	<i>monticola</i>	(Clerck, 1757)		Duinwolfspin
Lycosidae	<i>Pardosa</i>	<i>nigriceps</i>	(Thorell, 1856)		Graswolfspin
Lycosidae	<i>Pardosa</i>	<i>oreophila</i>	Simon, 1937		Bergwolfspin
Lycosidae	<i>Pardosa</i>	<i>paludicola</i>	(Clerck, 1757)		Veenwolfspin
Lycosidae	<i>Pardosa</i>	<i>palustris</i>	(Linnaeus, 1758)		Moeraswolfspin
Lycosidae	<i>Pardosa</i>	<i>pratīvaga</i>	(L. Koch, 1870)		Oeverwolfspin
Lycosidae	<i>Pardosa</i>	<i>proxima</i>	(C.L. Koch, 1847)		Veldwolfspin
Lycosidae	<i>Pardosa</i>	<i>pullata</i>	(Clerck, 1757)		Gewone wolfspin
Lycosidae	<i>Pardosa</i>	<i>purbeckensis</i>	F.O. P.-Cambridge	<i>P. agrestis purbeckensis</i>	Schorrewolfspin
Lycosidae	<i>Pardosa</i>	<i>saltans</i>	Töpfer-Hofmann, 2000		Zwarthandboswolfspin
Lycosidae	<i>Pardosa</i>	<i>sphagnicola</i>	(Dahl, 1908)		Veenmoswolfspin
Lycosidae	<i>Pirata</i>	<i>piraticus</i>	(Clerck, 1757)		Poelpiraat
Lycosidae	<i>Pirata</i>	<i>piscatorius</i>	(Clerck, 1757)		Grote piraat
Lycosidae	<i>Pirata</i>	<i>tenuitarsis</i>	Simon, 1876		Veenpiraat
Lycosidae	<i>Piratula</i>	<i>hygrophila</i>	(Thorell, 1872)	<i>Pirata</i> h.	Bospiraat
Lycosidae	<i>Piratula</i>	<i>knorri</i>	(Scopoli, 1763)	<i>Pirata</i> k.	Beekpiraat
Lycosidae	<i>Piratula</i>	<i>latitans</i>	(Blackwall, 1841)	<i>Pirata</i> l.	Kleine piraat
Lycosidae	<i>Piratula</i>	<i>uliginosa</i>	(Thorell, 1856)	<i>Pirata</i> u.	Heidepiraat
Lycosidae	<i>Trochosa</i>	<i>robusta</i>	(Simon, 1876)		Grote nachtwolfspin
Lycosidae	<i>Trochosa</i>	<i>ruricola</i>	(De Geer, 1778)		Veldnachtwolfspin
Lycosidae	<i>Trochosa</i>	<i>spinipalpis</i>	(F.O. P.-Cambridge, 1895)		Gestekelde nachtwolfspin
Lycosidae	<i>Trochosa</i>	<i>terricola</i>	Thorell, 1856		Gewone nachtwolfspin
Lycosidae	<i>Xerolycosa</i>	<i>miniata</i>	(C.L. Koch, 1834)		Duinwolfspin (Kustwolfspin)
Lycosidae	<i>Xerolycosa</i>	<i>nemoralis</i>	(Westring, 1861)		Stepwolfspin (Bosrandwolfspin)
Mimetidae	<i>Ero</i>	<i>aphana</i>	(Walckenaer, 1802)		Vierspitsspinneneter
Mimetidae	<i>Ero</i>	<i>cambridgei</i>	Kulczynski, 1911		Cambridges spinneneter
Mimetidae	<i>Ero</i>	<i>furcata</i>	(Villers, 1789)		Gevorkte spinneneter
Mimetidae	<i>Ero</i>	<i>tuberculata</i>	(De Geer, 1778)		Grote spinneneter
Miturgidae	<i>Zora</i>	<i>nemoralis</i>	(Blackwall, 1861)	Transfer van Zoridae	Donkere stekelpoot
Miturgidae	<i>Zora</i>	<i>parallela</i>	Simon, 1878	Transfer van Zoridae	Gestreepte stekelpoot
Miturgidae	<i>Zora</i>	<i>pardalis</i>	Simon, 1878	Transfer van Zoridae	Panterstekelpoot
Miturgidae	<i>Zora</i>	<i>silvestris</i>	Kulczynski, 1897	Transfer van Zoridae	Bosstekelpoot
Miturgidae	<i>Zora</i>	<i>spinimana</i>	(Sundevall, 1833)	Transfer van Zoridae	Gewone stekelpoot
Nesticidae	<i>Nesticus</i>	<i>cellulanus</i>	(Clerck, 1757)		Holenspin
Oonopidae	<i>Oonops</i>	<i>domesticus</i>	Dalmas, 1916		Huidwergesoog
Oonopidae	<i>Oonops</i>	<i>pulcher</i>	Templeton, 1835		Gewone dwergesoog
Oonopidae	<i>Tapinesthes</i>	<i>inermis</i>	(Simon, 1882)		Klimopdwergesoog

Familie	Genus	Soort	Auteur	Veranderingen	Nederlandse naam
Oxyopidae	<i>Oxyopes</i>	<i>heterophthalmus</i>	(Latreille, 1804)		Gewone lynxspin (Gutspalplynxspin)
Oxyopidae	<i>Oxyopes</i>	<i>lineatus</i>	Latreille, 1806		Gestreepte lynxspin
Oxyopidae	<i>Oxyopes</i>	<i>ramosus</i>	(Martini & Goeze, 1778)		Prachtlynxspin
Philodromidae	<i>Philodromus</i>	<i>albidus</i>	Kulczynski, 1911		Bleke rensin
Philodromidae	<i>Philodromus</i>	<i>aureolus</i>	(Clerck, 1757)		Tuinrensin
Philodromidae	<i>Philodromus</i>	<i>buxi</i>	Simon, 1884		Buxusrensin
Philodromidae	<i>Philodromus</i>	<i>cespitem</i>	(Walckenaer, 1802)		Gewone rensin
Philodromidae	<i>Philodromus</i>	<i>collinus</i>	C.L. Koch, 1835		Dennenrensin
Philodromidae	<i>Philodromus</i>	<i>dispar</i>	Walckenaer, 1826		Zwartrugrensin
Philodromidae	<i>Philodromus</i>	<i>emarginatus</i>	(Schrank, 1803)		Grauwe rensin
Philodromidae	<i>Philodromus</i>	<i>fuscomarginatus</i>	(De Geer, 1778)	Van Keer & Van der Krieken, in voorb.	Schorsrensin
Philodromidae	<i>Philodromus</i>	<i>margaritatus</i>	(Clerck, 1757)		Korstmosspin
Philodromidae	<i>Philodromus</i>	<i>praedatus</i>	O. P.-Cambridge, 1871		Boomrensin
Philodromidae	<i>Philodromus</i>	<i>rufus</i>	Walckenaer, 1826		Bonte rensin
Philodromidae	<i>Rhysodromus</i>	<i>fallax</i>	(Sundevall, 1833)	<i>Philodromus f.</i>	Kustrensin
Philodromidae	<i>Rhysodromus</i>	<i>histrion</i>	(Latreille, 1819)	<i>Philodromus h.</i>	Heiderensin
Philodromidae	<i>Thanatus</i>	<i>arenarius</i>	L. Koch, 1872		Zandrensin
Philodromidae	<i>Thanatus</i>	<i>formicinus</i>	(Clerck, 1757)		Grote rensin
Philodromidae	<i>Thanatus</i>	<i>striatus</i>	C.L. Koch, 1845		Duinrensin
Philodromidae	<i>Tibellus</i>	<i>maritimus</i>	(Menge, 1875)		Stippelsprietspin
Philodromidae	<i>Tibellus</i>	<i>oblongus</i>	(Walckenaer, 1802)		Gewone sprietspin
Pholcidae	<i>Pholcus</i>	<i>phalangoides</i>	(Fuesslin, 1775)		Grote trilspin (Hooiwagenspin)
Pholcidae	<i>Psilochorus</i>	<i>simoni</i>	(Berland, 1911)		Kleine trilspin
Phrurolithidae	<i>Phrurolithus</i>	<i>festivus</i>	(C.L. Koch, 1835)	Transfer van Corinnidae	Bonte fruroliet
Phrurolithidae	<i>Phrurolithus</i>	<i>minimus</i>	C.L. Koch, 1839	Transfer van Corinnidae	Kleine fruroliet
Pisauridae	<i>Dolomedes</i>	<i>fimbriatus</i>	(Clerck, 1757)		Gerande oeverspin
Pisauridae	<i>Dolomedes</i>	<i>plantarius</i>	(Clerck, 1757)		Grote oeverspin
Pisauridae	<i>Pisaura</i>	<i>mirabilis</i>	(Clerck, 1757)		Kraamwebspin (Grote wolfspin)
Salticidae	<i>Aelurillus</i>	<i>v-insignitus</i>	(Clerck, 1757)		V-vlekspringspin
Salticidae	<i>Attulus</i>	<i>distinguendus</i>	(Simon, 1868)	<i>Sitticus d.</i>	Kustspringspin
Salticidae	<i>Attulus</i>	<i>saltator</i>	(O. P.-Cambridge, 1868)	<i>Sitticus s.</i>	Zandspringspin
Salticidae	<i>Ballus</i>	<i>chalybeius</i>	(Walckenaer, 1802)		Eikenpringspin
Salticidae	<i>Dendryphantus</i>	<i>rudis</i>	(Sundevall, 1833)		Glanzende dennenspringer
Salticidae	<i>Euophrys</i>	<i>frontalis</i>	(Walckenaer, 1802)		Gewone Zwartkop(springspin)
Salticidae	<i>Evarcha</i>	<i>arcuata</i>	(Clerck, 1757)		Bonte grasspringspin
Salticidae	<i>Evarcha</i>	<i>falcata</i>	(Clerck, 1757)		Bonte springspin
Salticidae	<i>Evarcha</i>	<i>michaelovi</i>	Logunov, 1992	<i>E. laetabunda</i>	Kempense grasspringspin
Salticidae	<i>Heliophanus</i>	<i>aeneus</i>	(Hahn, 1832)		Rechte blinker
Salticidae	<i>Heliophanus</i>	<i>auratus</i>	C.L. Koch, 1835		Moerasblinker
Salticidae	<i>Heliophanus</i>	<i>cupreus</i>	(Walckenaer, 1802)		Gehaakte blinker
Salticidae	<i>Heliophanus</i>	<i>dampfi</i>	Schenkel, 1923		Hoogveenblinker
Salticidae	<i>Heliophanus</i>	<i>dubius</i>	C.L. Koch, 1835		Gevlekte blinker
Salticidae	<i>Heliophanus</i>	<i>flavipes</i>	(Hahn, 1832)		Gewone blinker
Salticidae	<i>Heliophanus</i>	<i>kochii</i>	Simon, 1868		Koch's blinker
Salticidae	<i>Heliophanus</i>	<i>tribulosus</i>	Simon, 1868		Driepuntsblinker
Salticidae	<i>Leptorchestes</i>	<i>berolinensis</i>	(C.L. Koch, 1846)		Grote mierspringspin
Salticidae	<i>Macaroeris</i>	<i>nidicolens</i>	(Walckenaer, 1802)		Ovale dennenspringer

Familie	Genus	Soort	Auteur	Veranderingen	Nederlandse naam
Salticidae	<i>Marpissa</i>	<i>muscosa</i>	(Clerck, 1757)		Schorsmarpissa
Salticidae	<i>Marpissa</i>	<i>nivoyi</i>	(Lucas, 1846)		Helmmarpissa
Salticidae	<i>Marpissa</i>	<i>pomatia</i>	(Walckenaer, 1802)		Goudbandmarpissa
Salticidae	<i>Marpissa</i>	<i>radiata</i>	(Grube, 1859)		Rietmarpissa
Salticidae	<i>Myrmarachne</i>	<i>formicaria</i>	(De Geer, 1778)		Bosmierspringspin
Salticidae	<i>Neon</i>	<i>rayi</i>	(Simon, 1875)		Ray's neon
Salticidae	<i>Neon</i>	<i>reticulatus</i>	(Blackwall, 1853)		Gewone neon
Salticidae	<i>Neon</i>	<i>valentulus</i>	Falconer, 1912		Donkere neon
Salticidae	<i>Pellenes</i>	<i>tripunctatus</i>	(Walckenaer, 1802)		Driepuntspringspin
Salticidae	<i>Phlegra</i>	<i>fasciata</i>	(Hahn, 1826)		Gestreepte springspin
Salticidae	<i>Pseudeuophrys</i>	<i>erratica</i>	(Walckenaer, 1826)		Bruine zwartkop
Salticidae	<i>Pseudeuophrys</i>	<i>lanigera</i>	(Simon, 1871)		Huisspringspin
Salticidae	<i>Pseudicius</i>	<i>encarpatus</i>	(Walckenaer, 1802)		Sjirpspringspin
Salticidae	<i>Salticus</i>	<i>cingulatus</i>	(Panzer, 1797)		Boomzebraspin
Salticidae	<i>Salticus</i>	<i>scenicus</i>	(Clerck, 1757)		Huiszebraspin, Harlekijn
Salticidae	<i>Salticus</i>	<i>zebraneus</i>	(C.L. Koch, 1837)		Schorszebraspin
Salticidae	<i>Sibianor</i>	<i>aurocinctus</i>	(Ohlert, 1865)		Dikpootspringspin
Salticidae	<i>Sibianor</i>	<i>larae</i>	Logunov, 2001	Van Keer <i>et al.</i> , 2010	Roodkniepootspringspin
Salticidae	<i>Sittiflor</i>	<i>caricis</i>	(Westring, 1861)	<i>Sitticus c.</i>	Muisspringspin
Salticidae	<i>Sittiflor</i>	<i>floricola</i>	(C.L. Koch, 1837)	<i>Sitticus f.</i>	Gevlekte moerasspringer
Salticidae	<i>Sittipub</i>	<i>pubescens</i>	(Fabricius, 1775)	<i>Sitticus p.</i>	Harige springspin
Salticidae	<i>Synageles</i>	<i>hilarulus</i>	(C.L. Koch, 1846)		Kleine mierspringspin
Salticidae	<i>Synageles</i>	<i>venator</i>	(Lucas, 1836)		Slanke mierspringspin
Salticidae	<i>Talavera</i>	<i>aequipes</i>	(O. P.-Cambridge, 1871)		Ringpootzwartkop
Salticidae	<i>Talavera</i>	<i>aperta</i>	(Miller, 1971)		Zwartlijfzwartkop
Salticidae	<i>Talavera</i>	<i>petrensis</i>	(C.L. Koch, 1837)		Bergspringspin
Salticidae	<i>Talavera</i>	<i>thorelli</i>	(Kulczynski, 1891)		Thorell's zwartkop
Scytodidae	<i>Scytodes</i>	<i>thoracica</i>	(Latreille, 1802)		Getijgerde lijmspuit
Segestriidae	<i>Segestria</i>	<i>bavarica</i>	C.L. Koch, 1843		Muurzesoog
Segestriidae	<i>Segestria</i>	<i>florentina</i>	(Rossi, 1790)		Kerkzesoog
Segestriidae	<i>Segestria</i>	<i>senoculata</i>	(Linnaeus, 1758)		Boomzesoog
Sparassidae	<i>Micrommata</i>	<i>virescens</i>	(Clerck, 1757)		Groene jachtspin
Teragnathidae	<i>Meta</i>	<i>menardi</i>	(Latreille, 1804)		Gewone grottenspin
Teragnathidae	<i>Metellina</i>	<i>mengei</i>	(Blackwall, 1870)		Zomerwielwebspin
Teragnathidae	<i>Metellina</i>	<i>merianae</i>	(Scopoli, 1763)		Holenwielwebspin
Teragnathidae	<i>Metellina</i>	<i>segmentata</i>	(Clerck, 1757)		Herfstspin
Teragnathidae	<i>Pachygnatha</i>	<i>clercki</i>	Sundevall, 1823		Grote dikkaak
Teragnathidae	<i>Pachygnatha</i>	<i>degeeri</i>	Sundevall, 1830		Kleine dikkaak
Teragnathidae	<i>Pachygnatha</i>	<i>listeri</i>	Sundevall, 1830		Bosdikkaak
Teragnathidae	<i>Tetragnatha</i>	<i>dearmata</i>	Thorell, 1873		Noordse strekspin
Teragnathidae	<i>Tetragnatha</i>	<i>extensa</i>	(Linnaeus, 1758)		Gewone strekspin
Teragnathidae	<i>Tetragnatha</i>	<i>montana</i>	Simon, 1874		Schaduwstrekspin
Teragnathidae	<i>Tetragnatha</i>	<i>nigrita</i>	Lendl, 1886		Donkere strekspin
Teragnathidae	<i>Tetragnatha</i>	<i>obtusa</i>	C.L. Koch, 1837		Droogtestrekspin
Teragnathidae	<i>Tetragnatha</i>	<i>pinicola</i>	L. Koch, 1870		Dennenstrekspin
Teragnathidae	<i>Tetragnatha</i>	<i>reimoseri</i>	(Rosca, 1939)		Staartstrekspin
Teragnathidae	<i>Tetragnatha</i>	<i>striata</i>	L. Koch, 1862		Rietstrekspin
Theridiidae	<i>Anelosimus</i>	<i>pulchellus</i>	(Walckenaer, 1802)	<i>Seycellocesa p.</i>	Volkslanke kogelspin
Theridiidae	<i>Anelosimus</i>	<i>vittatus</i>	(C.L. Koch, 1836)	<i>Seycellocesa v.</i>	Slanke kogelspin
Theridiidae	<i>Asagena</i>	<i>phalerata</i>	(Panzer, 1801)		Heidesteatoda
Theridiidae	<i>Carniella</i>	<i>brignolii</i>	Thaler & Steinberger, 1988		Mysterius kogelspinnetje

Familie	Genus	Soort	Auteur	Veranderingen	Nederlandse naam
Theridiidae	<i>Crustulina</i>	<i>guttata</i>	(Wider, 1834)		Gevlekt raspspinnetje
Theridiidae	<i>Crustulina</i>	<i>sticta</i>	(O. P.-Cambridge, 1861)		Egaal raspspinnetje
Theridiidae	<i>Cryptachaea</i>	<i>riparia</i>	(Blackwall, 1834)		Bermkogelspin
Theridiidae	<i>Dipoena</i>	<i>erythropus</i>	(Simon, 1881)		Roodpootgalgspin
Theridiidae	<i>Dipoena</i>	<i>melanogaster</i>	(C.L. Koch, 1837)		Gemarmerde galgspin
Theridiidae	<i>Enoplognatha</i>	<i>caricis</i>	(Fickert, 1876)		Moerastandkaak
Theridiidae	<i>Enoplognatha</i>	<i>latimana</i>	Hippa & Oksala, 1982		Vergeten tandkaak
Theridiidae	<i>Enoplognatha</i>	<i>mordax</i>	(Thorell, 1875)		Schorrentandkaak
Theridiidae	<i>Enoplognatha</i>	<i>oelandica</i>	(Thorell, 1875)		Gemarmerde tandkaak
Theridiidae	<i>Enoplognatha</i>	<i>ovata</i>	(Clerck, 1757)		Gewone tandkaak
Theridiidae	<i>Enoplognatha</i>	<i>thoracica</i>	(Hahn, 1833)		Bodemtandkaak
Theridiidae	<i>Episinus</i>	<i>angulatus</i>	(Blackwall, 1836)		Gewone kabelspin
Theridiidae	<i>Episinus</i>	<i>maculipes</i>	Cavanna, 1876	Henrard, 2010	Vlekpootkabelspin
Theridiidae	<i>Episinus</i>	<i>truncatus</i>	Latreille, 1809		Egale kabelspin
Theridiidae	<i>Euryopis</i>	<i>flavomaculata</i>	(C.L. Koch, 1836)		GeelvlekJachtkogelspin
Theridiidae	<i>Euryopis</i>	<i>laeta</i>	(Westring, 1861)		Zuidelijke jachtkogelspin
Theridiidae	<i>Kochiura</i>	<i>aulica</i>	(C.L. Koch, 1838)		Schijfhandje
Theridiidae	<i>Lasaeola</i>	<i>coracina</i>	(C.L. Koch, 1837)	<i>Dipoena c.</i>	Witvoetgalgspin
Theridiidae	<i>Lasaeola</i>	<i>prona</i>	(Menge, 1868)		Neusgalgspin
Theridiidae	<i>Lasaeola</i>	<i>tristis</i>	(Hahn, 1833)		Zwarte galgspin
Theridiidae	<i>Neottiura</i>	<i>bimaculata</i>	(Linnaeus, 1767)		Witbandkogelspin
Theridiidae	<i>Paidiscura</i>	<i>pallens</i>	(Blackwall, 1834)		Kleine boskogelspin
Theridiidae	<i>Parasteatoda</i>	<i>lunata</i>	(Clerck, 1757)		Prachtkogelspin
Theridiidae	<i>Parasteatoda</i>	<i>simulans</i>	(Thorell, 1875)		Valse broeikasspin
Theridiidae	<i>Parasteatoda</i>	<i>tepidariorum</i>	(C.L. Koch, 1841)		Broeikasspin
Theridiidae	<i>Pholcomma</i>	<i>gibbum</i>	(Westring, 1851)		Pantserkogelspin
Theridiidae	<i>Phycosoma</i>	<i>inornatum</i>	(O. P.-Cambridge, 1861)		Zijden galgspin
Theridiidae	<i>Phylloneta</i>	<i>impressa</i>	L. Koch, 1881		Grote wigwamspin
Theridiidae	<i>Phylloneta</i>	<i>sisyphia</i>	(Clerck, 1757)		Kleine wigwamspin
Theridiidae	<i>Platnickina</i>	<i>tincta</i>	(Walckenaer, 1802)		Zwartringkogelspin
Theridiidae	<i>Robertus</i>	<i>arundineti</i>	(O. P.-Cambridge, 1871)		Moerasmolspin
Theridiidae	<i>Robertus</i>	<i>kuehnae</i>	Bauchhenss & Uhlenhaut, 1993		Kuhns molspin
Theridiidae	<i>Robertus</i>	<i>lividus</i>	(Blackwall, 1836)		Bosmolspin
Theridiidae	<i>Robertus</i>	<i>neglectus</i>	(O. P.-Cambridge, 1871)		Vergeten molspin
Theridiidae	<i>Robertus</i>	<i>scoticus</i>	Jackson, 1914		Noordse molspin
Theridiidae	<i>Rugathodes</i>	<i>bellicosus</i>	(Simon, 1873)		Bergkogelspin
Theridiidae	<i>Rugathodes</i>	<i>instabilis</i>	(O. P.-Cambridge, 1871)		Moeraskogelspin
Theridiidae	<i>Sardinidion</i>	<i>blackwalli</i>	(O. P.-Cambridge, 1871)		Stalkogelspin
Theridiidae	<i>Simitidion</i>	<i>simile</i>	(C.L. Koch, 1836)		Witvlekheidkogelspin
Theridiidae	<i>Steatoda</i>	<i>albomaculata</i>	(De Geer, 1778)		Gevlekte steatoda
Theridiidae	<i>Steatoda</i>	<i>bipunctata</i>	(Linnaeus, 1758)		Koffieboonspin
Theridiidae	<i>Steatoda</i>	<i>grossa</i>	(C.L. Koch, 1838)		Grote steatoda
Theridiidae	<i>Steatoda</i>	<i>triangulosa</i>	(Walckenaer, 1802)		Huissteatoda
Theridiidae	<i>Theonoe</i>	<i>minutissima</i>	(O. P.-Cambridge, 1879)		Kleinste kogelspin
Theridiidae	<i>Theridion</i>	<i>asopi</i>	Vanuytven, 2014	Vanuytven, 2014	Kierkogelspin
Theridiidae	<i>Theridion</i>	<i>familare</i>	O. P.-Cambridge, 1871		Rechthoekkogelspin

Familie	Genus	Soort	Auteur	Veranderingen	Nederlandse naam
Theridiidae	<i>Theridion</i>	<i>hannoniae</i>	Denis, 1945	Denis, 1944	Rotskogelspin
Theridiidae	<i>Theridion</i>	<i>hemerobium</i>	Simon, 1914		Rietkogelspin
Theridiidae	<i>Theridion</i>	<i>melanurum</i>	Hahn, 1831		Huiskogelspin
Theridiidae	<i>Theridion</i>	<i>mystaceum</i>	L. Koch, 1870		Donkere kogelspin
Theridiidae	<i>Theridion</i>	<i>pictum</i>	(Walckenaer, 1802)		Rood visgraatje
Theridiidae	<i>Theridion</i>	<i>pinastri</i>	L. Koch, 1872		Dennenkogelspin
Theridiidae	<i>Theridion</i>	<i>uhligi</i>	Martin, 1974		Uhlighs kogelspin
Theridiidae	<i>Theridion</i>	<i>varians</i>	Hahn, 1833		Gewoon visgraatje
Theridiosoma tidae	<i>Theridiosoma</i>	<i>gemmosum</i>	(L. Koch, 1877)		Moeraspareltje
Thomisidae	<i>Coriarachne</i>	<i>depressa</i>	(C.L. Koch, 1837)		Platte krabspin
Thomisidae	<i>Cozyptila</i>	<i>blackwalli</i>	Simon, 1875		Middenstreepbodemkrabspin
Thomisidae	<i>Diaea</i>	<i>dorsata</i>	(Fabricius, 1777)		Groene krabspin
Thomisidae	<i>Ebrechtella</i>	<i>tricuspidata</i>	(Fabricius, 1775)		Struikkameleonspin
Thomisidae	<i>Heriaeus</i>	<i>graminicola</i>	(Doleschall, 1852)		Haarkrabspin
Thomisidae	<i>Misumena</i>	<i>vatia</i>	(Clerck, 1757)		Gewone kameleonspin
Thomisidae	<i>Ozyptila</i>	<i>atomaria</i>	(Panzer, 1801)		Grote bodemkrabspin
Thomisidae	<i>Ozyptila</i>	<i>brevipes</i>	(Hahn, 1826)		Witrugbodemkrabspin
Thomisidae	<i>Ozyptila</i>	<i>clavata</i>	(Walckenaer, 1837)		Zwarte bodemkrabspin
Thomisidae	<i>Ozyptila</i>	<i>praticola</i>	(C.L. Koch, 1837)		Gewone Bodemkrabspin
Thomisidae	<i>Ozyptila</i>	<i>pullata</i>	(Thorell, 1875)		Kalkbodemspin
Thomisidae	<i>Ozyptila</i>	<i>rauda</i>	Simon, 1875	Janssen, 2013	Bergbodemkrabspin
Thomisidae	<i>Ozyptila</i>	<i>sanctuararia</i>	(O. P.-Cambridge, 1871)		Bleke bodemkrabspin
Thomisidae	<i>Ozyptila</i>	<i>scabricula</i>	(Westring, 1851)		Mierbodemkrabspin
Thomisidae	<i>Ozyptila</i>	<i>simplex</i>	(O. P.-Cambridge, 1862)		Bonte bodemkrabspin
Thomisidae	<i>Ozyptila</i>	<i>trux</i>	(Blackwall, 1846)		Grasbodemkrabspin
Thomisidae	<i>Ozyptila</i>	<i>westringi</i>	(Thorell, 1873)	Baert, in voorbereiding	Kwelderbodemkrabspin
Thomisidae	<i>Pistius</i>	<i>truncatus</i>	(Pallas, 1772)		Stompe krabspin
Thomisidae	<i>Synema</i>	<i>globosum</i>	(Fabricius, 1775)		Blinkende krabspin
Thomisidae	<i>Thomisus</i>	<i>onustus</i>	Walckenaer, 1805		Bloemkrabspin
Thomisidae	<i>Tmarus</i>	<i>piger</i>	(Walckenaer, 1802)		Schorskrabspin
Thomisidae	<i>Xysticus</i>	<i>acerbus</i>	Thorell, 1872		Heidekrabspin
Thomisidae	<i>Xysticus</i>	<i>audax</i>	(Schränk, 1803)		Tweelingkrabspin
Thomisidae	<i>Xysticus</i>	<i>bifasciatus</i>	C.L. Koch, 1837		Steppekrabspin
Thomisidae	<i>Xysticus</i>	<i>cristatus</i>	(Clerck, 1757)		Gewone krabspin
Thomisidae	<i>Xysticus</i>	<i>erraticus</i>	(Blackwall, 1834)		Graskrabspin
Thomisidae	<i>Xysticus</i>	<i>ferrugineus</i>	Menge, 1876		Roestkrabspin
Thomisidae	<i>Xysticus</i>	<i>kempeleni</i>	Thorell, 1872		Kempelin's krabspin
Thomisidae	<i>Xysticus</i>	<i>kochi</i>	Thorell, 1872		Kochs krabspin
Thomisidae	<i>Xysticus</i>	<i>lanio</i>	C.L. Koch, 1835		Boskkrabspin
Thomisidae	<i>Xysticus</i>	<i>lineatus</i>	(Westring, 1851)		Gestreepte krabspin
Thomisidae	<i>Xysticus</i>	<i>luctator</i>	L. Koch, 1870		Cambridges krabspin
Thomisidae	<i>Xysticus</i>	<i>luctuosus</i>	(Blackwall, 1836)		Woudkrabspin
Thomisidae	<i>Xysticus</i>	<i>ninnii</i>	Thorell, 1872		Duinkrabspin
Thomisidae	<i>Xysticus</i>	<i>robustus</i>	(Hahn, 1832)		Steenkrabspin
Thomisidae	<i>Xysticus</i>	<i>sabulosus</i>	(Hahn, 1832)		Zandkrabspin
Thomisidae	<i>Xysticus</i>	<i>striatipes</i>	L. Koch, 1870		Renkrabspin
Thomisidae	<i>Xysticus</i>	<i>ulmi</i>	(Hahn, 1831)		Moeraskrabspin
Titanoecidae	<i>Titanoeca</i>	<i>quadriguttata</i>	(Hahn, 1833)		Rotskaardespun
Trachelidae	<i>Cetonana</i>	<i>laticeps</i>	(Canestrini, 1868)	Transfer van Corinnidae	Schorssluiper
Uloboridae	<i>Hyptiotes</i>	<i>paradoxus</i>	(C.L. Koch, 1834)		Driehoekswebspin
Uloboridae	<i>Uloborus</i>	<i>walckenaerius</i>	Latreille, 1806		Wielwebkaardespun

Familie	Genus	Soort	Auteur	Veranderingen	Nederlandse naam
Zodariidae	<i>Zodarion</i>	<i>italicum</i>	(Canestrini, 1868)		Oranje mierenjager
Zodariidae	<i>Zodarion</i>	<i>rubidum</i>	Simon, 1914		Sepia mierenjager

In België gemelde soorten maar met onvolledige verspreidingsgegevens.
Nadere gegevens moeten nog worden gepubliceerd.

Familie	Genus	Soort	Auteur	Veranderingen	Nederlandse naam
Philodromidae	<i>Philodromus</i>	<i>buchari</i>	Kubcová, 2004	Van Dijck et al., 2001, <i>P. longipalpis</i>	Buchars renspin

Ingevoerde soorten die zich bij ons voortplanten

Familie	Genus	Soort	Auteur	Veranderingen	Nederlandse naam
Eutichuridae	<i>Cheiracanthium</i>	<i>mildei</i>	L. Koch, 1864		Gele spoorspin
Linyphiidae	<i>Mermessus</i>	<i>trilobatus</i>	(Emerton, 1892)		Drielobbige Amerikaanse dwergspin
Oecobiidae	<i>Oecobius</i>	<i>amboseli</i>	Shear & Benoit, 1974	Henrard et al., 2014	
Oecobiidae	<i>Oecobius</i>	<i>navus</i>	Blackwall, 1859		Huisspiraalspin
Pholcidae	<i>Crossopriza</i>	<i>lyoni</i>	(Blackwall, 1867)		Gepunte tropentrilspin
Pholcidae	<i>Holocnemus</i>	<i>pluchei</i>	Scopoli, 1763		Marmertilspin
Pholcidae	<i>Micropholcus</i>	<i>fauroti</i>	(Simon, 1887)		
Pholcidae	<i>Pholcus</i>	<i>opilionoides</i>	(Schrank, 1781)		Nistrilspin
Salticidae	<i>Hasarius</i>	<i>adansoni</i>	(Audouin, 1826)		Kasspringspin
Theridiidae	<i>Cryptachaea</i>	<i>blattea</i>	(Urquhart, 1886)	Van Keer, 2010; <i>C. acoreensis</i>	Kleine broeikaskogelspin
Uloboridae	<i>Uloborus</i>	<i>plumipes</i>	Lucas, 1846		Kaskaardespin
Zoropsidae	<i>Zoropsis</i>	<i>spinimana</i>	(Dufour, 1820)		Valse wolfspin

Ingevoerde soorten die zich bij ons niet voortplanten

Familie	Genus	Soort	Auteur	Veranderingen	Nederlandse naam
Agelenidae	<i>Tegenaria</i>	<i>fuesslini</i>	Pavesi, 1873	Van Der Krieken, 2011	
Amaurobiidae	<i>Amaurobius</i>	<i>erberi</i>	(Keyserling, 1863)	Waarnemingen.be 2013	Mediterrane kaardespin
Amaurobiidae	<i>Callobius</i>	<i>nomeus</i>	(Chamberlin, 19119)	Van Keer, 2014	

Familie	Genus	Soort	Auteur	Veranderingen	Nederlandse naam
Araneidae	<i>Neoscona</i>	<i>nautica</i>	(L. Koch, 1875)		Zeevaarderwielwebspin
Ctenidae	<i>Cupiennus</i>	<i>getazi</i>	Simon, 1891		Vlekpootbananenspin
Ctenidae	<i>Phoneutria</i>	<i>boliviensis</i>	(F. O. Pichard.- Cambridge, 1897)	Van Keer, 2015	Boliviaanse zwerfspin
Ctenidae	<i>Phoneutria</i>	<i>nigriventer</i>	(Keyserling, 1891)		Braziliaanse zwerfspin
Eutichuridae	<i>Cheiracanthium</i>	<i>furculatum</i>	Karsch, 1879	Bosselaers, 2013	
Hexathelidae	<i>Macrothele</i>	<i>calpeiana</i>	(Walckenaer, 1805)	Van Keer, 2010	Spaanse stierspin
Linyphiidae	<i>Erigone</i>	<i>dentosa</i>	(O.P.-Cambridge, 2013)	Kekenbosch & Baert, 2013	
Linyphiidae	<i>Mermessus</i>	<i>denticulatus</i>	(Crosby, 1924)		Amerikaanse Kasdwerfspin
Nephilidae	<i>Nephilengys</i>	<i>cruentata</i>	(Fabricius, 1775)		Heremietspin
Philodromidae	<i>Thanatus</i>	<i>vulgaris</i>	Simon, 1870	Kekenbosch, 2008	
Pholcidae	<i>Artema</i>	<i>atlanta</i>	Walckenaer, 1837		Reuzentrilspin
Pholcidae	<i>Spermophora</i>	<i>senoculata</i>	(Dugès, 1836)		Kogeltrilspin
Salticidae	<i>Evarcha</i>	<i>jucunda</i>	(Lucas, 1846)		Mediterrane grasspin
Salticidae	<i>Pellenes</i>	<i>geniculatus</i>	(Simon, 1868)		Witgerande springspin
Salticidae	<i>Plexippus</i>	<i>paykulli</i>	(Audouin, 1826)		Witbandspringspin
Salticidae	<i>Saitis</i>	<i>barbipes</i>	(Simon, 1868)		Baardpootspringspin
Selenopidae	<i>Selenops</i>	<i>radiatus</i>	Latreille, 1819		
Sparassidae	<i>Heteropoda</i>	<i>venatoria</i>	(Linnaeus, 1767)		Bananenspin
Theraphosidae	<i>Brachypelma</i>	<i>albopilosum</i>	Valerio, 1980		Krulhaarvogelspin
Theraphosidae	<i>Grammostola</i>	<i>rosea</i>	(Walckenaer, 1837)	Van Keer, 2010; G. cala	
Theraphosidae	<i>Phormictopus</i>	<i>cancerides</i>	(Latreille, 1806)	Van Keer, 2010	
Theridiidae	<i>Coleosoma</i>	<i>floridanum</i>	Banks, 1900	Van Keer, 2014	Cacaokogelspin
Theridiidae	<i>Cryptachaea</i>	<i>veruculata</i>	(Urquhart, 1886)		Australische kogelspin
Theridiidae	<i>Euryopis</i>	<i>episinoidea</i>	(Walckenaer, 1847)		Mediterraan kustkogelspinnetje
Theridiidae	<i>Hadrotarsus</i>	<i>ornatus</i>	Hickman, 1943		Tasmaans kogelspinnetje

Familie	Genus	Soort	Auteur	Veranderingen	Nederlandse naam
Theridiidae	<i>Latrodectus</i>	<i>geometricus</i>	C. L. Koch, 1841		Bruine weduwe
Theridiidae	<i>Latrodectus</i>	<i>hasselti</i>	Thorell, 1870		Redback
Theridiidae	<i>Latrodectus</i>	<i>mactans</i>	Fabricius, 1775		Amerikaanse Zwarte weduwe
Theridiidae	<i>Nesticodes</i>	<i>rufipes</i>	(Lucas, 1846)		Rode huisspin
Theridiidae	<i>Steatoda</i>	<i>nobilis</i>	(Thorell, 1875)	Van Keer, 2010	Reuzensteatoda
Theridiidae	<i>Steatoda</i>	<i>paykulliana</i>	(Walckenaer, 1806)	(Walckenaer, 1805)	Valse weduwe

Verslag van de 108^{ste} Vergadering van ARABEL: 29 april 2017, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (Vautierstraat 29, 1000 Brussel)

Aanwezig: Léon Baert, Rop Bosmans, Jan Bosselaers, Arthur Decae, Arnaud Henrard, Marc Janssen, Rudy Jocqué, Pierre Oger, Johan Van den Abeele, Johan Van Keer, Koen Van Keer.

Verontschuldigd: Christa Deeleman, Renaud Delfosse, Kevin Lambeets, Jorg Lambrechts, Peter Van Helsdingen.

De voorzitter opent de vergadering om 14.20 en heeft de volgende mededelingen.

1. Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd mits een amendement betreffende de voortzetting van het Atlas-project door F. Hendrickx.
2. Arnaud Henrard & Rop Bosmans: *Clubiona* in de Maghreb, een overzicht.
Het enorme genus *Clubiona* (614 soorten) is in de Maghreb slechts vertegenwoordigd door zeven soorten. Dit is wat overblijft na synonymisatie van de soorten die tot nu toe werden gemeld. Alle soorten zijn nu goed geïllustreerd zowel met tekeningen als met foto's. De soorten uit de *genevensis*-groep beschikken over een merkwaardige groep haren op het cymbium, hier prachtig geïllustreerd aan de hand van SEM-foto's.
3. Rudy Jocqué: Zin en onzin over spinnenbeten; getuigenis van een toxicoloog met meer dan 40 jaar ervaring. Op basis van de 40-jarige ervaring van Gerbus Muller, toxicoloog uit Z. Afrika, wordt de kennis over spinnenbeten uit de doeken gedaan. Kort samengevat blijkt dat er slechts twee types van spinnengif bestaan: neurotoxisch (*Latrodectus*, *Phoneutria*, *Atrax*) en cytotoxisch (*Loxosceles*, *Cheiracanthium*). Het aantal gevallen dat door huisdokters de diagnose 'spinnenbeet' meekrijgt blijkt voor 80 à 90 % veroorzaakt door één of andere aandoening.
4. Jan Bosselaers: "Aracon", een Filemaker gegevensbestand voor collectiebeheer. De auteur geeft een volledig overzicht van de zeer veelzijdige databank die hij heeft geconstrueerd in 'Filemaker Pro' voor het beheer van spinnencollecties. Deze applicatie biedt de mogelijkheid om de soorten in collectie te illustreren en om berekeningen te maken betreffende o.a. fenologie en diversiteit.
5. Rop Bosmans: Bespreking van het boek : An Introduction to the Wildlife of Cyprus. Edited by D. J. Sparrow & E. John. Terra Cypria. 870 pages. RB heeft meegewerkt aan het vermelde boek in de vorm van het hoofdstuk over spinachtigen en spinnen in het bijzonder.
6. Rop Bosmans: *Haplodrassus* in de Maghreb, een synopsis. Na determinatie en herdeterminatie van een groot aantal exemplaren uit het genus blijken zeven gekende soorten voor te komen in de Maghreb. Daarbij komen zeven nieuwe soorten zodat het aantal nu op 14 staat. Alle soorten zijn uitgebreid beschreven en geïllustreerd.
7. Varia.
 - Rop Bosmans: specimens van *Tegenaria atrica* en *T. saeva* worden door Rop verzameld en zullen naar G. Oxford opgestuurd worden ter studie.
 - Rop Bosmans vraagt aandacht voor een onderzoek naar grotten-spinnen op Europees niveau.
 - Rop Bosmans: de volgende ARABEL-excursie gaat naar de skiheuvel van de Blaarmeersen in Gent. Details volgen.
 - Koen Van Keer: de plannen voor het heidegebied met de *Eresus*-populatie krijgen vorm. Er zou een restgebied van 5 tot 11 ha gevrijwaard blijven.
 - Pierre Oger: vraagt assistentie voor het bemonsteren van het domein Han-sur-Lesse bij Rochefort in de loop van mei.

- Pierre Oger is geïnteresseerd in de gegevens van 'Les Marais d'Harchie' waar ARABEL ooit een excursie had.
- Jan Bosselaers: er zou op het Paaseiland een nieuwe soort *Latrodectus* gevonden zijn maar volgens Léon Baert die daar heeft gewerkt is het in alle waarschijnlijkheid *L. geometricus*.
- Jan Bosselaers: in de buurt van Almeria zou een nieuwe *Ero* gevonden zijn. Leden van de vereniging die ongedetermineerde Mimetidae hebben worden in die context gevraagd hun materiaal te herbekijken.
- Marc Janssen: twee nieuwe soorten voor Vlaanderen: *Piratula knorri* uit Moelingen (Voeren) en *Philodromus fuscomarginatus* te Hamont (Beverbeek).
- Arthur Decae: toont een foto van 2 soorten van *Chaetopelma* op Cyprus : *C. olivacea* (6 cm) en *C. karlamani* (1.5 cm). Het gaat resp. om de grootste en de kleinste mygalomorfe soort in Europa.

De volgende vergadering heeft plaats op 30 september 2017 in de zaal 'De Gerlache' in het KBIN.
De vergadering wordt gesloten om 16.45 u.

Rudy Jocqué (Secretaris)

Rop Bosmans (Voorzitter)

Rapport de la 108^{ème} réunion d'ARABEL : 29 avril 2017, à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (rue Vautier 29, 1000 Bruxelles)

Présents : Léon Baert, Rop Bosmans, Jan Bosselaers, Arthur Decae, Arnaud Henrard, Marc Janssen, Rudy Jocqué, Pierre Oger, Johan Van den Abeele, Johan Van Keer, Koen Van Keer.

Excusés: Christa Deeleman, Renaud Delfosse, Kevin Lambeets, Jorg Lambrechts, Peter Van Helsdingen.

Le président ouvre la réunion à 14h20.

1. Le rapport de la réunion précédente est approuvé
2. Arnaud Henrard & Rop Bosmans: *Clubiona* au Maghreb, un aperçu.
L'énorme genre *Clubiona* (614 espèces) n'est représenté au Maghreb que par sept espèces. C'est ce qui reste après une mise en synonymie de certaines espèces qui furent mentionnées jusqu'à ce jour. Toutes les espèces de cette région sont maintenant amplement illustrées avec des dessins et des photos. Les espèces du groupe *genevensis* sont pourvues d'un groupe de poils remarquables sur le cymbium, dont les auteurs présentent des photos SEM magnifiques.
3. Rudy Jocqué : Faits et fiction concernant les morsures d'araignées; témoignage de Gerbus Muller, toxicologue en Afrique du Sud avec plus de 40 ans d'expérience. En résumé : il n'y a que deux types de venin chez les araignées : neurotoxique (*Latrodectus*, *Phoneutria*, *Atrax*) et cytotoxique (*Loxosceles*, *Cheiracanthium*). Le nombre de cas recevant la diagnose 'morsure d'araignée' qui s'avèrent être d'une origine différente, s'élève à 80-90%.
4. Jan Bosselaers: "Aracon", une banque de données Filemaker pour la gestion de collections. L'auteur donne un aperçu de la base de données relativement complète qu'il a créée. Cette application donne la possibilité d'illustrer les espèces en collection ainsi que de mettre au point des graphiques concernant e. a. la phénologie ou la biodiversité.

5. Rop Bosmans: Présentation du livre: 'An Introduction to the Wildlife of Cyprus. Edited by D. J. Sparrow & E. John. Terra Cypria. 870 pages.'. RB a écrit le chapitre sur les arachnides et plus particulièrement les araignées pour ce livre.
6. Rop Bosmans: *Haplodrassus* au Maghreb, une vue d'ensemble. Après détermination et corrections d'un grand nombre d'exemplaires, sept espèces connues ont été répertoriées au Maghreb. Sept espèces inédites ont pu être ajoutées à la liste ce qui en résulte en 14 espèces pour la région. Toutes les espèces sont amplement illustrées et décrites.
7. Varia.
 - Rop Bosmans: les spécimens de *Tegenaria atrica* et *T. saeva* sont rassemblés par Rop et seront envoyés à G. Oxford pour étude.
 - Rop Bosmans attire l'attention sur une étude européenne sur les araignées des grottes.
 - Rop Bosmans: la prochaine excursion d'ARABEL sera en juin: la montagne de ski des Blaarmeersen à Gent. Les détails vont suivre.
 - Koen Van Keer: les plans pour la lande à bruyère avec *Eresus*; une parcelle de 5 à 11 ha sera préservée d'installations.
 - Pierre Oger: demande de l'assistance pour l'échantillonnage du domaine de Han-sur-Lesse près de Rochefort au cours du mois de mai.
 - Pierre Oger est intéressé par les données sur le Marais d'Harchies où ARABEL a fait une excursion dans le passé.
 - Jan Bosselaers: une espèce inédite de *Latrodectus* aurait été trouvée sur l'Île de Pâques; d'après Léon Baert qui y a travaillé, il s'agirait plutôt de *L. geometricus*.
 - Jan Bosselaers: une espèce inédite de *Ero* aurait été trouvée dans le voisinage d'Almeria. Les membres de la société sont priés de regarder les spécimens indéterminés de Mimetidae qu'ils auraient dans leur collection.
 - Marc Janssen: deux espèces nouvelles pour la Flandre: *Piratula knorri* des Fourons (Moelingen) et le long du Demer et *Philodromus fuscumarginatus* à Hamont (Beverbeek).
 - Arthur Decae: montre une photo de deux espèces de *Chaetopelma* de Chypre: *C. olivacea* (6 cm) et *C. karlamani* (1.5 cm). Ce sont respectivement la plus grande et la plus petite espèce de mygalomorphes en Europe.

La prochaine réunion aura lieu le 30 septembre dans la salle 'De Gerlache' à l'IRSNB.
Le président clôture la réunion à 16h45.

V.Z.W. ARABEL / ARABEL a.s.b.l.

Richtlijnen voor de auteurs

Neem als voorbeeld een in de "Nieuwsbrief" eerder verschenen artikel.

De tekst wordt in zijn definitieve "WORD-format" aan de redactie (Léon Baert, KBIN, Vautierstraat 29, 1000 Brussel; leon.baert@naturalsciences.be) geleverd.

Manuscripten moeten in het Nederlands, Frans of het Engels worden opgesteld.

De samenvatting dient opgesteld te worden in de twee landstalen Nederlands en Frans. Een bijkomende Engelstalige samenvatting is wenselijk.

Verwijzing in de tekst naar de literatuurlijst gebeurt als volgt: auteur in kleine kapitalen + jaar van uitgave.

Soortnamen preferentieel in italiek.

De literatuurlijst wordt als volgt opgesteld:

- alfabetisch gerangschikt naar auteursnaam;
- auteursnamen in kleine kapitalen;
- titels van tijdschriften voluit, niet afgekort.

Voorbeelden:

BONTE, D., BAERT, L. & MAELFAIT, J.-P., 2004. Spinnen. In : PROVOOST, S. & BONTE, D. (red.). Levende duinen: een overzicht van de biodiversiteit aan de Vlaamse kust. *Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud* (Brussel), 22: 320-343.

BONTE, D., HOFFMANN M. & MAELFAIT, J.-P., 1999. Monitoring van het begrazingsbeheer in de Belgische kustduinen aan de hand van spinnen. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 14(1): 24.

Recommandations aux auteurs

Prenez comme exemple un article paru dans une précédente feuille de contact.

Le texte envoyé à la rédaction (Léon Baert, IRSNB, rue Vautier 29, 1000 Bruxelles) doit être en "Word".

Les manuscrits doivent être rédigés en français, néerlandais ou anglais.

Le résumé présenté doit l'être dans la seconde langue nationale (français ou néerlandais). Un résumé en langue anglaise est souhaitable.

Dans l'article, la référence à la bibliographie doit être rédigé comme suit : nom d'auteur en petites capitales + année d'édition.

Les noms d'espèces figurent de préférence en italique.

La bibliographie doit être rédigée comme suit :

- noms d'auteurs classés alphabétiquement.
- les noms d'auteurs apparaissent en petites capitales.
- titres des revues rédigés en entier, sans abréviations.

Exemples :

BONTE, D., BAERT, L. & MAELFAIT, J.-P., 2004. Spinnen. In : PROVOOST, S. & BONTE, D. (red.). Levende duinen: een overzicht van de biodiversiteit aan de Vlaamse kust. *Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud* (Brussel), 22: 320-343.

BONTE, D., HOFFMANN M. & MAELFAIT, J.-P., 1999. Monitoring van het begrazingsbeheer in de Belgische kustduinen aan de hand van spinnen. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 14(1): 24.

INHOUD-SOMMAIRE

ROBERT BOSMANS & KOEN VAN KEER

Een herziene soortenlijst van de Belgische spinnen (Araneae).....39

Verslag van de 108^{ste} Vergadering van ARABEL: 29 april 2017, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (Vautierstraat 29, 1000 Brussel).....70

Rapport de la 108^{ème} réunion d'ARABEL: 29 avril 2017, à l'Institut royal des Sciences Naturelles de Belgique (rue Vautier 29, 1000 Bruxelles).....71