

v.z.w. ARABEL



ARABEL a.s.b.l.

**NIEUWSBRIEF VAN DE
BELGISCHE ARACHNOLOGISCHE VERENIGING**



**FEUILLE DE CONTACT DE LA
SOCIÉTÉ ARACHNOLOGIQUE DE BELGIQUE**

ISSN 0774-7225

Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.

Volume 16(2)

2001

v.z.w. ARABEL/ARABEL a.s.b.l.

Voorzitter/Président:	Mark Alderweireldt Provinciaal Natuureducatief Centrum De Kaaihoeve Oude Scheldestraat 16 9630 Meilegem (Zwalm)
Ondervoorzitter/Vice-Président:	Dries Bonte Universiteit Gent Laboratorium voor Ecologie der Dieren K.L. Ledeganckstraat 35 9000 Gent
Secretaris/Sécrétaire:	Frederik Hendrickx Universiteit Gent Laboratorium voor Ecologie der Dieren K.L. Ledeganckstraat 35 9000 Gent
Penningmeester/Trésorier:	Shirley Gurdebeke Universiteit Gent Laboratorium voor Ecologie der Dieren K.L. Ledeganckstraat 35 9000 Gent
Bibliothecaris/Bibliothécaire:	Robert Kekenbosch p/a Entomologie I.r.Sc.N.B. rue Vautier 29 1000 Bruxelles
Overige bestuursleden/ Autres membres du bureau:	Domir De Bakker, Jean-Pierre Maelfait
Nieuwsbriefredactie/ Rédaction feuille de contact:	Redactie Nieuwsbrief ARABEL p/a Universiteit Gent Laboratorium voor Ecologie der dieren K.L. Ledeganckstraat 35 9000 Gent
Leescommissie Nieuwsbrief/ Comité de lecture feuille de contact:	M. Alderweireldt, L. Baert, R. Bosmans, D. Bonte, F. Hendrickx, J.-F. Hermanns, S. Gurdebeke, R. Jocqué, J.-P. Maelfait J. Kekenbosch, R. Kekenbosch,
Lidgeld/Côtisation: Rekening/Compte:	500,- F 001-1662395-85 "ARABEL-lidgeld/côtisation"

ARABEL
v.z.w. - a.s.b.l.



Arachnologia Belgica

Speciale editie van de
Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging

EEN HERZIENE SOORTENLIJST VAN DE BELGISCHE SPINNEN (ARANEAE).

DOOR

ROBERT BOSMANS & HERMAN VANUYTVEN

Een herziene soortenlijst van de Belgische Spinnen (Araneae).

ROBERT BOSMANS* & HERMAN VANUYTVEN**

*Laboratorium voor Ecologie, Ledeganckstraat 35, B-9000 Gent, België

**Constant Jorislaan 19, B-2100 Deurne, België.

Samenvatting

De auteurs geven een geactualiseerde soortenlijst van de spinnen van België. Na een kritische analyse van de Belgische literatuur wordt het voorkomen van 679 soorten aanvaard. Vijfentwintig soorten waren in het verleden, vooral op het einde van de 19^{de} eeuw door BECKER (1882-1896), van België gemeld maar het bewijsmateriaal hiervan is verloren. Bij 17 van deze soorten wordt de aanwezigheid in België waarschijnlijk geacht omdat ze ook in onze buurlanden voorkomen. Ze worden op de soortenlijst gehandhaafd maar hun aanwezigheid blijft te bevestigen. Daarentegen worden 8 soorten, waarvan het areaal niet conform is met het voorkomen in België, afgevoerd van de lijst. Dit zijn: *Bathypantes vittiger* SIMON, *Lepthyphantes mughi* (FICKERT), *Lepthyphantes simoni* CHYZER & KULCZYN'SKI, *Amaurobius erberi* (KEYSERLING), *Cybaeus angustiarium* L. KOCH, *Zodarion gallicum* (SIMON), *Philodromus poecilus* THORELL en *Asianellus festivus* (C. L. KOCH).

Summary

The authors present an updated list of the spiders of Belgium. After a critical examination of all Belgian literature data, the presence of 679 species in Belgium is accepted. In the past, especially at the end of the 19th century (BECKER, 1882-1896), 25 species were recorded for Belgium but, for which, the material needed to validate them has been lost. The presence of 17 of these 25 species is accepted conditionally, as they occur also in neighbouring countries. They are maintained on the Belgian list and their presence should be confirmed by new data. Eight species on the other hand are deleted from the Belgian list, because their presence in Belgium does not correspond with their actual known distribution area. They are: *Bathypantes vittiger* SIMON, *Lepthyphantes mughi* (FICKERT), *Lepthyphantes simoni* CHYZER & KULCZYN'SKI, *Amaurobius erberi* (KEYSERLING), *Cybaeus angustiarium* L. KOCH, *Zodarion gallicum* (SIMON), *erberi* (KEYSERLING), *Cybaeus angustiarium* L. KOCH, *Zodarion gallicum* (SIMON) *Philodromus poecilus* THORELL and *Asianellus festivus* (C. L. KOCH).

Résumé

Les auteurs présentent une liste mise à jour des araignées de Belgique. Après une étude critique des données de la littérature belge, l'existence de 679 espèces est admise. Dans le passé, 25 espèces ont été mentionnées de Belgique, notamment par BECKER (1882-1896) à la fin du 19^{ème} siècle, sans qu'il n'existe aujourd'hui de preuve, sous forme de matériel déposé. La présence en Belgique de 17 des 25 espèces précédentes peut toutefois être supposée dans la mesure où on les rencontre dans les pays voisins. Elles ont dès lors été maintenues dans la liste mais une confirmation s'avère indispensable. Huit autres espèces ont, quant à elles, été retirées de la liste parce que leur aire de répartition, d'après les données actuelles, ne s'accorde pas à une présence en Belgique. Ce sont : *Bathypantes vittiger* SIMON, *Lepthyphantes mughi* (FICKERT), *Lepthyphantes simoni* CHYZER & KULCZYN'SKI, *Amaurobius erberi* (KEYSERLING), *Cybaeus angustiarium* L. KOCH, *Zodarion gallicum* (SIMON), *erberi* (KEYSERLING), *Cybaeus angustiarium* L. KOCH, *Zodarion gallicum* (SIMON), *Philodromus poecilus* THORELL et *Asianellus festivus* (C. L. KOCH).

HOOFDSTUK 1. INLEIDING

De literatuur van de Belgische spinnen is reeds zeer omvangrijk. Reeds twee maal werden overzichtslijsten van de Belgische spinnen gepubliceerd, namelijk in 1977 (KEKENBOSCH, BOSMANS & BAERT) en in 1986 (BOSMANS & MAELFAIT). Sinds 1986 zijn heel wat wijzigingen opgetreden in de Belgische soortenlijst. Nieuwe soorten werden toegevoegd en er waren heel wat nomenclatorische aanpassingen. Een nieuwe checklist van de Belgische spinnen dringt zich dus op.

Vanzelfsprekend zijn we van oordeel dat in wetenschappelijke publicaties enkel de wetenschappelijke namen van belang zijn. In deze checklist wensen we echter ook de Nederlandse namen van de bij ons voorkomende soorten op te nemen. In het kader van de verdere popularisering van de kennis van de Vlaamse ongewervelden, lijkt dit een gewenste evolutie. Wie 20 jaar geleden had

durven voorspellen dat, naast voor dagvlinders, Nederlandse namen voor libellen en sprinkhanen algemeen ingeburgerd zouden zijn, zou met ongeloof bekeken worden. Nu moeten we echter vaststellen dat dit een feit is. Spinnen zijn uiteraard heel wat soortenrijker dan libellen en sprinkhanen, zijn minder populair en niet allemaal even gemakkelijk te determineren. Courante namen voor Dwergspinnen zullen nooit in het veld gebruikt kunnen worden. Toch staan we erop in deze lijst zowel wetenschappelijke als Nederlandse namen te vermelden. Deze laatste werden voor het eerst voorgesteld door JOCQUÉ (1992) en door NOORDAM (in ROBERTS, 1998) overgenomen of gedeeltelijk gewijzigd. De wijzigingen werden door een aantal kritische personen bekeken en bijna steeds als verantwoord aangenomen, ook omdat het boek van ROBERTS toch op 5000 exemplaren is uitgegeven. Voor een aantal nieuwe soorten voor de Belgische lijst worden nieuwe namen voorgesteld.

HOOFDSTUK 2. EEN KRITISCH ONDERZOEK VAN DE IN BELGIË REEDS GECITEERDE SOORTEN.

BOSMANS (1991a) publiceerde een lijst van 31 soorten die ooit van België waren geciteerd maar waarvan geen bewijsmateriaal voorhanden is. Hieraan diende nog *Philodromus poecilus* en *Thanatus arenarius* te worden toegevoegd, zoals bleek uit de catalogus van de Belgische Philodromidae (SEGRS & BAERT, 1991). Er waren toen dus in totaal 33 soorten opgenomen in de Belgische lijst waarvan het voorkomen aan twijfel onderhevig was. Het betrof vooral soorten gemeld door BECKER (1882, 1896) maar ook door GILTAY (1926) en LERUTH (1939). In de Belgische musea of privé-collecties is hiervan geen materiaal gekend.

Tabel 1 geeft in de eerste kolom een overzicht van deze 33 soorten, met in de tweede kolom de auteur die de soort van België citeerde. In de derde kolom wordt het resultaat van een kritische evaluatie van het potentiële voorkomen van de soort in België meegedeeld. Van vrijwel alle spinnensoorten van West-Europa is namelijk de identiteit en het areaal nu zo goed gekend dat een mogelijke aanwezigheid in België kritisch kan geëvalueerd worden, met behulp van de volgende criteria:

- ☐ Was de soort in de tijd van BECKER al voldoende goed beschreven om éénduidig herkend te worden?
- ☐ Is de soort nu duidelijk herkenbaar?
- ☐ Welk is het huidige bekende areaal van de soort en maakt België hiervan deel uit?

De status van de 33 twijfelachtige Belgische soorten van BOSMANS (1991a) en SEGRS & BAERT (1991) wordt op deze manier als volgt:

- ☐ Van acht soorten werd ondertussen de aanwezigheid in België met nieuwe waarnemingen bevestigd (zie ook tabel 1)
 - ☐ *Anelosimus pulchellus* (WALCKENAER)
 - ☐ *Dipoena melanogaster* (C. L. KOCH)
 - ☐ *Steatoda triangulosa* (WALCKENAER)
 - ☐ *Erigonoplus globipes* (C. L. KOCH)
 - ☐ *Micrargus laudatus* (O. P.-CAMBRIDGE)
 - ☐ *Zygiella stroemi* (THORELL)
 - ☐ *Lathys stigmatisata* (MENGE)
 - ☐ *Thanatus arenarius* (THORELL)
- ☐ Eén soort (*Zodarium gallicum*) werd in 1997 van de Belgische lijst geschrapt door BOSMANS.

- Zeven soorten worden hier van de Belgische lijst geschrapt. Voor de argumentatie hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 3.

- *Bathyphantes vittiger* SIMON
- *Lepthyphantes mughi* (FICKERT)
- *Lepthyphantes simoni* CHYZER & KULCZYN'SKI
- *Amaurobius erberi* (KEYSERLING)
- *Cybaeus angustiarium* L. KOCH
- *Philodromus poecilus* THORELL
- *Asianellus festivus* (C. L. KOCH)

- Van 17 soorten wordt het voorkomen in België aanvaard omdat het areal van de soort in Europa bij België aansluit. Een aantal van hen zijn mogelijk bij ons sterk achteruitgegaan of zelfs uitgestorven, zoals wellicht *Oxyopes heterophthalmus* LATREILLE. Van een aantal andere soorten kan door gericht zoeken in geschikte habitats de aanwezigheid van de soort in België opnieuw aangetoond worden.

- *Uloborus walckenaerius* LATREILLE

Deze soort werd door BECKER (1896) vermeld van Redu in de provincie Luxembourg. In hun catalogus van de Uloboridae kunnen RANSY & BAERT (1985) geen nieuwe vindplaatsen toevoegen. Vermits verwisseling met verwante soorten onmogelijk is wordt de soort op de Belgische lijst behouden, maar de aanwezigheid dient bevestigd te worden.

- *Eresus cinnaberinus* (OLIVIER) (= *E. niger*) of *E. sandaliatus* (MARTINI & GOEZE)
Zie hoofdstuk 3 voor uitleg voor de synonymie. Aanwezigheid in België dient bevestigd te worden.

- *Pelecopsis elongata* (WIDER)

De enige citatie van België is die van BECKER (1896), in de catalogus van de Belgische Erigoninae herhaald door BAERT (1996). Vermits de soort in alle ons omgevende landen voorkomt en de mannetjes door hun opvallende cephalothorax gemakkelijk kunnen worden onderscheiden, wordt de soort behouden voor de Belgisch fauna. De aanwezigheid in België dient wel bevestigd te worden.

- *Singa nitidula* C. L. KOCH

In België slechts gekend van Redu in de provincie Luxembourg (BECKER, 1896). In de catalogus van RANSY & BAERT (1987a) worden geen andere vindplaatsen vermeld.

De soort leeft graag op wilgen langs snel stromende wateren en de vangst van BECKER in de provincie Luxembourg is zeer aannemelijk. Door haar opvallende kleurentekening kan de soort bovendien moeilijk met andere verward worden en de waarneming van BECKER kan zonder problemen aanvaard worden. Gericht zoeken in geschikte habitats in de Ardennen kan de aanwezigheid van de soort in België bevestigen.

- *Alopecosa cursor* (HAHN)

BECKER (1882) vermeldt deze soort van Arendonk in de provincie Antwerpen, waaraan ALDERWEIRELDT & MAELFAIT (1990) in hun catalogus niets konden toevoegen. Vermits BECKER, op *A. striatipes* na, alle in België voorkomende *Alopecosa* soorten kende en verwarring met verwante soorten dus weinig waarschijnlijk is, wordt de determinatie van BECKER geloofwaardig geacht. Bovendien ligt België binnen het gekende areaal van de soort. Ze wordt dus op de lijst behouden, maar haar aanwezigheid dient bevestigd te worden.

- *Arctosa cinerea* (FABRICIUS)

Deze grote opvallende soort werd door BECKER (1882) van meerdere plaatsen vermeld: Brussel, Diest, Oudergem en Watermaal-Bosvoorde in Brabant en Anseremme, Hastière en Yvoir (alle langs de Maas) te Namen. Door de grootte van de soort is er geen verwarring mogelijk met andere en de waarnemingen van BECKER kunnen zonder probleem worden aanvaard. Het habitat van deze soort bestaat uit zandige of kiezelige rivieroeveren, die bij ons door vervuiling grotendeels verdwenen of onleefbaar geworden zijn. Bij verbeterende milieuomstandigheden is ze onder meer opnieuw te verwachten langs de Grensmaas in Limburg.

- *Oxyopes heterophthalmus* LATREILLE

BECKER (1882) vermeldde deze soort van acht vindplaatsen gelegen in vijf verschillende provincies maar later werd de soort nooit teruggevonden. BECKER (op. cit.) onderscheidde ook reeds *O. lineatus* en *O. ramosus* zodat verwisseling hiermee onwaarschijnlijk is. BECKER's gegevens kunnen worden aanvaard en leren ons bovendien dat *Oxyopes heterophthalmus* in

België sterk achteruitgegaan is of zelfs uitgestorven.

□ *Tegenaria pagana* C. L. KOCH

Tegenaria pagana is een Zuid Europese soort die ook graag in grotten leeft. BECKER (1896) citeerde ze van Brussel en Villers-la-Ville in Waals Brabant. In de catalogus van de Belgische Agelenidae vermeldde DE BLAUWE & BAERT (1981) dat hiervan geen materiaal beschikbaar is en dat de aanwezigheid in België twijfelachtig is. NOORDAM (in ROBERTS, 1998) vermeldt echter in Nederland vindplaatsen in Zeeland en bij Nijmegen en hij bevestigde eveneens (mond. med.) dat Nederlands materiaal van Limburgse grotten zeker correct is gedetermineerd. Gericht zoeken in Belgische grotten zou nieuw materiaal van de soort kunnen opleveren en we handhaven daarom de soort op de Belgische lijst.

□ *Poecilochroa conspicua* (L. KOCH)

BECKER (1896) vermeldde de soort van het Terkamerenbos waarna ze nooit meer in België werd waargenomen. In Nederland werd de soort op een tiental plaatsen op het diluvium aangetroffen (NOORDAM, in ROBERTS, 1998) en het voorkomen in België is waarschijnlijk. Ze wordt behouden op de Belgische lijst maar dit moet bevestigd worden.

□ *Callobius claustrarius* (HAHN)

Van deze soort is slechts één oude, niet verifieerbare vermelding van BECKER (1896) gekend, nl. van het Luxemburgse Redu. Ook in Nederland zijn er slechts onbevestigde waarnemingen (NOORDAM, in ROBERTS, 1998). Het is een bossoort die vrij verspreid is in Midden- en Zuid Duitsland. Het voorkomen in de Ardense bossen valt niet uit te sluiten en de soort wordt op de Belgische lijst behouden, zij het dat het voorkomen moet bevestigd worden.

□ *Gnaphosa lucifuga* (Walckenaer, 1802)

De enige bekende citatie van België is de citatie van BECKER (1896) van Redu in Luxembourg, maar er is geen bewijsmateriaal van voorhanden. In de catalogus van RANSY & BAERT (1991) staat ten onrechte vermeld dat DECLEER & MAES (1989) de soort citeren van Koersel, maar de enige *Gnaphosa*-soort vermeld in dit werk is *Gnaphosa nigerrima*. BECKER (1896) vermeldt *Gnaphosa lucifuga* als enige in

België voorkomende *Gnaphosa* soort, terwijl nadien ook nog *Gnaphosa leporina*, *G. lugubris*, *G. nigerrima* en *G. opaca* in België werden geciteerd. *Gnaphosa lucifuga* is een soort van Centraal en Zuid Europa, waarvan de dichtst bijgelegen vindplaats in Duitsland in Rheinland-Pfalz ligt, zodat het voorkomen in de Ardennen tot de mogelijkheden behoort. Nieuwe vangsten in het zuiden van het land moeten dit bevestigen.

□ *Heriaeus graminicola* (DOLESCHALL)

BECKER (1882) vermeldde deze soort van Brussel terwijl FRAITURE (1973) ze citeerde van Limelette. In zijn catalogus vermeldt JANSSEN (1993) de soort als *H. graminicola*, maar BOSMANS & MAELFAIT (1986) melden ze als *H. hirtus*. *Heriaeus* is een onmiskenbaar genus dat werd gereviseerd door LOERBROKS (1983) en er bleken zich in het verleden zeer veel foutieve determinaties te hebben voorgedaan. In het gematigde deel van Europa blijkt *H. graminicola* de aanwezige soort te zijn. Vermits het materiaal van BECKER en FRAITURE ongetwijfeld tot *Heriaeus* behoorde maar niet verifieerbaar is wijzen we dit toe aan de bij ons te verwachten *H. graminicola*. In de toekomst dienen nieuwe vindplaatsen dit te bevestigen.

□ *Xysticus luctator* L. KOCH

BECKER (1882) vermeldt *X. luctator* van Comblain-au-Pont (Liège) en Laroche (Luxembourg). De soorten werd nadien nooit meer vermeld en BECKER's materiaal is zoals bekend verdwenen. *X. luctator* komt voor in Nederland, Engeland en het aanpalende deel van Duitsland. Zo citeerde CASEMIR (1978) ze nog van het "Hohes Fenn" dit is het aan de Hoge Venen palende deel van Duitsland. Een gerichte inventarisatie in deze streek kan de aanwezigheid van de soort in België bevestigen.

□ *Xysticus striatipes* L. KOCH

BECKER (1882) vermeldt *X. striatipes* van Redu in de provincie Luxembourg en is zoals de vorige soort nadien nooit meer vermeld. *Xysticus striatipes* is een Euro-Siberische steppensoort die noch in Engeland noch in Nederland voorkomt. In Duitsland is ze verschillende keren aangetroffen in Rheinland-Pfalz, palend aan de Belgische provincie Luxembourg. Ook hier handhaven

we de soort op de Belgische lijst en kan gericht zoeken in de provincie Luxembourg de aanwezigheid van de soort bevestigen.

□ *Macaroeris nidicolens* (WALCKENAER)

Van deze soort is slechts één oude, niet verifieerbare vermelding uit België gekend namelijk van het Naamse Hastière-Lavaux (BECKER, 1882). Het is een mediterrane, boombewonende soort die ontbreekt in Nederland en slechts recent in Duitsland in de omgeving van Keulen voor het eerst werd aangetroffen (JÄGER, 1995b). Het voorkomen op warme plekken in het zuiden van België is mogelijk maar dient bevestigd te worden.

□ *Leptorchestes berolinensis* (C. L. KOCH)

Geciteerd van Redu en Laroche in de provincie Luxembourg (BECKER, 1882), daarna nooit meer teruggevonden en het originele materiaal ontbreekt. In Nederland

komt de soort niet voor, maar in aanpalende delen van Duitsland wel. Gezien het de enige soort van het genus *Leptorchestes* is die in België voorkomt en verwisseling met andere genera zeer onwaarschijnlijk is moet de vermelding van BECKER aanvaard worden. Eens te meer vraagt dit bevestiging.

□ *Pseudicius encarpatus* (WALCKENAER)

BECKER (1882) vermeldt deze soort van 5 lokaliteiten in de provincies Brabant (Groenendaal in het Zoniënwood), Hainaut (Braine-le-Comte) en Luxembourg (Laroche, Redu, St.-Hubert). Het is een Midden- en Zuid Europese bossoort die moeilijk te verwarren is met andere soorten. Gezien de habitats waarin de soort voorkomt overeenstemmen met de lokaliteiten van BECKER (bv. Het Zoniënwood) wordt ze op de Belgische lijst gehandhaafd.

Tabel 1. Overzicht van de door BOSMANS (1991a) vermelde soorten die in België werden geciteerd maar waarvan geen bewijsmateriaal aanwezig is.

Soort	Eerste citatie	Huidige status
<i>Uloborus walckenaerius</i> LATREILLE	BECKER, 1896	Behouden op de lijst maar aanwezigheid in België te bevestigen
<i>Eresus niger</i> (<i>Petagna</i>)	BECKER, 1896	Behouden op de lijst als <i>E. cinnaberinus</i> of <i>E. sandaliatus</i> maar aanwezigheid in België te bevestigen
<i>Anelosimus pulchellus</i> (WALCKENAER)	BECKER, 1896	Aanwezigheid bevestigd door VAN KEER & VAN KEER (1992) & VAN KEER & VAN KEER (1993)
<i>Diplocephalus melanogaster</i> (C. L. KOCH)	BECKER, 1896	VAN KEER & VANUYTVEN (1993) vermelden verschillende nieuwe vangsten van deze soort
<i>Steatoda triangulosa</i> (WALCKENAER)	BECKER, 1896	VAN KEER & VANUYTVEN (1993) vermelden verschillende nieuwe vangsten van deze soort
<i>Bathypantes vittiger</i> SIMON	LERUTH, 1939	Verspreidingsareaal niet in overeenstemming met vindplaatsen in België; soort wordt geschrapt.
<i>Erigonoplus globipes</i> (C. L. KOCH)	BECKER, 1896	Aanwezigheid in België bevestigd door BAERT & al. (1992).
<i>Lepthyphantes simoni</i> CHYZER & KULCZYŃSKI, als <i>L. mansuetus</i> SIMON	BECKER, 1896	Verspreidingsareaal niet in overeenstemming met vindplaatsen in België; soort wordt geschrapt.
<i>Lepthyphantes mughii</i> (FICKERT)	BECKER, 1896	Verspreidingsareaal niet in overeenstemming met vindplaatsen in België; soort wordt geschrapt.
<i>Micrargus laudatus</i> (O. P. - CAMBRIDGE)	BECKER, 1896	Aanwezigheid bevestigd door BAERT & al., 1992 en JANSSEN, 1992b)
<i>Pelecopsis elongata</i> (WIDER)	BECKER, 1896	Behouden op de lijst maar aanwezigheid in België te bevestigen
<i>Singa nitidula</i> C. L. KOCH	BECKER, 1896	Behouden op de lijst maar aanwezigheid in België te bevestigen.
<i>Zygiella stroemi</i> (THORELL)	BECKER, 1896	RANSY & BAERT (1987) vermelden een nieuwe vindplaats van deze soort.
<i>Alopecosa cursor</i> (HAHN)	BECKER, 1882	Behouden op de lijst maar aanwezigheid in België te bevestigen.
<i>Arctosa cinerea</i> (FABRICIUS)	BECKER, 1882	Behouden op de lijst maar aanwezigheid in België te bevestigen.
<i>Oxyopes heterophthalmus</i> LATREILLE	BECKER, 1882	Behouden op de lijst maar aanwezigheid in België te bevestigen.
<i>Cybaeus angustiarum</i> L. KOCH	BECKER, 1896	Ten onrechte op de lijst van BOSMANS (1991a) vermeld, was reeds in de catalogus van KEKENBOSCH & al. (1977) afgevoerd.
<i>Tegenaria pagana</i> C. L. KOCH	BECKER, 1896	Behouden op de lijst maar aanwezigheid in België te bevestigen.
<i>Lathys stigmatisata</i> (MENGE)	BECKER, 1896	RANSY & BAERT (1985) vermelden nieuwe vindplaatsen van deze soort.
<i>Amaurobius erberi</i> (KEYSERLING)	BECKER, 1896	Verspreidingsareaal niet in overeenstemming met vindplaatsen in België; soort wordt geschrapt.
<i>Callobius claustrarius</i> (HAHN)	BECKER, 1896	Behouden op de lijst maar aanwezigheid in België te bevestigen
<i>Zodariion gallicum</i> SIMON	BECKER, 1896	Afgevoerd van de Belgische lijst (BOSMANS, 1997)
<i>Gnaphosa lucifuga</i> (WALCKENAER)	BECKER, 1896	Behouden op de lijst maar aanwezigheid in België te bevestigen.

<i>Poecilochroa conspicua</i> (L. KOCH)	BECKER, 1896	Behouden op de lijst maar aanwezigheid in België te bevestigen.
<i>Heriaeus graminicola</i> (DOLESCHALL) { <i>H. hirtus</i> (WALCKENAER)}	BECKER, 1882	Behouden op de lijst maar aanwezigheid in België te bevestigen.
<i>Philodromus poecilus</i> THORELL, 1872	BECKER, 1882	Verspreidingsareaal niet in overeenstemming met vindplaatsen in België; soort wordt geschrapt.
<i>Thanatus arenarius</i> (THORELL)	BECKER, 1882	Aanwezigheid bevestigd door JANSSEN & BONTE (1997).
<i>Xysticus luctator</i> L. KOCH	BECKER, 1882	Behouden op de lijst maar aanwezigheid in België te bevestigen.
<i>Xysticus striatipes</i> (L. KOCH)	BECKER, 1882	Behouden op de lijst maar aanwezigheid in België te bevestigen.
<i>Asianellus (Aelunillus) festivus</i> (C. L. KOCH)	GILTAY, 1927	Verspreidingsareaal niet in overeenstemming met vindplaatsen in België; soort wordt geschrapt.
<i>Macaroeris nidicolens</i> (WALCKENAER)	BECKER, 1882	Behouden op de lijst maar aanwezigheid in België te bevestigen.
<i>Leptorchestes berolinensis</i> (C. L. KOCH)	BECKER, 1882	Behouden op de lijst maar aanwezigheid in België te bevestigen.
<i>Pseudicius encarpatus</i> (WALCKENAER)	BECKER, 1882	Behouden op de lijst maar aanwezigheid in België te bevestigen.

HOOFDSTUK 3. BESPREKING VAN DE TAXONOMISCHE EN NOMENCLATORISCHE TOEVOEGINGEN OF WIJZIGINGEN.

In dit hoofdstuk worden alle toevoegingen en wijzigingen sinds BOSMANS & MAELFAIT (1986) besproken, uitgezonderd jaartallen van de eerste beschrijving van de soort die eventueel veranderd zijn. In de overzichtstabel in hoofdstuk vier zijn deze veranderde jaartallen wel vermeld.

Een aantal toevoegingen of wijzigingen werden reeds vermeld in BAERT (1994), maar worden voor de volledigheid hier herhaald.

Soorten die hier afgevoerd worden van de Belgische lijst of op een andere manier geklasseerd werden in BOSMANS & MAELFAIT (1986), worden vermeld tussen accolades {}.

Ook opgenomen zijn soorten die in publicaties werden vermeld maar zonder gedetailleerde vinplaats of datum, bijvoorbeeld in brochures over natuurbehoud. In de tabel van appendix 2 zijn deze apart achteraan vermeld.

De gevolgde klassering van families, genera en soorten is als in de meeste recente catalogus van de spinnen van de wereld (PLATNICK, 2002), op enkele uitzonderingen na (*Arboricaria*, *Palliduphantes*). De volgorde van de families is bij ons minder gekend en wordt daarom nog eens apart weergegeven in het appendix 1.

Atypidae

Atypus piceus (SULZER, 1776)

Voor het eerst in België gemeld door Hendrickx & De Bakker (2001).

Pholcidae

Spermophora senoculata (DUGÈS, 1836)

Voor het eerst in België gemeld door VANUYTVEN (2000), en bij ons alleen voorkomend in serres e.d.

Dysderidae

Harpactea rubicunda (C. L. KOCH, 1838)

Voor het eerst België gemeld in de AMINAL-brochure (2000a) over autostradebermen, met identificatie van het materiaal door Marc JANSSEN. Nadere gegevens worden nog gepubliceerd.

Eresidae

Eresus cinnaberinus (OLIVIER, 1789) (= *E. niger*) of *E. sandaliatus* (MARTINI & GOEZE, 1778) (?)

Eresus is één van de meest mysterieuze Belgische spinnen. Van *Eresus* zijn van België immers nog steeds slechts de oude literatuurgegevens van BECKER (1896) bekend, namelijk van Genk

(Limburg) en Soulme (Namur). In de Belgische collecties bevindt zich geen materiaal dat van België afkomstig is. Nochtans is ze op verschillende plaatsen juist over de grens in Nederlands vrij algemeen te vinden.

Recent zijn er ook problemen gerezen met de nomenclatuur. RATSCHKER & BELLMAN (1995) toonden aan dat er in Midden- en West-Europa twee *Eresus*-soorten voorkomen, nl. *E. cinnaberinus* (= *E. niger*) en *E. sandaliatus*, van elkaar slechts verschillend door details in pedipalpen en epigyne. *E. sandaliatus* is de meest noordelijk voorkomende soort. Volgens NOORDAM (in ROBERTS, 1998) komen in Nederland beide soorten voor waarbij *E. sandaliatus* verschillende keren werd waargenomen en *E. cinnaberinus* slechts één keer. BECKER (1896) had ongetwijfeld een *Eresus* verzameld en er is de meeste kans dat het *E. sandaliatus* was. Alleen nieuwe waarnemingen kunnen dit bevestigen.

Oecobiidae

{*Oecobius annulipes* LUCAS, 1846}

De soort die bij ons voorkomt is *Oe. navus* en niet *Oe. annulipes* (WUNDERLICH, 1987).

Oecobius navus BLACKWALL, 1859

In BOSMANS & MAELFAIT (1986) vermeld als *Oe. annulipes*.

Uloboridae

Uloborus plumipes LUCAS, 1846

Voor het eerst in België gemeld door SEGERS (1986). De soort leeft bij ons uitsluitend in serres of vergelijkbare habitats.

Theridiidae

Achaearanea veruculata (URQUHART, 1885)

Deze vanuit Australië ingevoerde soort werd door VAN KEER (1992) geciteerd.

Anelosimus aulicus (C. L. KOCH, 1838).

Voor het eerst in België vermeld door HENDRICKX (1998), met meer uitleg over de vangst in VAN KEER (2000).

Carniella brignolii THALER & STEINBERGER, 1988

Voor het eerst in België gemeld door BAERT & VAN KEER (1991).

{*Comaroma simoni* BERTKAU, 1889}

Deze soort werd vroeger in de Theridiidae geklasseerd maar werd overgeplaatst naar de Anapidae.

Dipoena inornata (O. P.-CAMBRIDGE, 1861)

Voor het eerst in België gemeld door BAERT & al. (1992).

{*Dipoena tristis* (HAHN, 1833)}

De correcte naam voor deze soort is *Lasaeola tristis*.

Enoplognatha caricis (FICKERT, 1876)

In BOSMANS & MAELFAIT (1986) gemeld als *E. tecta*.

{*Enoplognatha crucifera* (THORELL, 1875)}

De correcte naam voor deze soort is *E. mordax*.

Enoplognatha mordax (THORELL, 1875)

BOSMANS & MAELFAIT (1986) vermeldten deze soort als *E. crucifera*.

{*Enoplognatha tecta* (KEYSERLING, 1884)}

De correcte naam voor deze soort is *E. caricis*.

Lasaeola tristis (HAHN, 1833)

In BOSMANS & MAELFAIT (1986) vermeld als *Dipoena tristis*.

Neottiura bimaculata (LINNAEUS, 1767)

BOSMANS & MAELFAIT (1996) vermeldten deze soort als *Theridion bimaculatum*.

Paidiscura pallens (BLACKWALL, 1834)

BOSMANS & MAELFAIT (1986) vermeldten deze soort als *Theridion pallens*.

{*Robertus grasshoffi* WUNDERLICH, 1973}

Wijfjes van deze soort werden voor het eerst in België vermeld door ALDERWEIRELDT (1987). BAUCHHENS & UHLENHAUT (1993) toonden echter aan dat het door WUNDERLICH (1973) beschreven mannetje en wijfje tot verschillende soorten behoorden. Voor het mannetje werd de naam grasshoffi behouden terwijl aan het wijfje de nieuwe naam Robertus kuehnae werd gegeven. Op hun beurt toonden KNOFLACH & THALER (2000) aan dat het mannetje van R. grasshoffi niets anders was dan een mannetje met uitgestulpte palp van Robertus neglectus. De naam R. grasshoffi werd daardoor een synoniem van R. neglectus.

Robertus kuehnae BAUCHHENS & UHLENHAUT, 1993

Wijfjes van deze soort werden voor het eerst in België vermeld door ALDERWEIRELDT (1987) als Robertus grasshoffi, later verbeterd als R. kuehnae (ALDERWEIRELDT, 1993) (zie ook hierboven).

Rugathodes bellicosus (SIMON, 1873)

Voor het eerst in België vermeld door JANSSEN (1988) als *Theridion bellicosum*.

Rugathodes instabilis (O. P.-CAMBRIDGE, 1870)

Deze soort werd van *Theridion* overgeplaatst naar het genus *Rugathodes*.

Simitidion simile (C. L. KOCH, 1836)

BOSMANS & MAELFAIT (1986) vermelden deze soort als *Theridion simile*.

{*Theridion betteni* (WIEHLE, 1960)}

Theridion betteni heeft volgens NOORDAM (in ROBERTS, 1998) een Centraal- en Oosteuropese verspreiding en komt niet in België voor. JOCQUÉ (1996) vermeldde deze soort van België maar BOSMANS (1996) en ook VANUYTVEN (1996) stelden dat het niet om *T. betteni* gaat maar om een nieuwe soort voor de wetenschap die nog geen naam heeft. NOORDAM (in ROBERTS, 1998) vermeldt de soort als *Theridion sp.*

{*Theridion bimaculatum* (LINNAEUS, 1767)}

Deze soort wordt nu in het genus *Neottiura* geklasseerd.

Theridion hannoniae DENIS, 1944

VANUYTVEN (1987) vermeldde deze soort voor het eerst in België.

Theridion hemerobius SIMON, 1914

VANUYTVEN & al. (1990) vermelden deze soort voor het eerst in België.

{*Theridion instabile* (O. P.-CAMBRIDGE, 1870)}

Deze soort werd van *Theridion* overgeplaatst naar het genus *Rugathodes*.

{*Theridion pallens* (BLACKWALL, 1834)}

Deze soort werd overgeplaatst naar het genus *Paidiscura*.

{*Theridion simile* (C. L. KOCH, 1836)}

Deze soort werd overgeplaatst naar het recent door WUNDERLICH (1992) gecreëerde genus *Simitidion*.

Theridiosomatidae

Theridiosoma gemmosum (L. KOCH, 1877)

Voor het eerst in België gemeld door VAN KEER & VAN KEER (1988).

Anapidae

Comaroma simoni BERTKAU, 1889

Deze soort werd van de familie van de Theridiidae overgeplaatst naar de familie van de Anapidae.

Linyphiidae

Anguliphantes angulipalpis (WESTRING, 1851)

BOSMANS & MAELFAIT (1986) vermelden de soort als *Lepthyphantes angulipalpis*.

{*Bathyphantes eumenis* (L. KOCH, 1879)}

Voor het eerst in België gemeld door BLICK & MOLENDRA (1997) maar de correcte naam voor de soort is *B. simillimus*.

Bathyphantes simillimus (L. KOCH, 1879)

Voor het eerst in België gemeld door BLICK & MOLENDRA (1997) als *B. eumenis*.

{*Bathyphantes vittiger* SIMON, 1884}

B. vittiger is een soort die op herbeschrijving wacht en die slechts bekend is van Frankrijk, namelijk de Pyreneeën (Hautes Pyrénées, Basses Pyrénées, Pyrénées Orientales) en de Alpen (Alpes Maritimes, Hautes Alpes). Ze werd van België gemeld door LERUTH (1939): 'Namur, Pétigny-lez-Couvin, grotte de l'Adugeoir, parmi des détritiques d'inondation de la rivière exogène'. Het bewuste materiaal is niet terug te vinden en gezien het areaal dient de determinatie als foutief beschouwd te worden. De soort wordt hier van de Belgische lijst verwijderd.

{*Bolyphantes crucifer* (MENGE, 1866)}

SAARISTO & TANASEVITCH (2000) verplaatsten deze soort naar het nieuwe genus *Incestophantes*.

{*Centromerus aequalis* (WESTRING, 1851)}

De correcte naam voor deze soort is *C. brevivulvatus*. *Centromerus brevivulvatus* DAHL, 1912

BOSMANS & MAELFAIT (1986) vermelden deze soort als *C. aequalis*.

{*Centromerus incultus* FALCONER, 1915}

De oudere en geldige naam voor deze soort is *C. semiater* L. KOCH, 1879 (ESKOV & MARUSIK, 1992). De publicatie in druk waarnaar BOSMANS & MAELFAIT (1986) verwijzen is DECLEER, 1986.

Centromerus levitarsis (SIMON, 1884)

Voor het eerst in België vermeld door HENDRICKX & DE BAKKER (2001).

Centromerus semiater (L. KOCH, 1879)

BOSMANS & MAELFAIT (1986) vermelden deze soort als *C. incultus*.

{*Ceratinopsis romana* (O. P.-CAMBRIDGE, 1872) en *C. stativa* (SIMON, 1881)}

Beide soorten worden nu opnieuw in het genus *Styloctetor* geklasseerd.

Cinetata gradata (SIMON, 1881)

Voor deze soort creëerde WUNDERLICH (1995) het nieuwe genus *Cinetata*. Ze werd door BOSMANS & MAELFAIT (1986) als *Cineta* gemeld.

Collinsia distincta (SIMON, 1879) en *C. inerrans* (O. P.-CAMBRIDGE, 1884)

Werden in BOSMANS & MAELFAIT (1986) respectievelijk vermeld als *Halorates distinctus* en *Milleriana inerrans*. Ze worden nu beide in het genus *Collinsia* geplaatst.

{*Diplocephalus conatus* BERTKAU, 1889}

De vermelding in BOSMANS & MAELFAIT (1986) berustte op een vergissing, zoals reeds aangehaald door BAERT (1994).

Entelecara omissa O. P.-CAMBRIDGE, 1902

Voor het eerst in België gemeld door DECLEER (1992).

Eperigone eschatologica (CROSBY, 1924)

Voor het eerst gemeld in België door BOSMANS & VANUYTVEN (1998). Het is een noordamerikaanse immigrant die hier kan aangetroffen worden in serres. *Eperigone trilobata* (EMERTON, 1882)

Deze Amerikaanse soort raakt in Europa meer en meer ingeburgerd. Ze werd voor het eerst in Duitsland aangetroffen door DUMBERT & PLATEN (1985), en later ook in Zwitserland (HÄNGGI, 1990) en Oostenrijk (BREUSS, 1999). Van België werd ze nu ook gemeld in de AMINAL-brochure (AMINAL, 2000b) over het heidebeheer in Limburg, met identificatie van het materiaal door Marc JANSSEN. Nadere gegevens moeten nog gepubliceerd worden.

Erigone promiscua (O. P.-CAMBRIDGE, 1872)

Voor het eerst in België gemeld door HUBLÉ (1988).

{*Erigone vagans* (AUDOUIN, 1826)}

Deze soort wordt nu in het genus *Prinerigone* geplaatst.

Formiphantes lepthyphantiformis (STRAND, 1907) SAARISTO & TANASEVITCH. (1996) creëerden voor *Lepthyphantes lepthyphantiformis* het genus *Formiphantes*.

Glyphesis cottonae (LA TOUCHE, 1945)

Voor het eerst in België vermeld door BAERT & al. (1984).

Gongylidiellum murcidum SIMON, 1884

Voor het eerst in België gemeld door DECLEER (1986).

{*Halorates distinctus* (SIMON, 1879)}

Deze soort wordt nu in het geslacht *Collinsia* geklasseerd.

Incestophantes crucifer (MENGE, 1866)

TANASEVITCH (1992) creëerde voor deze en een aantal verwante *Lepthyphantes*-soorten het genus *Incestophantes*.

Genus *Lepthyphantes*. Dit heterogene genus werd door (WUNDERLICH (1994), TANASEVITCH (1992) en SAARISTO & TANASEVITCH (1996, 2000, 2001) opgesplitst in verschillende andere genera:

Het genus *Anguliphantes* met bij ons de soort *A. angulipalpis*.

Het genus *Formiphantes* met bij ons de soort *F. lepthyphantiformis*.

Het genus *Megalepthyphantes* met bij ons de soort *M. nebulosus*.

Het genus *Oryphantes* met bij ons de soort *O. angulatus*.

Het genus *Palliduphantes* met bij ons de soorten *P. ericaeus* (BLACKWALL, 1853), *P. insignis* (O. P.-CAMBRIDGE, 1913) en *P. pallidus* (O. P.-CAMBRIDGE, 1871)

Het genus *Tenuiphantes*: dit werd afgesplitst voor alle soorten van de *tenuis* groep en omvat dus bij ons: *T. alacris*, *T. cristatus*, *T. flavipes*, *T. mengei*, *T. tenebricola*, *T. tenuis* en *T. zimmermanni*.

{*Lepthyphantes mughi* (FICKERT, 1875)}

Deze soort werd door BECKER (1896) van België vermeld, namelijk van Vlaams Brabant (Onkerzele) en van Waals Brabant (Noirhat). Er is hiervan geen bewijsmateriaal. In BECKERS's tijd waren vele soorten van het geslacht *Lepthyphantes* niet of zeer moeilijk te determineren. Van het oude genus *Lepthyphantes* vermeldde BECKER in België 10 soorten: *L. cristatus*, *L. leprosus*, *L. mansuetus*, *L. minutus*, *L. mughi*, *L. nebulosus*, *L. obscurus*, *L. pallidus*, *L. tenebricola* en *L. zimmermanni* (als *L. zebrinus*). De epigyne van *L. mughi* lijkt op die van *L. flavipes*, een soort die niet door BECKER werd vermeld. Mogelijk heeft BECKER beide soorten verward. *L. mughi* is een bossoort van Midden- en Noord-Europa, en als ze al in België zou voorkomen, zou het in de Ardennen zijn, en niet in Brabant, van waar BECKER ze citeerde. De soort wordt hier van de Belgische lijst geschrapt. Overigens wordt ze nu in het genus *Mugiphantes* geplaatst.

{*Lepthyphantes simoni* CHYZER & KULCZYN'SKI, 1894}

BECKER (1896) vermeldde deze soort als *L. mansuetus* van Mont Saint-Guibert (Waals Brabant) en Yvoir (Namur), maar KEKENBOSCH & al. (1977) vermoedden dat BECKER *L. simoni* voor ogen had en als dusdanig staat de soort sindsdien geciteerd in de Belgische naamlijst. Het areaal van zowel *L. mansuetus* als van *L. simoni* is nu beter gekend en België behoort hier niet toe. *L. simoni* komt voor de westelijke Alpen, in Frankrijk en Zwitserland. *L. mansuetus* heeft een wat grotere verspreiding in de Middeneuropese gebergtes en de Pyreneeën (BOSMANS, 1991c). De beide namen worden hier van de Belgische lijst geschrapt. Overigens worden beide soorten nu in het genus *Mansuphantes* geplaatst.

{*Linyphia clathrata* (SUNDEVALL, 1830), *L. emphana* (WALCKENAER, 1842), *L. furtiva* (O. P.-CAMBRIDGE, 1871), *L. hammeni* (VAN HELSDINGEN, 1963), *L. montana* (CLERCK, 1757), *L. peltata* (WIDER, 1834) en *L. marginata* (C. L. KOCH)}.

Deze soorten worden momenteel in het genus *Neriere* geplaatst. In BOSMANS & MAELFAIT (1986) werd dit nog als een subgenus van *Linyphia* beschouwd. Verder is de correcte naam voor *L. marginata* nu *L. radiata*.

Macrargus carpenteri (O. P.-CAMBRIDGE, 1894)

Voor het eerst in België gemeld door JANSSEN (1986). BOSMANS & MAELFAIT (1986) vermeldten deze publicatie als in druk.

Maro sublestus FALCONER, 1915

Voor het eerst in België gemeld door DE KNIJF & al. (1994).

Megalephyphantes nebulosus (SUNDEVALL, 1830) WUNDERLICH (1994) creëerde voor deze en andere *Lepthyphantes*-soorten het nieuwe genus *Megalephyphantes*.

Meioneta affinis (KULCZYN'SKI, 1898)

Reeds in 1973 had WUNDERLICH gepubliceerd dat *M. affinis* de oudere en geldige naam was van *M. beata*.

{*Meioneta beata* (O. P.-CAMBRIDGE, 1906)}

De geldige naam voor deze soort is *M. affinis*.

Meioneta fuscipalpa (C. L. KOCH, 1836)

Voor het eerst in België gemeld door VANUYTVEN (1992) als *M. fuscipalpus*. De correcte schrijfwijze is *fuscipalpa*.

Micrargus apertus (O. P.-CAMBRIDGE, 1870)

Voor het eerst in België vermeld door SEGERS (1988).

{*Milleriana inerrans* (O. P.-CAMBRIDGE, 1884)}

Deze soort wordt nu in het genus *Collinsia* geplaatst.

Neriene sp.

Alle soorten die BOSMANS & MAELFAIT (1986) in het genus *Linyphia*, subgenus *Neriene* klasseerden worden nu in het genus *Neriene* geplaatst: *Neriene clathrata* (SUNDEVALL, 1829), *N. emphana* (WALCKENAER, 1837), *N. furtiva* (O. P.-CAMBRIDGE, 1871), *N. hammeni* (VAN HELSDINGEN, 1963), *N. montana* (CLERCK, 1757), *N. peltata* (WIDER), 1834 en *N. radiata* (C. L. KOCH, 1834).

Neriene radiata (WALCKENAER, 1842)

BOSMANS & MAELFAIT (1986) vermeldten deze soort als *Linyphia marginata*.

{*Oedothorax tuberosus* (BLACKWALL, 1841)}

BOSMANS (1985) en DE KEER & MAELFAIT (1988) toonden aan dat *Oedothorax gibbosus* en *Oe. tuberosus* de mannelijke variaties (morphes) zijn van één en dezelfde soort.

Obscuriphantes obscurus (BLACKWALL, 1841)

SAARISTO & TANASEVITCH (2000) verplaatsten *Lepthyphantes obscurus* naar het nieuwe genus *Obscuriphantes*.

Oryphantes angulatus (O. P.-CAMBRIDGE, 1881)

SAARISTO & TANASEVITCH (1996) verplaatsten *Lepthyphantes angulatus* naar het nieuwe genus *Oryphantes*.

Palliduphantes ericaeus (BLACKWALL, 1853), *P. insignis* (O. P.-CAMBRIDGE, 1913) en *P. pallidus* (O. P.-CAMBRIDGE, 1871)

SAARISTO & TANASEVITCH (2001) verplaatsten *Lepthyphantes ericaeus*, *L. insignis* en *L. pallidus* van het genus *Lepthyphantes* naar het nieuwe genus *Palliduphantes*.

Parapelecopsis nemoraloides (O. P.-CAMBRIDGE, 1884) en *P. nemoralis* (BLACKWALL, 1841)

Deze soorten werden vroeger in het genus *Pelecopsis* geplaatst en *P. nemoraloides* werd vroeger ook als *Pelecopsis locketi* en *P. mediocris* van België geciteerd. Alle Belgische materiaal zou moeten worden gecheckt om na te gaan of beide soorten inderdaad in België voorkomen.

{*Pelecopsis locketi* (COOKE, 1967)}

Voor deze soort bestond reeds de veel oudere naam *Pelecopsis nemoraloides*.

{*Pelecopsis mediocris* (KULCZYN'SKI, 1899)}

Alle citaten van deze soort, behalve die van de typelocaliteit op Madeira, betreffen in werkelijkheid *Parapelecopsis nemoraloides*. *P. mediocris* komt alleen op Madeira voor.

{*Pelecopsis nemoraloides* (O. P.-CAMBRIDGE, 1884), *P. nemoralis* (BLACKWALL, 1841)}

WUNDERLICH (1992) creëerde voor deze soorten het genus *Parapelecopsis*. Vroeger werd *P. nemoraloides* ook als *Pelecopsis locketi* en *P. mediocris* geciteerd.

Peponocranium orbiculatum (O. P.-CAMBRIDGE, 1882)

Voor het eerst in België vermeld door BAERT & al. (1992).

Poecilopoda variegata (BLACKWALL, 1841)

BOSMANS & MAELFAIT (1986) vermeldten deze soort als *P. globosa*.

Porrhomma microcavense WUNDERLICH, 1990

Voor het eerst in België gemeld in de AMINAL-brochure (AMINAL, 2000a) over autostradebermen, met identificatie van het materiaal door Marc JANSSEN. Nadere gegevens moeten nog gepubliceerd worden.

Prinerigone vagans (AUDOUIN, 1826)

Voor *Erigone vagans* creëerde MILLIDGE (1988) het nieuwe genus *Prinerigone*.

Pseudocarrionita thaleri (SAARISTO, 1971)

Voor het eerst in België gemeld door SEGERS & BOSMANS (1988).

Sintula corniger (BLACKWALL, 1856)

Zoals aangetoond in BOSMANS (1991b) is de juiste naam voor deze soort *Sintula corniger* en niet *S. cornigera* zoals vermeld in BOSMANS & MAELFAIT (1986).

Styloctetor romanus (O. P.-CAMBRIDGE, 1872) en *S. stativus* (SIMON, 1881)

Het genus *Styloctetor* werd door MARUSIK & TANASEVITCH (1998) gerevalideerd. De beide door BOSMANS & MAELFAIT (1986) in het genus *Ceratinopsis* vermelde soorten worden dus nu in het genus *Styloctetor* geplaatst.

Tenuiphantes alacris (BLACKWALL, 1853), *T. cristatus* (MENGE, 1866), *T. flavipes* (BLACKWALL, 1854), *T. mengei* (KULCZYN'SKI, 1887), *T. tenebricola* (WIDER, 1834), *T. tenuis* (BLACKWALL, 1852) en *T. zimmermanni* (BERTKAU, 1890). Voor deze soorten creëerden SAARISTO & TANASEVITCH (1996) het genus *Tenuiphantes*.

Troxochrus cirrifrons (O. P.-CAMBRIDGE, 1871)

Het bewijs dat het hier om een goede soort gaat en niet om een variatie van *T. scabriculus* moet nog steeds geleverd worden. Naar analogie van *Oedothorax gibbosus* en *Oe. tuberosus* is het goed mogelijk dat het ook hier om een dimorfe soort gaat.

Troxochrus nasutus SCHENKEL, 1925

Voor het eerst in België gemeld door JANSSEN (1994).

Walckenaeria alticeps (DENIS, 1952)

Voor het eerst in België gemeld door MAELFAIT & BAERT (1987).

Tetragnathidae

Meta sp., *Metellina* sp.

De soorten van deze genera staan in BOSMANS & MAELFAIT (1987) en in de catalogus van JACOBS (1993) nog geklasseerd in de familie van de Metidae maar worden nu in de Tetragnathidae geplaatst.

Tetragnatha reimoseri (ROSCA, 1939)

Voor het eerst in België vermeld door JANSSEN (1994).

Tetragnatha striata L. KOCH, 1862

Voor het eerst in België gemeld door DECLEER (1988).

{Metidae}

De familie van de Metidae omvatte in BOSMANS & MAELFAIT (1987) drie genera. *Meta* en *Metellina* worden nu in de Tetragnathidae geplaatst terwijl *Zygiella* in de Araneidae werd opgenomen.

Araneidae

Araniella opisthographa (KULCZYN'SKI, 1905)

De schrijfwijze in BOSMANS & MAELFAIT (1986) dient gecorrigeerd van *opistographus* naar *opisthographa*.

Araneus sturmi (HAHN, 1831) en *A. triguttata* (FABRICIUS, 1757)

BOSMANS & MAELFAIT (1986) vermeldden deze soort in het genus *Atea*, een genus dat momenteel als een synoniem van *Araneus* wordt beschouwd.

{*Atea sturmi* (HAHN, 1831) en *A. triguttatus* (FABRICIUS, 1793)}

Deze soorten worden nu in het geslacht *Araneus* geplaatst.

Cyclosa oculata (WALCKENAER, 1802)

De correcte auteur van deze soort is WALCKENAER, 1802 en niet LATOUCHE, 1846 zoals vermeld in BOSMANS & MAELFAIT (1986). De publicatie waarin deze soort voor het eerst werd gemeld, niet vermeld in BOSMANS & MAELFAIT (op. cit.), is BAERT & al., 1984.

Zygiella sp.

De soorten van dit genus staan in BOSMANS & MAELFAIT (1986) nog geklasseerd in de familie van de Metidae.

Lycosidae

Alopecosa barbipes (SUNDEVALL, 1833)

Voor het eerst in België vermeld door ALDERWEIRELDT & MAELFAIT (1993).

Arctosa lutetiana (SIMON, 1876)

BOSMANS & MAELFAIT (1986) vermeldden deze soort als *Tricca lutetiana*.

Pardosa agrestis purbeckensis F. O. P. CAMBRIDGE, 1895

In BOSMANS & MAELFAIT (1986) vermeld als de zelfstandige soort *P. purbeckensis*.

Pardosa alacris (C. L. KOCH, 1833)

Voor het eerst in België gemeld door ALDERWEIRELDT & MAELFAIT (1993) als *Pardosa pseudolugubris*.

{*Pardosa pseudolugubris* WUNDERLICH, 1984}

Voor deze soort bestond reeds de veel oudere naam *P. alacris*.

{*Pardosa purbeckensis* F. O. P. CAMBRIDGE, 1895}

Deze soort wordt nu als een ondersoort van *P. agrestis* beschouwd.

Pardosa saltans TÖPFER-HOFMANN, 2000

In de originele beschrijving van *Pardosa saltans* vermeldden TÖPFER-HOFMANN & al. (2000) dat de soort ook in België zou voorkomen. Een definitieve bevestiging hiervan werd gegeven door HENDRICKX et al. (2001).

{*Tricca lutetiana* (SIMON, 1876)}

Deze soort wordt nu in het genus *Arctosa* geplaatst.

Agelenidae

{*Cicurina cicur* (FABRICIUS, 1793)}

Deze soort wordt nu in de Dictynidae geklasseerd.

{*Coelotes*, alle soorten}

Alle soorten van het genus *Coelotes* worden nu in de familie van de Amaurobiidae geklasseerd.

{*Cryphoea silvicola* (C. L. KOCH, 1834)}

Het genus *Cryphoea* werd overgeplaatst naar de familie van de Hahniidae.

{*Cybaeus angustiarium* L. KOCH }

Deze Europese bergsoort werd door LELOUP & KONIETZKO (1958) geciteerd in een ecologische studie van de schorren van Lillo (als enige soort van de familie van de Agelenidae) en deze citatie werd herhaald in de catalogus van de Belgische Agelenidae van DE BLAUWE & BAERT (1981). In de daaropvolgende catalogi van KEKENBOSCH & al. (1977) en BOSMANS & MAELFAIT (1986) werd de soort zonder commentaar weggelaten. BOSMANS (1991a) nam ze op in een lijst van soorten die ooit van België geciteerd werden maar waarvan geen bewijsmateriaal voorhanden is. Een citatie van een bergsoort van de schorren van Lillo is onwaarschijnlijk en de soort wordt daarom nu definitief afgevoerd van de Belgische lijst.

Tegenaria saeva BLACKWALL, 1844

Voor het eerst in België gemeld door LERUTH (1939), maar deze citatie bleek in werkelijkheid *T. atrica* te betreffen (DE BLAUWE & BAERT, 1981). Een nieuwe vermelding van België werd ons geleverd door VAN KEER & VAN KEER (1992).

{*Tuberta macrophthalma* KULCZYN'SKI, 1897}

Deze soort wordt nu in het genus *Mastigusa* geplaatst dat op zijn beurt overgeplaatst werd naar de Dictynidae.

Hahniidae

Cryphoea silvicola (C. L. KOCH, 1834)

Het genus *Cryphoea* werd van de familie van de Agelenidae overgeplaatst naar de familie van de Hahniidae.

Tuberta maerens (O. P.-CAMBRIDGE, 1863)

Voor het eerst in België vermeld door DE BAKKER & BAERT (1999).

Dictynidae

Cicurina cicur (FABRICIUS, 1793)

Deze soort werd van de familie van de Agelenidae overgeplaatst naar de familie van de Dictynidae.

Dictyna major MENGE, 1869

Voor het eerst in België gemeld door BENOIT (1966), maar deze melding was gebaseerd op juveniele exemplaren die onmogelijkheid met zekerheid kunnen worden gedetermineerd (RANSY

& BAERT, 1985). Het voorkomen in België werd later bevestigd door VAN KEER (1991).

Mastigusa arietina (THORELL, 1871) en *M. macrophthalma* (KULCZYN'SKI, 1897)

Deze soorten werden vroeger respectievelijk als *Tetrilus arietinus* en *Tuberta macrophthalma* in de Agelenidae geplaatst. In de catalogus van KEKENBOSCH & al. (1977) werden *T. arietinus* en *T. macrophthalmus* als synoniemen beschouwd, maar ROBERTS (1998) en PLATNICK (2002) behandelen ze opnieuw als aparte, in West-Europa voorkomende soorten. Volledige duidelijkheid hieromtrent is er echter nog niet want volgens WUNDERLICH (1986) zou *M. macrophthalma* enkel in de Balkan voorkomen en is *M. arietina* de Westeuropese soort. Deze stelling dient echter nog bewezen te worden.

Amaurobiidae

{*Amaurobius claustrarius* (HAHN, 1833)}

Deze soort wordt nu in het genus *Callobius* geplaatst.

{*Amaurobius erberi* (KEYSERLING, 1863)}

Deze soort heeft een circummediterrane verspreiding met als meest noordelijke vindplaatsen Midden-Frankrijk (SIMON, 1914), Zuid-Zwitserland (MAURER & HÄNGGI, 1990) en Oostenrijk (THALER & STEINER, 1993; JÄGER, 1995a). In België werd ze geciteerd door BECKER (1878, 1896) en BENOIT (1966). Er is hiervan geen bewijsmateriaal beschikbaar en deze gegevens worden als foutief beschouwd. De soort wordt van de Belgische lijst geschrapt.

Callobius claustrarius (HAHN, 1833)

In BOSMANS & MAELFAIT (1986) vermeld als *Amaurobius claustrarius*.

Titanoecidae

{*Titanoeca obscura* (WALCKENAER, 1802)}

De geldige naam voor deze soort is *T. quadriguttata* (HAHN, 1833).

Titanoeca quadriguttata (HAHN, 1833)

BOSMANS & MAELFAIT (1986) vermeldten deze soort als *T. obscura*.

Miturgidae

Cheiracanthium, alle soorten.

Het genus *Cheiracanthium* wordt nu in de familie van de Miturgidae geklasseerd.

Liocranidae

Agroecina lineata (SIMON, 1878)

Voor het eerst vermeld in België door JANSSEN (1994).

Agroeca inopina O. P.-CAMBRIDGE, 1886

Na niet bevestigde mondelinge meldingen (BOSMANS & MAELFAIT, 1986) werd het voorkomen zeker vastgesteld door BAERT & DESENDER (1993).

{*Agroeca striata* (KULCZYN'SKI, 1882)}

Voor deze soort creëerde WUNDERLICH (1999) het nieuwe genus *Liocranoeca*.

Liocranoeca striata (KULCZYN'SKI, 1882)

WUNDERLICH (1999) creëerde voor deze soort het nieuwe genus *Liocranoeca*.

Phrurolithus festivus (C. L. KOCH, 1835) en *Ph. minimus* C. L. KOCH, 1839

In BOSMANS & MAELFAIT (1986) werden beide soorten in de familie van de Clubionidae geplaatst.

Clubionidae

{*Cheiracanthium*, alle soorten}

Dit genus wordt nu in de familie van de Miturgidae geplaatst.

Clubiona compta C. L. KOCH, 1839

De correcte schrijfwijze is *C. compta* en niet *C. compta*.

Clubiona frisia WUNDERLICH & SCHUETT, 1995

Deze vroeger met *C. similis* verwarde soort is recent beschreven en het is deze soort die in België voorkomt (WUNDERLICH & SCHUETT, 1995). De echte *C. similis* is een alpiene soort.

Clubiona juvenis SIMON, 1878.

BOSMANS & MAELFAIT (1986) vermeldten verkeerdelijk JANSSEN (1986, in druk) als eerste vermelder van deze soort. Het is echter DECLEER (1986) die de soort voor het eerst in België meldde.

Clubiona pseudoneglecta WUNDERLICH, 1994

Voor het eerst in België vermeld door JANSSEN & BONTE (1998).

{*Clubiona similis* L. KOCH, 1867}

Alle vermeldingen uit België dienen als *C. frisia* beschouwd te worden (zie hoger).

{*Phrurolithus festivus* (C. L. KOCH, 1835) en *Ph. minimus* C. L. KOCH, 1839}

Beide soorten werden van de Clubionidae naar de Liocranidae overgeplaatst.

Zodariidae

{*Zodarium gallicum* (SIMON, 1872)}

Deze soort komt niet in België voor. Het areaal is beperkt tot Zuidoost Frankrijk, Corsica, Italië en Kroatië. Alle citaties van België van *Z. gallicum* betreffen *Z. italicum* (BOSMANS, 1997).

Gnaphosidae

Arboricaria subopaca (WESTRING, 1861)

Deze soort werd in BOSMANS & MAELFAIT (1986) nog in het genus *Micaria* geplaatst.

Drassyllus villicus (THORELL, 1875)

Deze soort dient in het genus *Drassyllus* geklasseerd te worden en niet in het genus *Zelotes*. Dit werd in BOSMANS & MAELFAIT (1986) over het hoofd gezien.

Gnaphosa nigerrima L. KOCH, 1877

Voor het eerst in België vermeld door JANSSEN (1987a).

Gnaphosa opaca HERMAN, 1879

Voor het eerst in België gemeld door JANSSEN (1994)

Haplodrassus moderatus (KULCZYN'SKI, 1897)

Voor het eerst in België vermeld door NOORDAM (1993).

Micaria subopaca (WESTRING, 1861)

Voor deze en andere verwante, boombewonende *Micaria*-soorten creëerden BOSMANS & BLICK (2000) het genus *Arboricaria*.

Zelotes aeneus (SIMON, 1878)

BOSMANS & MAELFAIT (1986) vermeldten deze soort van een publicatie in druk: MAELFAIT & al., 1988.

Zelotes longipes (L. KOCH, 1866)

In BOSMANS & MAELFAIT (1986) vermeld als *Zelotes serotinus*.

Zelotes pseudoclivicola GRIMM, 1982

Voor het eerst in België gemeld door JANSSEN (1988).

{*Zelotes serotinus* (L. KOCH, 1867)}

De correcte naam voor deze soort is *Z. longipes*.

Zoridae

Zora parallela SIMON, 1878

Voor het eerst in België gemeld in de AMINAL-brochure (2000b) over het heidebeheer in Limburg, met identificatie van het materiaal door Marc JANSSEN. Nadere gegevens moeten nog gepubliceerd worden.

Philodromidae

Philodromus albidus KULCZYN'SKI, 1911

Voor het eerst in België gemeld door SEGERS (1989).

Philodromus longipalpis SIMON, 1870

Voor het eerst in België gemeld door VAN DIJCK & al. (2001) in een studie over monitoring van Vlaamse natuurgebieden, met determinatie van het materiaal door Jean-Pierre MAELFAIT. Nadere gegevens moeten nog worden gepubliceerd.

{*Philodromus poecilus* THORELL, 1872}

BECKER (1882) vermeldt deze soort van Yvoir (Namur) en hiertoe beperken zich de Belgische vindplaatsen. SEGERS & BAERT (1991) konden geen enkele vindplaats toevoegen en vermeldden de soort onder voorbehoud. Onder andere door de werken van SEGERS (1987, 1990, 1992) is het geweten dat soorten van het genus *Philodromus* zeer moeilijk te determineren zijn en niet over alle Europese soorten is er reeds klaarheid. In de tijd van BECKER (1882) was het geslacht zeker onvoldoende gekend. Gezien het huidige gekende areaal niet tot België reikt wordt de soort van de Belgische lijst afgevoerd.

Philodromus praedatus O. P.-CAMBRIDGE, 1871

Voor het eerst in België vermeld door SEGERS (1987). BOSMANS & MAELFAIT (1986) vermeldten deze publicatie nog als in druk.

Thomisidae

Heriaeus graminicola (DOLESCHALL, 1852)

In BOSMANS & MAELFAIT (1986) gemeld als *H. hirtus*.

{*Heriaeus hirtus* (LATREILLE, 1819)}

Gezien het areaal is het niet *Heriaeus hirtus* die bij ons voorkomt maar *H. graminicola* (zie ook hoofdstuk 2).

Ozyptila sp., alle soorten

De correcte schrijfwijze van de naam van dit genus is *Ozyptila* en niet *Oxyptila*.

Ozyptila claveata (WALCKENAER, 1837)

O. claveata is de oudere en geldige naam voor de door BOSMANS & MAELFAIT (1986) als *O. nigrita* (THORELL, 1875) gemelde soort.

Ozyptila pullata (THORELL, 1875)

Voor het eerst in België gemeld in de catalogus van de Belgische Thomisidae door JANSSEN (1992a). Deze auteur stelde dat alle als *O. rauda* van België geciteerde exemplaren in werkelijkheid *O. pullata* betroffen. Hem waren toen geen Belgische vindplaatsen van *O. rauda* bekend.

Ozyptila rauda SIMON, 1875

NOORDAM (in ROBERTS, 1998) vermeldt dat deze soort in Oost-België voorkomt. Deze waarnemingen zouden concreet moeten bevestigd worden.

Xysticus audax (SCHRANK, 1803)

Voor het eerst in België gemeld door SEGERS & POLLET (1988).

Xysticus kempeleni THORELL, 1872

De correcte naam voor deze soort is *X. kempeleni*, en niet *X. kempelini* zoals vermeld in BOSMANS & MAELFAIT (1986).

Xysticus ninnii THORELL, 1872

Voor het eerst gemeld in België door JANSSEN & BONTE (1998).

Salticidae

{*Aelurillus festivus* (C. L. KOCH, 1834)}

LOGUNOV & HECIAK (1996) creëerden voor deze soort het genus *Asianellus*.

{*Asianellus festivus* (C. L. KOCH)}

De enige vindplaats van deze soort is Brussel (Giltay, 1927). In de catalogus van RANSY & BAERT (1987b) konden deze auteurs geen nieuwe vindplaatsen vermelden en er is geen bewijsmateriaal van de eerste melding. *Asianellus festivus* is een warmteminnende soort die zeldzaam is in Midden-Europa en algemeen in Zuid-Europa. In het licht van dit areaal en de habitatvoorkeur kan een onverifieerbare waarneming in Brussel niet worden aanvaard en wordt de soort afgevoerd van de Belgische lijst.

{*Attulus helveolus* SIMON, 1871}

De correcte naam voor deze soort is *Sitticus distinguendus*.

Ballus chalybeius (WALCKENAER, 1802)

BOSMANS & MAELFAIT (1986) vermeldten deze soort als *Ballus depressus*.

{*Bianor aurocinctus* (OHLERT, 1865)}

LOGUNOV (2001) plaatste deze soort in het nieuwe genus *Sibianor*.

{*Dendryphantus nidicolens* (WALCKENAER, 1802)}

Deze soort werd overgeplaatst naar het genus *Macaroeris*.

{*Euophrys aequipes* (O. P.-CAMBRIDGE, 1871) en *E. petrensis* (C. L. KOCH, 1837)}

Deze soorten werden van het genus *Euophrys* naar het genus *Talavera* overgeplaatst.

{*Euophrys erratica* (WALCKENAER, 1825) en *E. lanigera* (SIMON, 1871)}

Beide soorten werden overgeplaatst naar het genus *Pseudeuophrys*.

Evarcha jucunda (LUCAS, 1846)

Deze mediterrane soort werd in België gemeld door ALDERWEIRELDT (1996), namelijk van Melle in Oost-Vlaanderen. Het enige aangetroffen exemplaar is wellicht geïmporteerd vanuit het zuiden, tenzij de soort aan een gevoelige areaaluitbreiding naar het noorden toe is. De toekomst zal dit uitmaken.

Hasarius adansoni (Audouin, 1826)

De correcte auteur en beschrijvingsdatum van deze soort is AUDOUIN, 1826 en niet SAVIGNY & AUDOUIN, 1827 zoals vermeld in BOSMANS & MAELFAIT (1986).

Macaroeris nidicolens (WALCKENAER, 1802)

BOSMANS & MAELFAIT (1986) vermeldten deze soort als *Dendryphantus nidicolens*.

Neon valentulus FALCONER, 1912

Voor het eerst in België geciteerd door JANSSEN (1987b).

Pseudeuophrys erratica (WALCKENAER, 1825) en *P. lanigera* (SIMON, 1871)

Beide soorten werden van *Euophrys* naar *Pseudeuophrys* overgeplaatst.

Sibianor aurocinctus (OHLERT, 1865)

LOGUNOV (2001) plaatste deze soort in het nieuwe genus *Sibianor*.

Sitticus distinguendus (SIMON, 1868)

BOSMANS & MAELFAIT (1986) vermeldten deze soort onder de naam van *Attulus helveolus*.

Sitticus saltator (SIMON, 1868)

Werd overgeplaatst van *Attulus* naar *Sitticus*.

Talavera aperta (MILLER, 1971)

Voor het eerst in België gemeld door VANUYTVEN (1995).

Talavera aequipes (O. P.-CAMBRIDGE, 1871) en *T. petrensis* (C. L. KOCH, 1837)

Deze soorten werden van het genus *Euophrys* naar het genus *Talavera* overgeplaatst.

Soorten mondeling gemeld van België maar gegevens niet gepubliceerd.

Linyphiidae

{*Porrhomma montanum* JACKSON, 1913}

De aanwezigheid van deze soort in België zou gemeld zijn op de ARABEL-vergadering van

21.V.1988. In de notulen van de vergadering (ARABEL 8: 3) wordt hierover niets vermeld. De soort wordt niet opgenomen in de lijst wegens onvoldoende bewijsmateriaal.

Oxyopidae

{*Oxyopes nigripalpis* KULCZYN'SKI, 1907}

De aanwezigheid van deze soort in België zou gemeld zijn op de ARABEL-vergadering van 25.I.1997. In de notulen van de vergadering (NIEUWSBRIEF ARABEL 12 (1): 31) wordt hierover niets vermeld. De soort wordt niet opgenomen in de lijst wegens onvoldoende bewijsmateriaal.

Agelenidae

{*Coelotes atropos* (WALCKENAER, 1830)}

Mondeling gemeld op de vergadering van 27.V.1989 door M. RANSY, en ook in de notulen van de vergadering opgenomen (NIEUWSBRIEF ARABEL 11: 6). Materiaal van Mirwart uit de provincie Luxemburg zou één wijfje *C. atropos* en verschillende wijfjes *C. terrestris* bevatten. Wijfjes van *Coelotes* zijn niet gemakkelijk te onderscheiden en de vangst van mannetjes dringt zich op om de aanwezigheid in België te bewijzen. *C. atropos* is enkel gekend van Groot Brittanië. Ze werd reeds herhaaldelijk van ons land gemeld, maar in de catalogus van DE BLAUWE & BAERT (1981) werden al deze waarnemingen verworpen. Vooraleer de aanwezigheid in België te aanvaarden dient degelijk bewijsmateriaal voor te liggen.

HOOFDSTUK 4. SOORTENLIJST VAN DE BELGISCHE SPINNEN.

In appendix 1 zijn de in België voorkomende spinnenfamilies gerangschikt zoals in PLATNICK (2002) met vermelding van het nummer in de catalogus van PLATNICK (2002) en het aantal in België voorkomende soorten. In het appendix 2 worden alle in België voorkomende soorten opgesomd en worden alle wijzigingen en

toevoegingen aan de vorige catalogus van BOSMANS & MAELFAIT (1986) vermeld. Al deze wijzigingen werden in hoofdstuk drie reeds apart besproken.

De wetenschappelijke naam wordt gevolgd door een Nederlandse naam zoals die in een overlegcomité werd overeengekomen.

HOOFDSTUK 5. KENNIS VAN DE SPINNENFAUNA IN EEN AANTAL ANDERE EUROPESE LANDEN.

Een gezamenlijke soortenlijst van België, Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland is te vinden op www.arages.de/checklisten.html. Het

aantal soorten voorkomend in deze en een aantal andere Europese landen is weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Aantal soorten spinnen in een aantal Europese landen.

Land	Auteur	Aantal soorten
België	BOSMANS & VANUYTVEN, 2001	679
Bulgarije	DELTSJEV & BLAGOEV, 2001	910
Denemarken	LANGEMARK, 2000	500
Duitsland	BLICK & HÄNGGI, 2000	984
Griekenland	DELTSJEV, 1999	642
Groot Brittanië	MERRETT & MURPHY, 2000	645
Hongarije	SAMU & SZINETAR, 1999	725
Ierland	MC FERRAN, 1997	375
IJsland	AGNARSSON, 1996	89
Italië	PESARINI, 1994	1406
Lithouwen	RELYS, 1996	277
Oostenrijk	BLICK & HÄNGGI, 2000	934
Kroatië	DELTSJEV, 1999	615
Nederland	HELSDINGEN, 1999	640
Noorwegen	AAKRA & HAUGE, 2000	559
Polen	KUPRYJANOWICZ, 2000	796
Portugal	CARDOSO, 1999	642
Roemenië	WEISS & URAK, 2000	972
Servië	DELTSJEV, 1999	508
Slovakije	GAJDOS & al. 1999	927
Spanje (incl. Balearen)	MELIC (persconl. med.)	1180
Tsjechië	BUCHAR, 1997	781
Zweden	KRONESTEDT, 2001	704
Zwitserland	BLICK & HÄNGGI, 2000	930

DANKWOORD

De volgende personen werkten kritisch mee aan het tot stand komen van dit werk en verdienen onze oprechte dank: Mark Alderweireldt, Theo Blick,

Domir De Bakker, Eric Duffey, Frederik Hendrickx, Rudy Jocqué, Aart Noordam, Johan Van Keer en Georges Wauthy.

LITERATUUR

ALDERWEIRELDT, M. (1987). *Robertus grasshoffi* WUNDERLICH, 1973 (Araneae: Theridiidae), une espèce nouvelle pour la faune belge. Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie 123: 309-310.

ALDERWEIRELDT, M. & J.-P. MAELFAIT (1990). Catalogus van de Belgische spinnen. Deel VII. Lycosidae. Documents de Travail de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique 61: 1-92.

ALDERWEIRELDT, M. (1993). *Robertus kuhnae* BAUCHHENSS & UHLENHAUT, 1993, een nieuwe naam voor het Belgische materiaal van *Robertus grasshoffi* WUNDERLICH, 1973. Nieuwsbrief van de Belgische arachnologische Vereniging 8: 53-54.

ALDERWEIRELDT, M. & J.-P. MAELFAIT (1993). Taxonomische wijzigingen en aanvullingen op de soortenlijst van de Belgische wolfspinnen (Araneae, Lycosidae). Nieuwsbrief van de Belgische arachnologische Vereniging 8: 13-14.

ALDERWEIRELDT, M. (1996). *Evarcha jucunda* (LUCAS), nieuw voor de Belgische fauna. Nieuwsbrief van de Belgische arachnologische Vereniging 11: 79-80.

AMINAL (2000a). Fauna-elementen in de wegbermen langs de autosnelweg E314. AMINAL-Dossier nr. 4: 1-11. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Natuur, Brussel.

AMINAL (2000b). Evaluatie van het actuele heidebeheer Limburg. AMINAL-Dossier nr. 5: 1-11. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Natuur, Brussel.

BAERT, L., J. BOSSELAERS & J. KEKENBOSCH (1984). Araignées rares ou nouvelles pour la faune belge. Communication. Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie 120: 318-321.

BAERT, L. & J. VAN KEER (1991). A remarkable spider capture: *Carniella brignolii* THALER & STEINBERGER, 1988, and the rediscovery of *Pseudomaro aenigmaticus* DENIS, 1966 in Belgium. Nieuwsbrief van de Belgische arachnologische Vereniging 6: 5.

BAERT, L., J. KEKENBOSCH & J.-P. MAELFAIT (1992). Faune aranéologique du 'Site de Corphalie' (Antheit, prov. Liège). Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie 128: 37-46.

BAERT, L. & K. DESENDER (1993). De spinnenfauna van het militair domein te Lombartsijde (Araneae). Nieuwsbrief van de Belgische arachnologische Vereniging 8: 15-20.

BAERT, L. (1994). Aanvulling bij de soortenlijst van de spinnen van België van BOSMANS &

MAELFAIT (1986). Nieuwsbrief van de Belgische arachnologische Vereniging 9: 40-43.

BAERT, L. (1996). Catalogus van de Spinnen van België. Deel XIV. Linyphiidae (Erigoninae). Documents de Travail de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique 82: 1-179.

BAUCHHENSS, E. & H. UHLENHAUT (1993). *Robertus kuehnae* n. sp. eine neue Kleintheridiide aus Mitteleuropa (Arachnida, Araneae, Theridiidae). Entomologische Nachrichte 37: 25-28.

BECKER, L. (1878). Catalogue des arachnides de Belgique. 1ière partie. Annales de la Société entomologique de Belgique 21: 45-62.

BECKER, L. (1882). Les Arachnides de Belgique. (1ière partie). Annales du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique X: 1-246.

BECKER, L. (1896). Les Arachnides de Belgique. (3ième partie). Annales du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique XII: 1-378.

BENOIT, P. L. G. (1966). Citations d'Araignées rares ou nouvelles pour la faune de Belgique. Bulletin et Annales de la Société entomologique de Belgique 103: 77-81.

BLICK, T. & R. MOLENDEN. (1997). *Bathyphantes eumenis* (L. KOCH, 1879) first record in Belgium. Newsletter of the British arachnological Society 78: 10.

- BOSMANS, R. (1985). Etudes sur les Linyphiidae nord-africains. II. Le genre *Oedothorax* BERTKAU en Afrique du Nord avec une révision des caractères diagnostiques des mâles des espèces Ouest-paléarctiques. Biologisch Jaarboek Dodonaea 53: 58-75.
- BOSMANS R. & J.-P. MAELFAIT (1986). Herziene soortenlijst van de Belgische spinnen. Nieuwsbrief van de Belgische arachnologische Vereniging 3: 9-29.
- BOSMANS, R. (1991a). Enkele opmerkingen over vroeger van België geciteerde spinnen, waarvan het voorkomen in ons land twijfelachtig is of dient bevestigd te worden. Nieuwsbrief van de Belgische arachnologische Vereniging 6: 9-12.
- BOSMANS, R. (1991b). Le genre *Sintula* SIMON en Afrique du Nord (Araneae, Linyphiidae). Etudes sur les Linyphiidae nord-africaines, VI. Revue arachnologique 9: 103-117.
- BOSMANS, R. (1991c). Genus *Lepthyphantes*. In: Spinnen Mitteleuropas. Ein Bestimmungsbuch. Heimer & Nentwig ed., Berlin und Hamburg, pp. 178-201.
- BOSMANS, R. (1996). Verslag van de tweedaagse ARABEL-excursie naar Dourbes in de vallei van de Viroin (Henegouwen). Nieuwsbrief van de Belgische arachnologische Vereniging 11: 10.
- BOSMANS, R. (1997). Revision of the genus *Zodariion* Walckenaer, 1833 part II. Western and Central Europe, including Italy (Araneae, Zodariidae). Bulletin of the British arachnological Society 10: 265-294.
- BOSMANS, R. & VANUYTVEN, H. (1998). *Eperigone eschatologica* een Amerikaanse immigrant in West-Europa (Araneae, Erigonidae). Nieuwsbrief van de Belgische arachnologische Vereniging 13: 15-16.
- BOSMANS, R. & T. BLICK. 2000. Contribution to the knowledge of the genus *Micaria* Westring in the West-palaearctic region, with description of the new genus *Arboricaria* and three new species (Araneae: Gnaphosidae). Mem. Soc. entomol. ital. 78: 443-476.
- BREUSS, W. (1999). Über die Spinnen (Araneae) und Weberknechte (Opiliones) des Naturschutzgebietes Gsieg - Obere Mälder (Lustenau, Vorarlberg). Vorarlberg Naturschau 6: 215-236.
- CASEMIR, H. (1976). Beitrag zur Hochmoor-Spinnenfauna des Hohen Venns (Hautes Fagnes) zwischen Nordeifel und Ardennen. Decheniana 129: 38-72.
- DE BAKKER, D. & BAERT, L. (1999). *Tuberta maerens* (O.P.-CAMBRIDGE, 1863), een nieuwe spin voor de Belgische fauna (Araneae, Hahniidae). Bulletin de la Société royale belge d'Entomologie 135: 181-183.
- DE BLAUWE, R. & L. BAERT (1981). Catalogue des Araignées de Belgique. Première partie: famille des Agelenidae. Bulletin de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique 53: 1-37.
- DECLEER, K. & D. MAES (1989). Voorlopige soortenlijst en synoecologie van de spinnen (Araneae) van het natuurreservaat "De Zwarte Beek" (Koersel-Beringen, Limburg). Nieuwsbrief van de Belgische arachnologische Vereniging 11: 19-29.
- DECLEER, K. (1986). Enkele nieuwe of zeldzame spinnen voor de Belgische fauna van moerasgebieden. Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie 122: 319-321.
- DECLEER, K. (1988). Quelques remarques sur *Tetragnatha striata* (L. KOCH, 1862): une nouvelle espèce pour l'araneofaune belge. Nieuwsbrief van de Belgische arachnologische Vereniging 7: 11-13.
- DECLEER, K. (1992). First record of the Linyphiid Spider *Entelecara omissa* O. P.-CAMBRIDGE on the European mainland. Newsletter of the British arachnological Society 64: 6-7.
- DE KEER, R. & J.-P. MAELFAIT (1988). *Oedothorax gibbosus* (BLACKWALL) and *Oe. tuberosus* (BLACKWALL): one species. Newsletter of the British arachnological Society 53: 3.
- DE KNIJF, G., J.-P. MAELFAIT & R. BOSMANS (1994). *Maro sublestus* FALCONER, 1915: nieuw voor de Belgische fauna. Nieuwsbrief van de Belgische arachnologische Vereniging 9: 53-54.
- DUMBERT & PLATEN (1985). Zur Biologie eines Büchenwaldbodens 4. Die Spinnenfauna. Caroleinea 42: 75-106.
- ESKOV, K. Y. & Y. M. MARUSIK. (1992). The spider genus *Centromerus* (Aranei Linyphiidae) in the fauna of Siberia and the Russian Far East, with an analysis of its distribution. Arthropoda Selecta 1(2): 33-46.
- FRAITURE, A. (1973). A propos de quelques araignées remarquables. Les Naturalistes belges 54: 366-378.
- GILTAY, L. (1927). Communication. Capture de deux Araignées nouvelles pour la faune: *Tetragnatha solandrii* SCOP. et *Aelurillus festivus* C. L. KOCH. Annales de la Société entomologique de Belgique 67: 184.
- HÄNGGI, A. (1990). Beiträge zur Kenntnis der Spinnenfauna des Kt. Tessin III. Für die Schweiz neue

und bemerkenswerte Spinnen (Arachnida: Araneae). Mitteilungen der schweizerischen entomologischen Gesellschaft 63: 153-167.

HENDRICKX, F. (1998). Verslag Arabel-excursies 1997 naar het Groot Schietveld, De Goren en het Goor. Nieuwsbrief van de Belgische arachnologische Vereniging 13: 37-42.

HENDRICKX, F., K. DE COCK, D. DE BAKKER & J.-P. MAELFAIT (2001). Differences in geographic distribution and habitat of some cryptic species in the *Pardosa lugubris* group (Lycosidae, Araneae) in Belgium. Belgian Journal of Zoology 131: 61-66.

HENDRICKX, F. & D. DE BAKKER (2001). Een faunistische en ecologische bijdrage tot de spinnenfauna van zuid en oost België. Deel 1. Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging 16: 23-34.

HUBLÉ, J. (1988). Mededeling zonder titel. Nieuwsbrief van de Belgische arachnologische Vereniging 7: 6.

JACOBS, J. (1993). Catalogue des Araignées de Belgique. Partie XII. Metidae. Documents de Travail de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique 71: 45-52.

JÄGER, P. (1995a). Spinnenaufsammlungen aus Ostösterreich mit vier Erstnachweisen für Österreich. Arachnologische Mitteilungen 9: 12-25.

JÄGER, P. (1995b). Erstnachweise von *Macaroeris nidicolens* und *Icius subinermis* für Deutschland in Köln (Araneae: Salticidae). Arachnologische Mitteilungen 9: 38-39.

JANSSEN, M. (1986). *Macrargus carpenteri* (O. P.-CAMBRIDGE), nieuw voor de Belgische fauna. Nieuwsbrief van de Belgische arachnologische Vereniging 2: 21.

JANSSEN, M. (1987a). Mededeling zonder titel. Nieuwsbrief van de Belgische arachnologische Vereniging 4: 5.

JANSSEN, M. (1987b). De spinnenfauna in het natuurreervaat "Het Hageven" te Neerpelt, Belgisch Limburg. Nieuwsbrief van de Belgische arachnologische Vereniging 4: 9.

JANSSEN, M. (1988). Twee nieuwe soorten voor de Belgische fauna. Nieuwsbrief van de Belgische arachnologische Vereniging 9: 5-6.

JANSSEN, M. (1992a). *Oxyptila pullata* (Thorell, 1875) (Araneae, Thomisidae) in België. Nieuwsbrief van de Belgische arachnologische Vereniging 7: 9.

JANSSEN, M. (1992b). Enkele interessante spinnen van een steengroeve in de provincie Luik. Nieuwsbrief van de Belgische arachnologische Vereniging 7: 15-18.

JANSSEN, M. (1993). Catalogus van de Belgische spinnen. Deel XIII. Thomisidae. Studiedocumenten van het koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 71: 54-78.

JANSSEN, M. (1994). Vier nieuwe spinnensoorten voor de Belgische fauna. Nieuwsbrief van de Belgische arachnologische Vereniging 9: 82-83.

JANSSEN, M. & D. BONTE (1998). Enkele nieuwe en zeldzame spinnen voor Vlaanderen en België. Nieuwsbrief van de Belgische arachnologische Vereniging 13: 48-51.

JOCQUÉ, R. (1977). Contribution à la connaissance des araignées de Belgique. IV. Biologisch Jaarboek Dodonaea 45: 141-149.

JOCQUÉ, R. (1992). Nederlandse namen voor inheemse spinnen. Nieuwsbrief van de Belgische arachnologische Vereniging 7: 1-20.

JOCQUÉ, R. (1996). Mededeling zonder titel. Nieuwsbrief van de Belgische arachnologische Vereniging 11: 88.

KEKENBOSCH, J. (1966). Une Araignée nouvelle pour la faune de Belgique: *Tetrilus arietinus* (THORELL). Bulletin de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique 102: 58.

KEKENBOSCH, J., R. BOSMANS & L. BAERT (1977). Soortenlijst der Belgische Spinnen. Studiedocumenten van het koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 11: 1-36.

KNOFLACH, B. & K. THALER (2000). Notes on mediterranean Theridiidae. I. Memoires de la Société entomologique d'Italie 78: 411-442.

LELOUP, E. & B. KONIETZKO (1956). Recherches biologiques sur les eaux saumâtres du Bas-Escaut. Mémoires de l'Institut royal de Belgique 132: 1-100.

LERUTH, R. (1939). La biologie du domaine souterraine et la faune cavernicole de la Belgique. Mémoires du Musée royal de Belgique 87: 1-506.

LOERBROKS, A. (1983). Revision der Krabbenspinnen-Gattung *Heriaeus* Simon (Arachnida: Araneae: Thomisidae). Verhandlungen der naturwissenschaftlichen Verein Hamburg 26: 85-139.

LOGUNOV, D. V. & S. HECIAK (1996). *Asianellus*, a new genus of the subfamily Aelurillinae (Araneae: Salticidae). Entomologia scandinavia 26: 103-117.

- LOGUNOV, D. V. (2001). A redefinition of the genera *Bianor* Peckham & Peckham, 1885 and *Harmochirus* Simon, 1885, with the establishment of a new genus *Sibianor* gen. n. (Aranei: Salticidae). *Arthropoda Selecta* 9: 221-286.
- MAELFAIT, J.-P. & L. BAERT. (1987). Mededeling zonder titel. Nieuwsbrief van de Belgische arachnologische Vereniging 5: 3.
- MAELFAIT, J.-P., V. BRUYNBROECK, H. VANUYTVEN & R. DE KEER (1988). De eerste waarnemingen van *Zelotes aeneus* (SIMON, 1878) in België, het belang daarvan voor het natuurbewoud. Nieuwsbrief van de Belgische arachnologische Vereniging 8: 53-55.
- MARUSIK, Y. K. & A. V. TANASEVITCH (1998). Notes on the spider genus *Styloctetor* SIMON, 1884 and some related genera, with descriptions of two new species from Siberia. *Arthropoda Selecta* 7: 153-159.
- MAURER, R. & A. HÄNGGI (1990). Katalog der schweizerischen Spinnen. *Documenta Faunistica Helvetica* 12, 412 pp.
- MILLIDGE, A. F. 1988. Genus *Princrigone*, gen. nov. (Araneae: Linyphiidae). *Bulletin of the British arachnological Society* 7: 216.
- NOORDAM, A. (1993). Spinnen van het Trickebruch en omgeving (Hautes Fagnes, België). Nieuwsbrief van de Belgische arachnologische Vereniging 8: 1-12.
- PLATNICK, N. I. (2002). The world spider catalog, version 2.5. American Museum of Natural History, online at <http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog81-87/index.html>.
- RANSY, M. & L. BAERT (1985). Catalogue des Araignées de Belgique. Deuxième partie. Les Cribellates. Documents de Travail de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique 22: 1-24.
- RANSY, M. & L. BAERT (1987a). Catalogue des Araignées de Belgique. Troisième partie. Les Araneidae. Documents de Travail de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique 36: 1-41.
- RANSY, M. & L. BAERT (1987b). Catalogue des Araignées de Belgique. Quatrième partie. Salticidae. Documents de Travail de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique 43: 1-32.
- RANSY, M. & L. BAERT (1987c). Catalogue des Araignées de Belgique. Cinquième partie. Anyphaenidae, Argyronetidae, Atypidae, Dysderidae, Mimidae, Nesticidae, Oonopidae, Oxyopidae, Pholcidae, Pisauridae, Scytodidae, Segestriidae, Eusparassidae, Zodariidae, Zoridae. Documents de Travail de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique 46: 1-25.
- RANSY, M., J. KEKENBOSCH & L. BAERT (1990). Catalogue des Araignées de Belgique. Partie VI. Clubionidae et Liocranidae. Documents de Travail de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique 57: 1-30.
- RANSY, M. & L. BAERT (1991). Catalogue des Araignées de Belgique. Partie VIII. Gnaphosidae. Documents de Travail de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique 64: 1-30.
- RANSY, M. & L. BAERT (1991). Catalogue des Araignées de Belgique. Partie X. Tetragnathidae. Documents de Travail de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique 64: 43-54.
- RATSCHKER U. M. & H. BELLMANN (1995). Zur Bestimmung der Mitteleuropäischen Arten der Gattung *Eresus* WALCKENAER 1805 (Arachnida: Araneae: Eresidae). *Beiträge zur Araneologie* 4: 217-218.
- ROBERTS, M. J. (1998). Spinnengids. Geïllustreerd door de schrijver. Vertaling en bewerking door A. P. NOORDAM. Tirion, Baarn, 397 pp.
- SAARISTO, M. I. & A. V. TANASEVITCH. (1996). Redelimitation of the subfamily Micronetinae HULL, 1920 and the genus *Lepthyphantes* MENGE, 1866 with descriptions of some new genera (Aranei, Linyphiidae). *Berichte von der nat.-med. Verein Innsbruck* 83: 163-186.
- SAARISTO, M. I. & A. V. TANASEVITCH (2000). Systematics of the *Bolyphantes-Poecilometes* genus-group of the subfamily Micronetinae HULL, 1920 (Arachnida: Araneae: Linyphiidae). *Reichenbachia* 33: 255-265.
- SAARISTO, M. I. & A. V. TANASEVITCH (2001). Reclassification of the *pallidus*-, *insignis*-, and *spelaeorum*-groups of *Lepthyphantes* MENGE, 1866 (sensu lato) (Arachnida: Araneae: Linyphiidae: Micronetinae). *Reichenbachia* 34: 5-17.
- SEGBERS, H. (1986). *Uloborus plumipes* LUCAS, nieuw voor de Belgische fauna. Nieuwsbrief van de Belgische arachnologische Vereniging 1: 18-20.
- SEGBERS, H. (1987). *Philodromus praedatus* O. P.-CAMBRIDGE, nieuw voor de Belgische fauna. Nieuwsbrief van de Belgische arachnologische Vereniging 5: 10-11.
- SEGBERS, H. (1988). Enkele nieuwe of zeldzame spinnensoorten voor de Belgische fauna. Nieuwsbrief van de Belgische arachnologische Vereniging 8: 43-45.

SEGRS, H. & R. BOSMANS (1988). *Pseudocarrion* thaleri (SAARISTO, 1971), nieuw voor de Belgische fauna (Araneae, Linyphiidae). Nieuwsbrief van de Belgische arachnologische Vereniging 7: 22-24.

SEGRS, J. & M. POLLET (1988). Aspecten van de spinnenfauna van enkele bosbestanden te Zedelgem. Nieuwsbrief van de Belgische arachnologische Vereniging 8: 47-50.

SEGRS, H. (1989). A redescription of *Philodromus albidus* KULCZYN'SKI, 1911. Bulletin of the British arachnological Society 8: 38-40.

SEGRS, H. (1990). The identification and taxonomic status of *Philodromus praedatus* O. P.-Cambridge (Araneae, Thomisidae). Revue arachnologique 9: 11-14.

SEGRS, H. (1992). Nomenclatural notes on, and redescription of some little-known species of the *Philodromus aureolus* group (Araneae: Philodromidae). Bulletin of the British arachnological Society 9: 19-25.

SEGRS, H. & L. BAERT (1991). Catalogue des Araignées de Belgique. Partie IX. Philodromidae. Documents de Travail de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique 64: 31-42.

SIMON, E. (1916). Les arachnides de France. Synopsis générale et catalogue des espèces françaises de l'ordre des Araneae; 1re partie. Paris, 6: 1-308.

TANASEVITCH, A. V. (1992). New genera and species of the tribe Lepthyphantini (Aranei Linyphiidae Micronetinae) from Asia (with some nomenclatorial notes on linyphiids). Arthropoda Selecta 1(1): 39-50.

THALER, K. & H. M. STEINER (1993). Zur epigäischen Spinnenfauna des Stadtgebietes von Wien (Österreich) - nach Aufsammlungen von Prof. Dr. W. Kühnelt. Berichte von der nat.-med. Verein Innsbruck 80: 303-310.

TÖPFER-HOFMANN, G., D. CORDES & O. VON HELVERSEN (2000). Cryptic species and behavioural isolation in the *Pardosa lugubris* group (Araneae, Lycosidae), with description of two new species. Bulletin of the British arachnological Society 11: 257-274.

VAN DIJCK, H., D. MAES & I. BRICHET (2001). Toepassen van een multisoortenbenadering bij planning en evaluatie in het Vlaamse natuurbehoud. Rapport Universitair Centrum Antwerpen (in opdracht van Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Natuur, Wilrijk).

VAN KEER, J. & K. VAN KEER (1988). *Theridiosoma gemmosum* (L. KOCH, 1877) nieuw voor de Belgische

fauna (Araneae: Theridiosomatidae). Nieuwsbrief van de Belgische arachnologische Vereniging 8: 41-42.

VAN KEER, K. (1991). *Dictyna major* MENGE, 1869: terug van weggeweest. Nieuwsbrief van de Belgische arachnologische Vereniging 6: 1.

VAN KEER, J. (1992). *A. veruculata* (URQUHART, 1885): nieuw voor België of toevallige gast? Nieuwsbrief van de Belgische arachnologische Vereniging 8: 21.

VAN KEER, J. (2000). *Anelosimus aulicus* (C. L. KOCH, 1838), een nieuwe mediterrane soort voor België (Araneae: Theridiidae). Nieuwsbrief van de Belgische arachnologische Vereniging 15: 23-26.

VAN KEER, J. & K. VAN KEER (1992). Twee nieuwe interessante vondsten voor de Belgische spinnenfauna: *Tegenaria saeva* en *Anelosimus pulchellus*. Nieuwsbrief van de Belgische arachnologische Vereniging 7: 13-14.

VAN KEER, J. & K. VAN KEER (1993). Spinnenfauna van het Gravenbos te Humbeek (Brabant). Nieuwsbrief van de Belgische arachnologische Vereniging 8: 25-31.

VAN KEER, J. & H. VANUYTVEN (1993). Catalogue des Araignées de Belgique. Partie XI. Theridiidae, Anapidae et Theridiosomatidae. Documents de Travail de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique 71: 1-44.

VANUYTVEN, H. (1987). Een nieuwe soort voor de Belgische fauna op de Antwerpse linkeroever. Nieuwsbrief van de Belgische arachnologische Vereniging 4: 23-24.

VANUYTVEN, H., J. VAN KEER & M. JANSSEN (1990). *Theridion hemerobium* SIMON, 1914 new for the Belgian spider fauna (Araneae, Theridiidae). Nieuwsbrief van de Belgische arachnologische Vereniging 5: 16.

VANUYTVEN, H. (1992). *Meioneta fuscipalpis* (C. L. KOCH, 1836) nieuw voor de Belgische fauna. Nieuwsbrief van de Belgische arachnologische Vereniging 7: 7-8.

VANUYTVEN, H. (1995). *Talavera aperta* (MILLER, 1971), een nieuwe springspin voor de Belgische fauna. Nieuwsbrief van de Belgische arachnologische Vereniging 10: 25-26.

VANUYTVEN, H. (1996). De spinnen van een verlaten steengroeve in Namen. Nieuwsbrief van de Belgische arachnologische Vereniging 11: 38-43.

VANUYTVEN, H. (2000). *Spermophora senoculata* (DUGÈS, 1836), alweer een in België ingevoerde soort. Nieuwsbrief van de Belgische arachnologische Vereniging 15: 1-2.

WUNDERLICH, J. (1973). Zur Spinnenfauna Deutschlands, XV. Weitere seltene und bisher unbekannte Arten sowie Anmerkungen zur Taxonomie und Synonymie (Arachnida: Araneae). *Senckenbergiana biologica* 54: 405-428.

WUNDERLICH, J. (1986). Spinnenfauna gestern und heute. Fossile Spinnen im Bernstein und ihre heute lebende Verwandten. Wiesbaden, E. Bauer bei Quelle & Meyer, 283 pp.

WUNDERLICH, J. (1987). Die Spinnen der Kanarischen Inseln und Madeiras. Triops, Langen, 435 pp.

WUNDERLICH, J. (1992). Die Spinnen-Fauna der Makaronesischen Inseln: Taxonomie, Ökologie, Biogeographie und Evolution. *Beiträge zur Araneologie* 1: 1-619.

WUNDERLICH, J. (1994). Beschreibung der neuen Spinnen-Gattung *Megalephyphantes* aus der Familie der Baldachinspinnen und einer bisher unbekannten Art aus Griechenland (Arachnida: Araneae: Linyphiidae). *Entomologische Zeitung, Frankfurt am Main* 104: 168-171.

WUNDERLICH, J. (1995). Zur Taxonomie Europäischer Gattungen der Zwergspinnen (Arachnida: Linyphiidae: Erigoninae). *Beiträge zur Araneologie* 4: 643-654.

WUNDERLICH, J. & K. SCHUETT (1995). Beschreibung der bisher verkannten Sackspinnen-Art *Clubiona frisia* aus Europa. *Entomologische Zeitung* 105: 10-17.

WUNDERLICH, J. (1999). *Liocranoeca* – eine bisher unbekannte Gattung der Feldspinnen aus Europa und Nordamerika (Arachnida: Araneae: Liocranidae). *Entomologische Zeitung* 109: 67-70.

VERWIJZINGEN NAAR SOORTENLIJSTEN VAN ANDERE LANDEN

AAKRA, K. & E. HAUGE (2000). Araneae Norvegiae. Checklist and distribution maps of Norwegian spiders with taxonomic zoogeographical and ecological notes. Version: 15.12.2000. Internet: <http://www.ntnu.no/vmuseet/nathist/norspider/>

AGNARSSON, I. (1996). Íslenskar köngulaer. Fjölrít Náttúrufræðistofnunar 31: 1-175.

BLICK, T. & A. HÄNGGI, with co-operation of K. THALER (2000). Checklist of the arachnids of Germany, Switzerland and Austria (Arachnida: Araneae, Opiliones, Pseudoscorpiones, Scorpiones, Palpigradi). 078-07-2000. Internet: http://www.arages.de/checklist_e.html

KLIMES, L. (2000). Check-list of spiders of the Czech Republic. Internet: <http://www.butbn.cas.cz/klimes/arachno>.

CARDOSO, P. (1999). Portuguese spiders checklist. Version 17.07.1999. Internet: <http://www.geocities.com/RainForest/Vines/5197/checklist.html>.

DELTSJEV, C. & G. BLAGOEV (2001). A critical check list of Bulgarian Spiders (Araneae). Bulletin of the British arachnological Society 12: 110-138.

GAJDOS, P., J. SVATON & K. SLOBODA (1999). Catalogue of Slovakian Spiders. 1-337. Bratislava.

HELSDINGEN, P. J. VAN (1999). Catalogus van de Nederlandse spinnen (Araneae). Nederlandse faunistische Mededelingen 10: 1-189.

KRONESTEDT, T. (2001). Checklist of spiders (Araneae) in Sweden. Version 001-02-15. Internet: <http://www.nrm.se/en/spindlar.html>.

KUPRYJANOWICZ, J. (2000). Checklist of Spiders of Poland. Version 2000-03-15. Internet: <http://cksr.ac.bialystok.pl/kuprzool/spiders.htm>.

LANGEMARK, S. (2000). Checklist of Danish Spiders. Internet: <http://www.zmuc.dk/EntoWeb/collections-databaser/dklist/main.htm>.

MCFERRAN, D. (1997). Checklist of the spiders of Ireland. Internet: <http://www.ehsni.gov.uk/EHSPubs/research/spiders.doc>.

MERRETT, P. & J. A. MURPHY (2000). A revised check list of British spiders. Bulletin of the British arachnological Society 11: 345-357.

PESARINI, C. (1994). Arachnida Araneae. In: MINELLI A., S. RUFFO & S. LA POSTA (Eds). Checklist delle specie della fauna italiana, 23. Calderini, Bologna.

RĖLYS, V. (1996). Checklist of spiders of Lithuania. <http://www.free-hosting.lt/lietvorai/index1.htm>.

SAMU, F. & C. SZINETAR (1999). Bibliographical checklist of the Hungarian spider fauna. Bulletin of the British arachnological Society 11: 161-184. Internet: <http://www.julia-nki.hu/arachnologischehtml>.

WEISS, I. & URÁK I. (2000). Faunenliste der Spinnen Rumäniens. Checklist of the Romanian spiders (Arachnida: Araneae). Version 27.12.2000. Internet: <http://members.aol.com/Arachnologie/Faunenlisten.htm>.

APPENDIX 1.

Families van de in België voorkomende spinnen, met hun aantal soorten.

Nummer	Familie	Nederlandse naam	Aantal soorten	Exoten
2	Atypidae	Mijnspinnen	2	
22	Scytodidae	Lijmspuiters	1	
28	Pholcidae	Trilspinnen	2	1
33	Segestriidae	Zesoogspinnen	3	
34	Dysderidae	Celspinnen	4	
35	Oonopidae	Dwergcelspinnen	2	
46	Mimetidae	Spinneneters	4	
47	Eresidae	Koepelspinnen	1	
48	Oecobiidae	Spiraalspinnen	1	
51	Uloboridae	Wielwebkaardespinnen	2	1
54	Nesticidae	Holenspinnen	1	
55	Theridiidae	Kogelspinnen	56	1
56	Theridiosomatidae	Parapluspinnen	1	
58	Anapidae	Dwergkogelspinnen	1	
61	Linyphiidae	Dwerg- en hangmatspinnen	255	1
62	Tetragnathidae	Strekspinnen	15	
63	Araneidae	Wielwebspinnen	37	
64	Lycosidae	Wolfspinnen	47	
66	Pisauridae	Kraamwebspinnen, visserspinnen	3	
67	Oxyopidae	Lynxspinnen	3	
75	Agelenidae	Trechterspinnen	14	
76	Cybaeidae	Waterspinnen (alleen <i>Argyroneta</i>)	1	
81	Hahniidae	Kamstaartjes	9	
82	Dictynidae	Kaardertjes	16	
83	Amaurobiidae	Nachtkardespinnen, bostrechterspinnen	6	
85	Titanoecidae	Rotskaardespinnen	1	
88	Miturgidae	Spoorspinnen	5	
89	Anyphaenidae	Buisspinnen	1	
90	Liocranidae	Bodemzakspinnen	14	
91	Clubionidae	Struikzakspinnen	21	
93	Zodariidae	Mierenjagerspinnen	2	
102	Gnaphosidae	Bodemjachtspinnen	44	
103	Zoridae	Stekelpootspinnen	4	
105	Sparassidae	Jachtkrabspinnen	1	
106	Philodromidae	Renspinnen	18	2
107	Thomisidae	Krabspinnen	37	
108	Salticidae	Springspinnen	43	
		Totaal aantal soorten	679	6

APPENDIX 2. Soortenlijst van de Belgische spinnen en wijzigingen ten opzichte van BOSMANS & MAELFAIT (1986).

Nr	F	Genus	Soort	Auteur	Opmerkingen en veranderingen	Nederlandse naam
1	2	Atypus	affinis	Eichwald, 1830		gewone mijnspin
2	2	Atypus	piceus	(Sulzer, 1776)	Hendrickx & De Bakker (2001)	kalkmijnspin
3	22	Scytodes	thoracica	(Latreille, 1802)	1804	getijgerde lijmspuit
4	28	Pholcus	phalangioides	(Fuesslin, 1775)		grote trilsin (hooiwagenspin)
5	28	Psilochorus	simoni	(Berland, 1911)		kleine trilsin
6	33	Segestria	bavarica	C.L. Koch, 1843		muurzesoo
7	33	Segestria	florentina	(Rossi, 1790)		kerkzesoo
8	33	Segestria	senoculata	(Linnaeus, 1758)		boomzesoo
9	34	Dysdera	crocata	C.L. Koch, 1838		roodwitte celsin
10	34	Dysdera	erythrina	(Walckenaer, 1802)		boscelsin
11	34	Harpactea	homberti	(Scopoli, 1763)		schorscelsin
12	35	Oonops	domesticus	Dalmat, 1916		huisdwergzesoo
13	35	Oonops	pulcher	Templeton, 1835		gewone dwergzesoo (gewone dwergcelsin)
14	46	Ero	aphana	(Walckenaer, 1802)		vierspitspinneneter
15	46	Ero	cambridgei	Kulczynski, 1911		cambridge spinneneter
16	46	Ero	furcata	(Villers, 1789)		gevorkte spinneneter
17	46	Ero	tuberculata	(De Geer, 1778)		grote spinneneter
18	47	Eresus	cinnabarinus	(Olivier, 1789)	E. niger	herfstvuurspin
19	47	Eresus	sandalatus	(Martini & Goetze, 1778)	E. niger	lentevuurspin
20	48	Oecobius	navus	Blackwall, 1859	Oe. annulipes	huisspiraalspin
21	51	Hyptiotes	paradoxus	(C.L. Koch, 1834)		driehoekswespin
22	51	Uloborus	walckenaerius	Latreille, 1806		wielwebkaardespin
23	54	Nesticus	cellulanus	(Clerck, 1757)		holenspin
24	55	Achaearanea	lunata	(Clerck, 1757)		prachtkogelspin
25	55	Achaearanea	riparia	(Blackwall, 1834)		bemkogelspin
26	55	Achaearanea	simulans	(Thorell, 1875)		valse broeikaspin
27	55	Achaearanea	tepidariorum	(C.L. Koch, 1841)		broeikaspin
28	55	Anelosimus	aulicus	(C.L. Koch, 1838)	Hendrickx, 1998; Van Keer, 2000	schijfhandje
29	55	Anelosimus	pulchellus	(Walckenaer, 1802)		volslanke kogelspin
30	55	Anelosimus	vittatus	(C.L. Koch, 1836)		slanke kogelspin
31	55	Camilla	brignolii	Thaler & Steinberger, 1985	Baert & Van Keer, 1991	mysterieus kogelspinnetje
32	55	Crustulina	guttata	(Wider, 1834)		gevekt raspinnetje
33	55	Crustulina	sticta	(O. P.-Cambridge, 1861)		egaal raspinnetje
34	55	Dipoena	coracina	(C.L. Koch, 1837)	1841	witvoetgalspin
35	55	Dipoena	erythropus	(Simon, 1881)		roodpootgalspin
36	55	Dipoena	inomata	(O. P.-Cambridge, 1861)	Baert & al., 1992	zijden galspin
37	55	Dipoena	melanogaster	(C.L. Koch, 1837)		gemarmerde galspin
38	55	Dipoena	prona	(Menge, 1868)		neusgalspin
39	55	Enoplognatha	caricis	(Fickert, 1876)	E. tecta	moerastandkaak
40	55	Enoplognatha	latimana	Hippa & Oksala, 1982		vergeten tandkaak
41	55	Enoplognatha	mordax	(Thorell, 1875)	E. crucifera	schorrendandkaak
42	55	Enoplognatha	oelandica	(Thorell, 1875)		gemarmerde tandkaak
43	55	Enoplognatha	ovata	(Clerck, 1757)		gewone tandkaak
44	55	Enoplognatha	thoracica	(Hahn, 1833)		bodemtandkaak
45	55	Episus	angulatus	(Blackwall, 1836)		gewone kabelspin
46	55	Episus	truncatus	Latreille, 1809		egale kabelspin
47	55	Euryopis	flavomaculata	(C.L. Koch, 1836)		geelvlekjachtkogelspin
48	55	Euryopis	laeta	(Westring, 1861)		zuidelijke jachtkogelspin
49	55	Lasaeola	tristis	(Hahn, 1833)	Dipoena t.	zwarte galspin
50	55	Neottiura	bimaculata	(Linnaeus, 1767)	Theridion b.	witbandkogelspin
51	55	Paidiscura	pallens	(Blackwall, 1834)	Theridion p.	kleine boskogelspin
52	55	Pholcomma	gibbum	(Westring, 1851)		pantserkogelspin
53	55	Robertus	arundineti	(O. P.-Cambridge, 1871)		moerasmolspin
54	55	Robertus	kuehnae	Bauchhens & Uhlenhaut, 1993	R. grashoffi; Alderweireldt, 1987	kuhns molspin
55	55	Robertus	lividus	(Blackwall, 1836)		bosmolspin
56	55	Robertus	neglectus	(O. P.-Cambridge, 1871)		vergeten molspin
57	55	Robertus	scoticus	Jackson, 1914		noordse molspin

Nr	F	Genus	Soort	Auteur	Opmerkingen en veranderingen	Nederlandse naam
57	55	Rugathodes	bellicosus	(Simon, 1873)	Theridion bellicosum; Janssen, 1988	bergkogelspin
58	55	Rugathodes	instabilis	(O. P.-Cambridge, 1871)	1870; Theridion i.	moeraskogelspin
59	55	Simitidion	simile	(C.L. Koch, 1836)	Theridion s.	witvlekheidekogelspin
60	55	Steatoda	albomaculata	(De Geer, 1778)		gevekte steatoda
61	55	Steatoda	bipunctata	(Linnaeus, 1758)		koffieboonspin
62	55	Steatoda	grossa	(C.L. Koch, 1838)		grote steatoda
63	55	Steatoda	phalerata	(Panzer, 1801)		heidesteatoda
64	55	Steatoda	triangulosa	(Walckenaer, 1802)		huissteatoda
65	55	Theonoe	minutissima	(O. P.-Cambridge, 1879)		kleinste kogelspin
66	55	Theridion	blackwalli	O. P.-Cambridge, 1871	1870	stalkogelspin
67	55	Theridion	familiale	O. P.-Cambridge, 1871		rechthoekkogelspin
68	55	Theridion	hannoniae	Denis, 1944	VanUytven, 1987	rotskogelspin
69	55	Theridion	hemerobius	Simon, 1914	T. hemerobius; VanUytven, 1990	rietkogelspin
70	55	Theridion	impressum	L. Koch, 1881		grote wigwamspin
71	55	Theridion	melanurum	Hahn, 1831		huiskogelspin
72	55	Theridion	mystaceum	L. Koch, 1870		donkere kogelspin
73	55	Theridion	pictum	(Walckenaer, 1802)		rood visgraatje
74	55	Theridion	pinastri	L. Koch, 1872		dennenkogelspin
75	55	Theridion	sisyphium	(Clerck, 1757)		kleine wigwamspin
76	55	Theridion	tinctum	(Walckenaer, 1802)		zwartringkogelspin
77	55	Theridion	uhligi	Martin, 1974	1975	uhligs kogelspin
78	55	Theridion	varians	Hahn, 1833		gewoon visgraatje
79	56	Theridiosoma	gemmosum	(L. Koch, 1877)	Van Keer & Van Keer, 1988	moeraspareltje
80	58	Comaroma	simoni	Bertkau, 1889	ex Theridiidae	harnasspinnetje
81	61	Acartauchenius	scurillis	(O. P.-Cambridge, 1872)		bleek haarkopje
82	61	Agyneta	cauta	(O. P.-Cambridge, 1902)		gezaagd dikpalpje
83	61	Agyneta	conigera	(O. P.-Cambridge, 1863)		gewoon slankpalpje
84	61	Agyneta	decora	(O. P.-Cambridge, 1871)	1870	gezaagd dikpalpje
85	61	Agyneta	ramosa	Jackson, 1912		moesslankpalpje
86	61	Agyneta	subtilis	(O. P.-Cambridge, 1863)		tandloos dikpalpje
87	61	Allomengea	scopigera	(Grube, 1859)		alert stekelpalpje
88	61	Allomengea	vidua	(L. Koch, 1879)		klein stekelpalpje
89	61	Anguliphantes	angulipalpis	(Westring, 1851)	Lethyphantes a.	geknikte bodemwevertje
90	61	Aphileta	misera	(O. P.-Cambridge, 1882)		veenmossinnetje
91	61	Araeoncus	crassiceps	(Westring, 1861)		arrogant voorkopje
92	61	Araeoncus	humilis	(Blackwall, 1841)		bescheiden voorkopje
93	61	Asthenargus	paganus	(Simon, 1884)		bleek haarpalpje
94	61	Baryphma	duffeyi	(Millidge, 1954)		klokspinnetje
95	61	Baryphma	maritimum	(Crocker & Parker, 1970)		heimgasputkopje
96	61	Baryphma	pratense	(Blackwall, 1861)		weideputkopje
97	61	Baryphma	trifrons	(O. P.-Cambridge, 1863)		kustputkopje
98	61	Bathyphantes	approximatus	(O. P.-Cambridge, 1871)		moeraswevertje
99	61	Bathyphantes	gracilis	(Blackwall, 1841)		gewoon wevertje
100	61	Bathyphantes	nigrinus	(Westring, 1851)		donker wevertje
101	61	Bathyphantes	parvulus	(Westring, 1851)		kleinste wevertje
102	61	Bathyphantes	setiger	F.O. P.-Cambridge, 1894		harig wevertje
103	61	Bathyphantes	simillimus	(L. Koch, 1879)	B. eumenis; Blick & Molenda, 1997	bergbeekwevertje
104	61	Bolyphantes	aiticeps	(Sundevall, 1833)	1832	hoog voorkopje
105	61	Bolyphantes	luteolus	(Blackwall, 1833)		gevekt voorkopje
106	61	Carorita	paludosa	Duffey, 1971		zompwevertje
107	61	Centromerita	bicolor	(Blackwall, 1833)		groot haarpalpje
108	61	Centromerita	concinna	(Thorell, 1875)		klein haarpalpje (heidepionierspinnetje)
109	61	Centromerus	arcanus	(O. P.-Cambridge, 1873)		tangpalpje
110	61	Centromerus	brevivulvatus	Dahl, 1912	C. aequalis	bostongpalpje
111	61	Centromerus	capucinus	(Simon, 1884)		kampalpje
112	61	Centromerus	dilutus	(O. P.-Cambridge, 1875)		middelste tongspinnetje
113	61	Centromerus	incilium	(L. Koch, 1881)		glad tandpalpje
114	61	Centromerus	leruthi	Fage, 1933		leruths tandpalpje
115	61	Centromerus	levitarsis	(Simon, 1884)	Hendrickx & de Bakker (2001)	veenhengelspin

Nr	F	Genus	Soort	Auteur	Opmerkingen en veranderingen	Nederlandse naam
116	61	Centromerus	pabulator	(O. P.-Cambridge, 1875)		kegelpalpe
117	61	Centromerus	persimilis	(O. P.-Cambridge, 1912)		drietongetje
118	61	Centromerus	prudens	(O. P.-Cambridge, 1873)		porseleinspinnetje
119	61	Centromerus	semilater	(L. Koch, 1879)	C. incultus	moerastongpalpe
120	61	Centromerus	serratus	(O. P.-Cambridge, 1875)		fijn zaagpalpe
121	61	Centromerus	sylvaticus	(Blackwall, 1841)		gewoon zaagpalpe
122	61	Ceratinella	brevipes	(Westring, 1851)		gewoon schildspinnetje
123	61	Ceratinella	brevis	(Wider, 1834)		zwart schildspinnetje
124	61	Ceratinella	scabrosa	(O. P.-Cambridge, 1871)		lepelschildspinnetje
125	61	Cinetata	gradata	(Simon, 1881)	Cineta g.	bultrugje
126	61	Cnephallocotes	obscurus	(Blackwall, 1834)		donker tepelpalpe
127	61	Collinsia	distincta	(Simon, 1884)	1879; Halorates distinctus	stomphoekpalpe
128	61	Collinsia	inerrans	(O. P.-Cambridge, 1885)	1884; Milleriana i.	pionierdwergspin
129	61	Dicymbium	nigrum	(Blackwall, 1834)		donker bolkopje
130	61	Dicymbium	nigrum brevisetosum	Locket, 1962	D. brevisetosum	kortharig bolkopje
131	61	Dicymbium	tibiale	(Blackwall, 1836)		dikpootbolkopje
132	61	Diplocephalus	caecus	Denis, 1952	wijfe niet gekend	blind dubbelkopje
133	61	Diplocephalus	cristatus	(Blackwall, 1833)		gewoon dubbelkopje
134	61	Diplocephalus	latifrons	(O. P.-Cambridge, 1863)		tweeklauwdubbelkopje
135	61	Diplocephalus	lusiscus	(Simon, 1872)		sikkel dubbelkopje
136	61	Diplocephalus	permixtus	(O. P.-Cambridge, 1871)		drieklauwdubbelkopje
137	61	Diplocephalus	picinus	(Blackwall, 1841)		gewoon vals dubbelkopje
138	61	Diplostyla	concolor	(Wider, 1834)		langtongspinnetje
139	61	Dismodicus	bifrons	(Blackwall, 1841)		hoog bolkopje
140	61	Dismodicus	elevatus	(C.L. Koch, 1838)		hoogste bolkopje
141	61	Donacochara	speciosa	(Thorell, 1875)		bleek langpalpe
142	61	Drapetisca	socialis	(Sundevall, 1833)		schorskoloniespin
143	61	Drepanotylus	uncatus	(O. P.-Cambridge, 1873)		haakhangmatspin
144	61	Entelecara	acuminata	(Wider, 1834)		voorkopstruikdwergspin
145	61	Entelecara	congenera	(O. P.-Cambridge, 1879)		bolkopstruikdwergspin
146	61	Entelecara	erythropus	(Westring, 1851)		platkopstruikdwergspin
147	61	Entelecara	flavipes	(Blackwall, 1834)		putkopstruikdwergspin
148	61	Entelecara	omissa	O. P.-Cambridge, 1902	Decleer, 1992	moerasstruikdwergspin
149	61	Erigone	arctica	(White, 1852)		schorredwergspin
150	61	Erigone	atra	Blackwall, 1833	1841	storingsdwergspin
151	61	Erigone	dentipalpis	(Wider, 1834)		auronautje
152	61	Erigone	longipalpis	(Sundevall, 1830)		langpalpstoringsdwergspin
153	61	Erigone	promiscua	(O. P.-Cambridge, 1873)	Hublé, 1988	verwisselbare storingsdwergspin
154	61	Erigonella	hiemalis	(Blackwall, 1841)		putkopruwborstje
155	61	Erigonella	ignobilis	(O. P.-Cambridge, 1871)		bolkopruwborstje
156	61	Erigonoplus	globipes	(L. Koch, 1872)	C.L. Koch	zwelpootje
157	61	Erigonoplus	justus	(O. P.-Cambridge, 1875)		puntkopje
158	61	Floronia	bucculenta	(Clerck, 1757)		prachtpalpe (floronia)
159	61	Formiphantes	leptyphantiiformis	(Strand, 1907)	Lepthyphantes l.	bleek bodemweertje
160	61	Frontinellina	frutetorum	(C.L. Koch, 1834)		dubbelhangmatspin
161	61	Glyphesis	cottonae	(La Touche, 1945)	Baert & al., 1984	dwergbultkopje
162	61	Glyphesis	servulus	(Simon, 1881)		neuskopje (neusdwergspin)
163	61	Gnathonarium	dentatum	(Wider, 1834)		knobbeldwergtandkaak
164	61	Gonatium	rubellum	(Blackwall, 1841)		knobbelpalpe
165	61	Gonatium	rubens	(Blackwall, 1833)		doompalpe
166	61	Gongyliellum	latebricola	(O. P.-Cambridge, 1871)		vingerpalpe
167	61	Gongyliellum	murcidum	Simon, 1884	Decleer, 1986	duimpalpe
168	61	Gongyliellum	vivum	(O. P.-Cambridge, 1875)		nagelpalpe
169	61	Gongylidium	rufipes	(Linnaeus, 1758)	Sundevall, 1829	oranjepoot
170	61	Halorates	reprobis	(O. P.-Cambridge, 1879)		slikkenspinnetje
171	61	Helophora	insignis	(Blackwall, 1841)		breedtongspinnetje
172	61	Hilaira	excisa	(O. P.-Cambridge, 1871)	1870	knobbelrugje
173	61	Hylyphantes	graminicola	(Sundevall, 1830)	1829	lang kurkentrekertje
174	61	Hylyphantes	nigritus	(Simon, 1881)		kort kurkentrekertje
175	61	Hypomma	bituberculatum	(Wider, 1834)		moerasknobbelkopje
176	61	Hypomma	cornutum	(Blackwall, 1833)		bermknobbelkopje
177	61	Hypomma	fulvum	(Bösenberg, 1902)	Bösenberg, 1902	pijpjalpe
178	61	Hypselistes	jacksoni	(O. P.-Cambridge, 1902)		jackson's dubbelkopje

Nr	F	Genus	Soort	Auteur	Opmerkingen en veranderingen	Nederlandse naam
179	61	Incestophantes	crucifer	(Menge, 1866)	Bolyphantes c.	laag voorkopje
180	61	Jacksonella	falconeri	(Jackson, 1908)		simpelpalpje
181	61	Kaestneria	dorsalis	(Wider, 1834)		kortongwevertje
182	61	Kaestneria	pullata	(O. P.-Cambridge, 1863)		variabel wevertje
183	61	Labulla	thoracica	(Wider, 1834)		schaduwhangmatspin
184	61	Lepthyphantes	leprosus	(Ohlert, 1865)		huiswevertje
185	61	Lepthyphantes	minutus	(Blackwall, 1833)		groter bodemwevertje
186	61	Leptorhoptrum	robustum	(Westring, 1851)		donker langpalpje
187	61	Leptothrix	hardyi	(Blackwall, 1850)		pruikspinnetje
188	61	Lessertia	dentichelis	(Simon, 1884)		spiraaldwergtandkaak
189	61	Linyphia	hortensis	Sundevall, 1830	1829	tuinhangmatspin
190	61	Linyphia	tenuipalpis	Simon, 1884		grote heidehangmatspin
191	61	Linyphia	triangularis	(Clerck, 1757)		herfsthangmatspin
192	61	Lophomma	punctatum	(Blackwall, 1841)		perforatie
193	61	Macrargus	carpenteri	(O. P.-Cambridge, 1894)	Janssen, 1986	dennestrooiselspin
194	61	Macrargus	rufus	(Wider, 1834)		winterstrooiselspin
195	61	Maro	lehtineni	Saario, 1971		lehtinen's dwergspin
196	61	Maro	lepidus	Casimir, 1961	1963	geschubde dwergspin
197	61	Maro	minutus	O. P.-Cambridge, 1906		kleinste dwergspin
198	61	Maro	sublestus	Falconer, 1915	De Knijf & al., 1994	zeldzame dwergspin
199	61	Maso	gallicus	Simon, 1894		veerdwergstekelpoot
200	61	Maso	sundevalli	(Westring, 1851)		gewoon dwergstekelpootje
201	61	Megalepthyphantes	nebulosus	(Sundevall, 1830)	Lepthyphantes n.	kielpalpwever
202	61	Meioneta	affinis	(Kulczynski, 1898)	M. beata	concaaf probleemspinnetje
203	61	Meioneta	fuscipalpa	(C.L. Koch, 1836)	Vanuytven, 1992	getand probleemspinnetje
204	61	Meioneta	innotabilis	(O. P.-Cambridge, 1863)		grootoogprobleemspinnetje
205	61	Meioneta	molis	(O. P.-Cambridge, 1871)		slank probleemspinnetje
206	61	Meioneta	rurestris	(C.L. Koch, 1836)		veidprobleemspinnetje
207	61	Meioneta	saxatilis	(Blackwall, 1844)		spits probleemspinnetje
208	61	Meioneta	simplicitarsis	(Simon, 1884)		breed probleemspinnetje
209	61	Metopobactrus	puminulus	(O. P.-Cambridge, 1872)		kalkgrasdwergspin
210	61	Micrargus	apertus	(O. P.-Cambridge, 1871)	Segers, 1988	moerasbosputkopje
211	61	Micrargus	herbigradus	(Blackwall, 1854)		vingerpalpputkopje
212	61	Micrargus	laudatus	(O. P.-Cambridge, 1881)	Baert & al., 1992; Janssen, 1992b	zeldzaam putkopje
213	61	Micrargus	subaequalis	(Westring, 1851)		plat putkopje
214	61	Microctenonyx	subitaneus	(O. P.-Cambridge, 1875)		tuinagroefkopje
215	61	Microlinyphia	impigra	(O. P.-Cambridge, 1871)		zweefhangmatspin
216	61	Microlinyphia	pusilla	(Sundevall, 1830)	1829	kleine heidehangmatspin
217	61	Microneta	viaria	(Blackwall, 1841)		lentestrooiselspin
218	61	Minicia	marginella	(Wider, 1834)		behaard ballonkopje
219	61	Minyriolus	pusillus	(Wider, 1834)		deukkopje
220	61	Mloxena	blanda	(Simon, 1884)		bleek dwergspinnetje
221	61	Moebelia	penicillata	(Westring, 1851)		schorsdwergspin
222	61	Monocephalus	castaneipes	(Simon, 1884)		breed groefkopje
223	61	Monocephalus	fuscipes	(Blackwall, 1836)		smal groefkopje
224	61	Nematogmus	sanguinolentus	(Walckenaer, 1842)	1837	bleek tepelpalpje
225	61	Neriene	clathrata	(Sundevall, 1830)	1829; Linyphia c.	kruidhangmatspin
226	61	Neriene	emphana	(Walckenaer, 1842)	1837; Linyphia e.	zwartstuihangmatspin
227	61	Neriene	furtiva	(O. P.-Cambridge, 1871)	Linyphia f.	steppehangmatspin
228	61	Neriene	hammeni	(van Helsdingen, 1963)	Linyphia h.	van der hammens hangmatspin
229	61	Neriene	montana	(Clerck, 1757)	Linyphia m.	lentehangmatspin
230	61	Neriene	peltata	(Wider, 1834)	Linyphia p.	struikhangmatspin
231	61	Neriene	radiata	(Walckenaer, 1842)	Linyphia marginata	zomerhangmatspin
232	61	Notioscopus	sarcinatus	(O. P.-Cambridge, 1872)		spleetkopje
233	61	Obscuriphantes	obscurus	(Blackwall, 1841)	Lepthyphantes o.	dolkwevertje
234	61	Oedothorax	agrestis	(Blackwall, 1853)		gewone akkerdwergspin
235	61	Oedothorax	apicatus	(Blackwall, 1850)		knobbelakkerdwergspin
236	61	Oedothorax	fuscus	(Blackwall, 1834)		gewone velddwergspin
237	61	Oedothorax	gibbosus	(Blackwall, 1841)	Oe. gibbosus, Oe. tuberosus (var.)	bultvelddwergspin
238	61	Oedothorax	retusus	(Westring, 1851)		bolkopvelddwergspin
239	61	Oreonetides	vaginatus	(Thorell, 1872)		rechthoekhangmatspin
240	61	Oryphantes	angulatus	(O. P.-Cambridge, 1881)	Oryphantes a.	hoogveenbodemwevertje
241	61	Ostearius	melanopygius	(O. P.-Cambridge, 1879)		zwartgatje

Nr	F	Genus	Soort	Auteur	Opmerkingen en veranderingen	Nederlandse naam
242	61	Palliduphantes	ericaeus	(Blackwall, 1853)	Lepthyphantes e.	heidebodemwevertje
243	61	Palliduphantes	insignis	(O. P.-Cambridge, 1913)	Lepthyphantes i.	sikkeibodemwevertje
244	61	Palliduphantes	pallidus	(O. P.-Cambridge, 1871)	Lepthyphantes p.	geknot bodemwevertje
245	61	Panamomops	sulcifrons	(Wider, 1834)		gewoon stierekopje
246	61	Parapelecopsis	nemoralioides	(O. P.-Cambridge, 1884)	Pelecopsis locketi, P. mediocris	gegroeft zusterballonkopje
247	61	Parapelecopsis	nemorali	(Blackwall, 1841)		gegroeft ballonkopje
248	61	Pelecopsis	elongata	(Wider, 1834)		accidentje
249	61	Pelecopsis	parallela	(Wider, 1834)		neusballonkopje
250	61	Pelecopsis	radicicola	(L. Koch, 1872)	1875	bescheiden ballonkopje
251	61	Peponocranium	ludicum	(O. P.-Cambridge, 1861)		heideballonkopje
252	61	Peponocranium	orbiculatum	(O. P.-Cambridge, 1882)	Baert & al., 1992	mosballonkopje
253	61	Pityohyphantes	phrygianus	(C.L. Koch, 1836)		lepelhangmatspin
254	61	Pocadicnemis	juncea	Locket & Millidge, 1953		bleek heidegroefkopje
255	61	Pocadicnemis	pumila	(Blackwall, 1841)		bleek bosgroefkopje
256	61	Pociloneta	variegata	(Blackwall, 1841)	P. globosa	bont wevertje
257	61	Porhomma	campbelli	F.O. P.-Cambridge, 1894		campbells kleinoogje
258	61	Porhomma	convexum	(Westring, 1851)	1861	grondkleinoogje
259	61	Porhomma	egeria	Simon, 1884		kelderkleinoogje
260	61	Porhomma	errans	(Blackwall, 1841)		boskleinoogje
261	61	Porhomma	microphthalmum	(O. P.-Cambridge, 1871)		auronautkleinoogje
262	61	Porhomma	myops	Simon, 1884		bergkleinoogje
263	61	Porhomma	oblitum	(O. P.-Cambridge, 1871)	1870	vergeten kleinoogje
264	61	Porhomma	pallidum	Jackson, 1913		bleek kleinoogje
265	61	Porhomma	pygmaeum	(Blackwall, 1834)		gewoon kleinoogje
266	61	Porhomma	rosenhaueri	(L. Koch, 1872)		grotkleinoogje
267	61	Prinerigone	vagans	(Audouin, 1826)	Erigone v.	moerasdwergspin
268	61	Pseudocarorita	thaleri	(Saaristo, 1971)	Segers & Bosmans, 1988	thalers dwergspin
269	61	Pseudomaro	aenigmaticus	Denis, 1966	mannetje onbekend	feministje
270	61	Saaristoa	abnormis	(Blackwall, 1841)		driepunthangmatspin
271	61	Saaristoa	firma	(O. P.-Cambridge, 1900)	1901	driehoekhangmatspin
272	61	Saloca	diceros	(O. P.-Cambridge, 1871)		gehoord sierkopje (moerasbossierkopje)
273	61	Satlatlas	britteni	(Jackson, 1913)		donker dwergstekelpootje
274	61	Savignia	frontata	Blackwall, 1833	(Blackwall, 1833)	torenkopje
275	61	Silometopus	bonessi	Casimir, 1970		hoogveengroefkopje
276	61	Silometopus	curtus	(Simon, 1881)		elegant putkopje
277	61	Silometopus	elegans	(O. P.-Cambridge, 1872)	1905	elegant groefkopje
278	61	Silometopus	incurvatus	(O. P.-Cambridge, 1873)		oranje heideputkopje
279	61	Silometopus	reussi	(Thorell, 1871)		plat groefkopje
280	61	Sintula	corniger	(Blackwall, 1856)	S. cornigera	hoornpalpje
281	61	Stemonyphantes	lineatus	(Linnaeus, 1758)		paardekopje
282	61	Styloctetor	romanus	(O. P.-Cambridge, 1872)	Ceratinopsis romana	elegant dwergspinnetje
283	61	Styloctetor	stativus	(Simon, 1881)	Ceratinopsis stativa	bosplatkopje
284	61	Syedra	gracilis	(Menge, 1869)	1866	weideplatkopje
285	61	Tallusia	experta	(O. P.-Cambridge, 1871)		wimpelpalpje
286	61	Tapinocyba	biscissa	(O. P.-Cambridge, 1872)		gevoort groefkopje
287	61	Tapinocyba	insecta	(L. Koch, 1869)		bleek weidegroefkopje
288	61	Tapinocyba	pallens	(O. P.-Cambridge, 1872)		bleek mosgroefkopje
289	61	Tapinocyba	praecox	(O. P.-Cambridge, 1873)		puntig groefkopje
290	61	Tapinocyboides	pygmaeus	(Menge, 1869)		dwerggroefkopje
291	61	Tapinopa	longidens	(Wider, 1834)		langtandje
292	61	Taranucnus	setosus	(O. P.-Cambridge, 1863)		sikkelpalpje
293	61	Tenuiphantes	alacris	(Blackwall, 1853)	Lepthyphantes a.	ardennenwevertje
294	61	Tenuiphantes	cristatus	(Menge, 1866)	Lepthyphantes c.	knobbelpalpwevertje
295	61	Tenuiphantes	flavipes	(Blackwall, 1854)	Lepthyphantes f.	zwart wevertje
296	61	Tenuiphantes	mengel	(Kulczynski, 1887)	Lepthyphantes m.	veldwevertje
297	61	Tenuiphantes	tenebricola	(Wider, 1834)	Lepthyphantes t.	schaduwwevertje
298	61	Tenuiphantes	tenuis	(Blackwall, 1852)	Lepthyphantes t.	bodemwevertje
299	61	Tenuiphantes	zimmernanni	(Bertkau, 1890)	Lepthyphantes z.	boswevertje
300	61	Theonina	comix	(Simon, 1881)		dubbelknotsje
301	61	Thyreosthenius	biovatus	(O. P.-Cambridge, 1875)		miergroefkopje
302	61	Thyreosthenius	parasiticus	(Westring, 1851)		bodemgroefkopje
303	61	Tiso	vagans	(Blackwall, 1834)		krulpalpje

Nr	F	Genus	Soort	Auteur	Opmerkingen en veranderingen	Nederlandse naam
304	61	Tmeticus	affinis	(Blackwall, 1855)	1841	wrattenkaakje
305	61	Trematocephalus	cristatus	(Wider, 1834)		doorkijkkopje
306	61	Trichoncus	hackmani	Millidge, 1956	1955	strandcontrastpootje
307	61	Trichoncus	saxicola	(O. P.-Cambridge, 1861)		gevorkt contrastpootje
308	61	Trichopterna	cito	(O. P.-Cambridge, 1872)		stekelloos putkopje
309	61	Trichopterna	thorelli	(Westring, 1861)		harig dubbelkopje
310	61	Troxochrus	nasutus	Schenkel, 1925	Janssen, 1994	neusgroefkopje
311	61	Troxochrus	scabriculus	(Westring, 1851)	T. scabriculus, T. cirriformis (var.)	griendwevertje
312	61	Typhochrestus	digitalis	(O. P.-Cambridge, 1872)		klein wevertje
313	61	Typhochrestus	simoni	Lessert, 1907		getand groefkopje
314	61	Walckenaeria	acuminata	Blackwall, 1833		periskoopspinnetje
315	61	Walckenaeria	aiticeps	(Denis, 1952)	Maelfait & Baert, 1987	gehoemd schaduw dubbelkopje
316	61	Walckenaeria	antica	(Wider, 1834)		duinvoorkopje
317	61	Walckenaeria	atrotibialis	(O. P.-Cambridge, 1878)		gewoon contrastpootje
318	61	Walckenaeria	capito	(Westring, 1861)		bol dubbelkopje
319	61	Walckenaeria	corniculans	(O. P.-Cambridge, 1875)		harig knobbelsierkopje
320	61	Walckenaeria	cucullata	(C.L. Koch, 1836)		dubbelsierkopje
321	61	Walckenaeria	cuspidata	Blackwall, 1833	(Blackwall, 1833)	klein knobbelsierkopje
322	61	Walckenaeria	dysderoides	(Wider, 1834)		wratsierkopje
323	61	Walckenaeria	furcillata	(Menge, 1869)		gespleten doorkijkkopje
324	61	Walckenaeria	incisa	(O. P.-Cambridge, 1871)		oogsierkopje
325	61	Walckenaeria	kochi	(O. P.-Cambridge, 1872)		tweeknopje
326	61	Walckenaeria	mitrata	(Menge, 1868)		mijtertje
327	61	Walckenaeria	monoceros	(Wider, 1834)		kuife
328	61	Walckenaeria	nodosa	O. P.-Cambridge, 1873		bolsierkopje
329	61	Walckenaeria	nudipalpis	(Westring, 1851)		middelste vals sierkopje
330	61	Walckenaeria	obtusa	Blackwall, 1836		groot vals sierkopje
331	61	Walckenaeria	stylifrons	(O. P.-Cambridge, 1875)		plat sierkopje
332	61	Walckenaeria	unicomis	O. P.-Cambridge, 1861		eenhoortje
333	61	Walckenaeria	vigilax	(Blackwall, 1853)	1833	klein vals sierkopje
334	61	Wiehea	calcarifera	(Simon, 1884)		bodemdwergspin
335	62	Meta	menardi	(Latreille, 1804)		gewone grotten spin
336	62	Metellina	mengei	(Blackwall, 1870)	1869	zomerwielweb spin
337	62	Metellina	merianae	(Scopoli, 1763)		holenwielweb spin
338	62	Metellina	segmentata	(Clerck, 1757)		herfst spin
339	62	Pachygnatha	clercki	Sundevall, 1823		grote dikkaak
340	62	Pachygnatha	degeeri	Sundevall, 1830		kleine dikkaak
341	62	Pachygnatha	listeri	Sundevall, 1830		bosdikkaak
342	62	Tetragnatha	dearmata	Thorell, 1873		noordse strek spin
343	62	Tetragnatha	extensa	(Linnaeus, 1758)		gewone strek spin
344	62	Tetragnatha	montana	Simon, 1874		schaduw strek spin
345	62	Tetragnatha	nigrita	Lendl, 1886		donkere strek spin
346	62	Tetragnatha	obtusa	C.L. Koch, 1837		droogtestrek spin
347	62	Tetragnatha	pinicola	L. Koch, 1870		dennen strek spin
348	62	Tetragnatha	reimoseri	(Rosca, 1939)	Janssen, 1994	staart strek spin
349	62	Tetragnatha	striata	L. Koch, 1862	Decler, 1988	riet strek spin
350	63	Aculepeira	ceropegia	(Walckenaer, 1802)	A. ceropegius	eikenblad spin
351	63	Agalenatea	redii	(Scopoli, 1763)		brede wielweb spin
352	63	Araneus	alsine	(Walckenaer, 1802)		sinaasappel spin
353	63	Araneus	angulatus	Clerck, 1757		schouder kruis spin
354	63	Araneus	diadematus	Clerck, 1757		kruis spin
355	63	Araneus	marmoreus	Clerck, 1757		marmerspin
356	63	Araneus	quadratus	Clerck, 1757		viervlek wielweb spin
357	63	Araneus	sturni	(Hahn, 1831)	Atea s.	witruit wielweb spin
358	63	Araneus	triguttatus	(Fabricius, 1793)	1757; Atea t.	drievlek wielweb spin
359	63	Araniella	alpica	(L. Koch, 1869)		dennen komkommerspin
360	63	Araniella	cucurbitina	(Clerck, 1757)		gewone komkommerspin
361	63	Araniella	displicata	(Hentz, 1847)		bonte komkommerspin
362	63	Araniella	inconspicua	(Simon, 1874)		stippelloze komkommerspin
363	63	Araniella	opisthographa	(Kulczynski, 1905)	A. opisthographa	tweeling komkommerspin
364	63	Araniella	proxima	(Kulczynski, 1885)		noordse komkommerspin
365	63	Argiope	bruennichi	(Scopoli, 1772)		tijgerspin (wesp spin)
366	63	Cercidia	prominens	(Westring, 1851)		stekel rugje
367	63	Cyclosa	conica	(Pallas, 1772)		kegelspin

Nr	F	Genus	Soort	Auteur	Opmerkingen en veranderingen	Nederlandse naam
368	63	Cyclosa	oculata	(Walckenaer, 1802)	Latouche, 1846	zesknobbelspin
369	63	Gibbaranea	bituberculata	(Walckenaer, 1802)		struikknobbelspin
370	63	Gibbaranea	gibbosa	(Walckenaer, 1802)		boomknobbelspin
371	63	Hypsosinga	albivittata	(Westring, 1851)		witvlekpyjamaspin
372	63	Hypsosinga	heri	(Hahn, 1831)		moeraspyjamaspin
373	63	Hypsosinga	pygmaea	(Sundevall, 1831)		graspyjamaspin
374	63	Hypsosinga	sanguinea	(C.L. Koch, 1844)		heidepyjamaspin
375	63	Larinioides	cornutus	(Clerck, 1757)		rietkruisspin
376	63	Larinioides	patagiatus	(Clerck, 1757)		vale wielwebspin
377	63	Larinioides	sclopetarius	(Clerck, 1757)		brugspin
378	63	Mangora	acalypha	(Walckenaer, 1802)		driestreepspin
379	63	Neoscona	adianta	(Walckenaer, 1802)		heidewielwebspin
380	63	Nuctenea	umbratica	(Clerck, 1757)		platte wielwebspin
381	63	Singa	hamata	(Clerck, 1757)		bonte pyjamaspin
382	63	Singa	nitidula	C.L. Koch, 1844	1845	beekpyjamaspin
383	63	Zilla	diodia	(Walckenaer, 1802)		maskerspinnetje
384	63	Zygiella	atrica	(C.L. Koch, 1845)	ex Metidae	struiksectorspin
385	63	Zygiella	stroemi	(Thorell, 1870)	ex Metidae	boomsectorspin
386	63	Zygiella	x-notata	(Clerck, 1757)	ex Metidae	venstersectorspin
387	64	Alopecosa	accentuata	(Latreille, 1817)		pinksterpanterspin
388	64	Alopecosa	barbipes	(Sundevall, 1833)	Alderweireldt & Maelfait, 1993	paaspanterspin
389	64	Alopecosa	cuneata	(Clerck, 1757)		dikpootpanterspin
390	64	Alopecosa	cursor	(Hahn, 1831)		zandpanterspin
391	64	Alopecosa	fabrilis	(Clerck, 1757)		grote panterspin
392	64	Alopecosa	inquilina	(Clerck, 1757)		bergpanterspin
393	64	Alopecosa	pulverulenta	(Clerck, 1757)		gewone panterspin
394	64	Alopecosa	striatipes	(C.L. Koch, 1839)	1837	streeppootpanterspin
395	64	Alopecosa	trabalis	(Clerck, 1757)	1758	geelborstpanterspin
396	64	Arctosa	cinerea	(Fabricius, 1777)		grindwolfspin
397	64	Arctosa	figurata	(Simon, 1876)		grote zandwolfspin
398	64	Arctosa	leopardus	(Sundevall, 1833)		moswolfspin
399	64	Arctosa	lutetiana	(Simon, 1876)	Tricca I.	leliewolfspin
400	64	Arctosa	perita	(Latreille, 1799)		gewone zandwolfspin
401	64	Aulonia	albimana	(Walckenaer, 1805)		withandje
402	64	Hygrolycosa	rubrofasciata	(Ohlert, 1865)		trommelwolfspin
403	64	Pardosa	agrestis	(Westring, 1861)		steenwolfspin
404	64	Pardosa	agrestis purbeckensis	F.O. P.-Cambridge, 1895	P. purbeckensis	schorrewolfspin
405	64	Pardosa	agricola	(Thorell, 1856)		ruigtwolfspin
406	64	Pardosa	alacris	(C.L. Koch, 1833)	Alderweireldt & Maelfait, 1993; P. pseudolugubris	roodpolsbosspin
407	64	Pardosa	amentata	(Clerck, 1757)		tuinwolfspin
408	64	Pardosa	bifasciata	(C.L. Koch, 1834)		gestreepte wolfspin
409	64	Pardosa	hortensis	(Thorell, 1872)		geelampje
410	64	Pardosa	lugubris	(Walckenaer, 1802)		zwartstaartboswolfspin
411	64	Pardosa	monticola	(Clerck, 1757)		duinwolfspin
412	64	Pardosa	nigriceps	(Thorell, 1856)		graswolfspin
413	64	Pardosa	oreophila	Simon, 1937		bergwolfspin
414	64	Pardosa	paludicola	(Clerck, 1757)		veenwolfspin
415	64	Pardosa	palustris	(Linnaeus, 1758)		moeraswolfspin
416	64	Pardosa	pratigaga	(L. Koch, 1870)		oeverwolfspin
417	64	Pardosa	proxima	(C.L. Koch, 1847)		veldwolfspin
418	64	Pardosa	pullata	(Clerck, 1757)		gewone wolfspin
419	64	Pardosa	saltans	Töpfer-Hofmann, 2000	Hendrickx & al., 2001	zwarthandboswolfspin
420	64	Pardosa	sphagnicola	(Dahl, 1908)		veenmoswolfspin
421	64	Pirata	hygrophilus	Thorell, 1872		bospiraat
422	64	Pirata	knorri	(Scopoli, 1763)		beekpiraat
423	64	Pirata	latitans	(Blackwall, 1841)		kleine piraat
424	64	Pirata	piraticus	(Clerck, 1757)		poelpiraat
425	64	Pirata	piscatorius	(Clerck, 1757)		grote piraat
426	64	Pirata	tenutarsis	Simon, 1876		veenpiraat
427	64	Pirata	uliginosus	(Thorell, 1856)	1872	heidepiraat
428	64	Trochosa	robusta	(Simon, 1876)		grote nachtwolfspin
429	64	Trochosa	ruricola	(De Geer, 1778)		veldnachtwolfspin

Nr	F	Genus	Soort	Auteur	Opmerkingen en veranderingen	Nederlandse naam
430	64	Trochosa	spinipalpis	(F.O. P.-Cambridge, 1895)		gestekelde nachtwolfspin
431	64	Trochosa	terricola	Thorell, 1856		gewone nachtwolfspin
432	64	Xerolycosa	miniata	(C.L. Koch, 1834)		duinwolfspin (kustwolfspin)
433	64	Xerolycosa	nemorialis	(Westring, 1861)		steppewolfspin (bosrandwolfspin)
434	66	Dolomedes	fimbriatus	(Clerck, 1757)		gerande oeverspin
435	66	Dolomedes	plantarius	(Clerck, 1757)		grote oeverspin
436	66	Pisaura	mirabilis	(Clerck, 1757)		kraamwebspin (grote wolfspin)
437	67	Oxyopes	heterophthalmus	(Latreille, 1804)	Latreille, 1804	gewone lynxspin (gutspalplynxspin)
438	67	Oxyopes	lineatus	Latreille, 1806		gestreepte lynxspin
439	67	Oxyopes	ramosus	(Martini & Goeze, 1778)	(Panzer, 1804)	prachtlynxspin
440	75	Agelena	gracilens	C.L. Koch, 1841		kleine doolhofspin
441	75	Agelena	labyrinthica	(Clerck, 1757)		gewone labyrinthspin
442	75	Histoipona	torpida	(C.L. Koch, 1837)	1834	slanke bostrechterspin
443	75	Tegenaria	agrestis	(Walckenaer, 1802)		veldrechterspin
444	75	Tegenaria	atrica	C.L. Koch, 1843		gewone huisspin
445	75	Tegenaria	domestica	(Clerck, 1757)		grijze huisspin
446	75	Tegenaria	ferruginea	(Panzer, 1804)		bonte rechterspin
447	75	Tegenaria	pagana	C.L. Koch, 1840	1841	zuidelijke huisspin
448	75	Tegenaria	parietina	(Fourcroy, 1785)		grote huisspin
449	75	Tegenaria	picta	Simon, 1870		spiraaltrechterspin
450	75	Tegenaria	saeva	Blackwall, 1844	Van Keer & Van Keer, 1992	blackwalls huisspin
451	75	Tegenaria	silvestris	L. Koch, 1872		steentrechterspin
452	75	Textrix	caudata	L. Koch, 1872		zwarte staartspin
453	75	Textrix	denticulata	(Olivier, 1789)		gewone staartspin
454	76	Argyroneta	aquatica	(Clerck, 1757)		waterspin
455	81	Antistea	elegans	(Blackwall, 1841)		moeraskamstaartje
456	81	Cryphoea	silvicola	(C.L. Koch, 1834)	ex Agelenidae	kleine bostrechterspin
457	81	Hahnina	candida	Simon, 1875		klein kamstaartje
458	81	Hahnina	helveola	Simon, 1875		boskamstaartje
459	81	Hahnina	montana	(Blackwall, 1841)		gewoon kamstaartje
460	81	Hahnina	nava	(Blackwall, 1841)		heidekamstaartje
461	81	Hahnina	ononidum	Simon, 1875		kwastpalpkamstaartje
462	81	Hahnina	pusilla	C.L. Koch, 1841		kleinste kamstaartje
463	81	Tuberta	maerens	(O. P.-Cambridge, 1863)	De Bakker & Baert, 1999	schroefpalpspin
464	82	Altella	lucida	(Simon, 1874)		steepekaardertje
465	82	Argenna	patula	(Simon, 1874)		kwelderkaardertje
466	82	Argenna	subnigra	(O. P.-Cambridge, 1861)		bodemkaardertje
467	82	Cicurina	cicur	(Fabricius, 1793)		herfststrooiselspin
468	82	Dictyna	arundinacea	(Linnaeus, 1758)		heidekaardertje
469	82	Dictyna	civica	(Lucas, 1850)	1849	wandkaardertje
470	82	Dictyna	latens	(Fabricius, 1775)		zwart kaardertje
471	82	Dictyna	major	Menge, 1869	Van Keer, 1991	noords kaardertje
472	82	Dictyna	pusilla	Thorell, 1856		bruin kaardertje
473	82	Dictyna	uncinata	Thorell, 1856		struikkaardertje
474	82	Lathys	humilis	(Blackwall, 1855)		dennenkaardertje
475	82	Lathys	stigmatisata	(Menge, 1869)		kurkentrekkaardertje
476	82	Mastigusa	arietina	(Thorell, 1871)	ex Agelenidae	kleinoogzweppalpspin
477	82	Mastigusa	macrophthalma	(Kulczynski, 1897)	Tuberta m.	grootoogzweppalpspin
478	82	Nigma	flavescens	(Walckenaer, 1830)	1825	geel kaardertje
479	82	Nigma	walckenaeri	(Roewer, 1951)		groen kaardertje
480	83	Amaurobius	fenestralis	(Ström, 1768)		huiskaardespinn
481	83	Amaurobius	ferox	(Walckenaer, 1830)	1825	grote kaardespinn
482	83	Amaurobius	similis	(Blackwall, 1861)		muurkaardespinn
483	83	Callobius	claustrarius	(Hahn, 1833)	1831; Amaurobius	boskaardespinn
484	83	Coelotes	inermis	(L. Koch, 1855)		leemtrechterspin
485	83	Coelotes	terrestris	(Wider, 1834)		gewone bostrechterspin
486	85	Titanoeca	quadriguttata	(Hahn, 1833)	T. obscura	rotskaardespinn
487	88	Cheiracanthium	erraticum	(Walckenaer, 1802)	C.: alle ex Clubionidae	heidespoorspin
488	88	Cheiracanthium	montanum	L. Koch, 1877	(L. Koch, 1877)	boomspoorspin
489	88	Cheiracanthium	pennyi	O. P.-Cambridge, 1873		penny's spoorspin
490	88	Cheiracanthium	punctorium	(Villers, 1789)		grote spoorspin
491	88	Cheiracanthium	virescens	(Sundevall, 1833)		groene spoorspin
492	89	Anyphaena	accentuata	(Walckenaer, 1802)		struikspinn

Nr	F	Genus	Soort	Auteur	Opmerkingen en veranderingen	Nederlandse naam
493	90	Agracina	lineata	(Simon, 1878)	Janssen, 1994	zuidelijke lantaarnspin
494	90	Agroeca	brunnea	(Blackwall, 1833)		grote lantaarnspin
495	90	Agroeca	cuprea	Menge, 1873		gouden lantaarnspin
496	90	Agroeca	dentigera	Kulczyn'ski, 1913		dopheilantaarnspin
497	90	Agroeca	inopina	O. P.-Cambridge, 1886	Baert & Desender, 1993	donkere lantaarnspin
498	90	Agroeca	lusatica	(L. Koch, 1875)		duinlantaarnspin
499	90	Agroeca	proxima	(O. P.-Cambridge, 1871)		heidellantaarnspin
500	90	Apostenus	fuscus	Westring, 1851		mossluiper
501	90	Liocranoeca	striata	(Kulczyn'ski, 1882)	Agroeca s.	gestreepte lantaarnspin
502	90	Liocranum	rupicola	(Walckenaer, 1830)	1825	bonte steensluiper
503	90	Phrurolithus	festivus	(C.L. Koch, 1835)		bonte fruroliet
504	90	Phrurolithus	minimus	C.L. Koch, 1839		kleine fruroliet
505	90	Scotina	celans	(Blackwall, 1841)		bonte bodemzakspin
506	90	Scotina	gracilipes	(Blackwall, 1859)		langpootbodemzakspin
507	91	Clubiona	brevipes	Blackwall, 1841		eikenzakspin
508	91	Clubiona	caerulescens	L. Koch, 1867	C. caerulescens	glanzende zakspin
509	91	Clubiona	compta	C.L. Koch, 1839	C. compta	bonte zakspin
510	91	Clubiona	corticalis	(Walckenaer, 1802)		schorszakspin
511	91	Clubiona	diversa	O. P.-Cambridge, 1862		vale zakspin
512	91	Clubiona	frisia	Wunderlich & Schuett, 1995	C. similis	beekzakspin
513	91	Clubiona	frutetorum	L. Koch, 1867		struweelzakspin
514	91	Clubiona	genevensis	L. Koch, 1866	1867	graszakspin
515	91	Clubiona	germanica	Thorell, 1871	1872	duitse zakspin
516	91	Clubiona	juvenis	Simon, 1878	Decler, 1986	zeggezakspin
517	91	Clubiona	lutescens	Westring, 1851		grienzakspin
518	91	Clubiona	neglecta	O. P.-Cambridge, 1862		kortkaakzakspin
519	91	Clubiona	pallidula	(Clerck, 1757)		boomzakspin
520	91	Clubiona	phragmitis	C.L. Koch, 1843		rietzakspin
521	91	Clubiona	pseudoneglecta	Wunderlich, 1994	Janssen & Bonte, 1998	langkaakzakspin
522	91	Clubiona	reclusa	O. P.-Cambridge, 1863		zompzakspin
523	91	Clubiona	stagnatilis	Kulczyn'ski, 1897		moeraszakspin
524	91	Clubiona	subsultans	Thorell, 1875		dennenzakspin
525	91	Clubiona	subtilis	L. Koch, 1867		kleine zakspin
526	91	Clubiona	terrestris	Westring, 1851	1862	gewone zakspin
527	91	Clubiona	trivialis	C.L. Koch, 1843	1841	moszakspin
528	93	Zodariion	italicum	(Canestrini, 1868)	Z. gallicum, Z. italicum	oranje mierenjager
529	93	Zodariion	rubidum	Simon, 1914	Z. r. (Simon, 1914)	sepia mierenjager
530	102	Arboricaria	subopaca	(Westring, 1861)	Micaria s.	boomstammierspin
531	102	Callilepis	nocturna	(Linnaeus, 1758)		mierendief
532	102	Drassodes	cupreus	(Blackwall, 1834)		gewone muisspin
533	102	Drassodes	hypocrita	(Simon, 1878)		gekke muisspin
534	102	Drassodes	lapidosus	(Walckenaer, 1802)		rotsmuisspin
535	102	Drassodes	pubescens	(Thorell, 1855)		harige muisspin
536	102	Drassyllus	lutetianus	(L. Koch, 1866)		moeraskampoot
537	102	Drassyllus	praeficus	(L. Koch, 1866)		zonnekampoot
538	102	Drassyllus	pumilus	(C.L. Koch, 1839)		moskampoot
539	102	Drassyllus	pusillus	(C.L. Koch, 1833)		kleine kampoot
540	102	Drassyllus	villicus	(Thorell, 1875)	Zelotes v.	gedekte kampoot
541	102	Gnaphosa	leporina	(L. Koch, 1866)		helderichelkaak
542	102	Gnaphosa	lucifuga	(Walckenaer, 1802)		nachtrichelkaak
543	102	Gnaphosa	lugubris	(C.L. Koch, 1839)		stepperichelkaak
544	102	Gnaphosa	nigerrima	L. Koch, 1877	Janssen, 1987a	moerasrichelkaak
545	102	Gnaphosa	opaca	Herman, 1879	Janssen, 1994	kleine richelkaak
546	102	Haplodrassus	dalmatensis	(L. Koch, 1866)		gestreepte muisspin
547	102	Haplodrassus	kulczynskii	Lohmander, 1942		steppemuisspin
548	102	Haplodrassus	moderatus	(Kulczyn'ski, 1897)	Noordam, 1993	veenmuisspin
549	102	Haplodrassus	signifer	(C.L. Koch, 1839)		heldemuisspin
550	102	Haplodrassus	silvestris	(Blackwall, 1833)		bosmuisspin
551	102	Haplodrassus	umbratilis	(L. Koch, 1866)		zandmuisspin
552	102	Micaria	albivittata	(Lucas, 1846)	M. romana	prachtmierspin
553	102	Micaria	dives	(Lucas, 1846)		bosmierspin
554	102	Micaria	formicaria	(Sundevall, 1831)	1832	steppemierspin
555	102	Micaria	fulgens	(Walckenaer, 1802)		gewone mierspin
556	102	Micaria	guttulata	(C.L. Koch, 1839)		zuidelijke mierspin

Nr	F	Genus	Soort	Auteur	Opmerkingen en veranderingen	Nederlandse naam
557	102	Micaria	pulicaria	(Sundevall, 1831)		zandmierspin
558	102	Micaria	silesiaca	L. Koch, 1875		europese mierspin
559	102	Phaeocedus	braccatus	(L. Koch, 1866)		zesvlekmuis spin
560	102	Poecilochroa	conspicua	(L. Koch, 1866)	1867	viervlekmuis spin
561	102	Poecilochroa	variana	(C.L. Koch, 1839)		gebandeerde muis spin
562	102	Scotophaeus	blackwalli	(Thorell, 1871)	1873	stalmuursluiper
563	102	Scotophaeus	scutulatus	(L. Koch, 1866)		huismuursluiper
564	102	Trachyzelotes	pedestris	(C.L. Koch, 1837)	1839	stekelkaakkampoot
565	102	Zelotes	aeneus	(Simon, 1878)	Maelfait & al., 1988	rotskampoot
566	102	Zelotes	apricorum	(L. Koch, 1876)		graskampoot
567	102	Zelotes	electus	(C.L. Koch, 1839)		duinkampoot
568	102	Zelotes	erebeus	(Thorell, 1871)		herfstkampoot
569	102	Zelotes	latreillei	(Simon, 1878)		latreille's kampoot
570	102	Zelotes	longipes	(L. Koch, 1866)	Z. serotinus	stekelkampoot
571	102	Zelotes	petrensis	(C.L. Koch, 1839)		steppekampoot
572	102	Zelotes	pseudoclivicola	Grimm, 1982	Janssen, 1988	grimm's tandpoot
573	102	Zelotes	subterraneus	(C.L. Koch, 1833)		noordse kampoot
574	103	Zora	nemoralis	(Blackwall, 1861)		donkere stekelpoot
575	103	Zora	silvestris	Kulczyn'ski, 1897		bosstekelpoot
576	103	Zora	spinimana	(Sundevall, 1833)		gewone stekelpoot
577	105	Micrommata	virescens	(Clerck, 1757)		groene jachtspin
578	106	Philodromus	albidus	Kulczyn'ski, 1911	Segers, 1989	bleke rens spin
579	106	Philodromus	aureolus	(Clerck, 1757)		tuinrens spin
580	106	Philodromus	buxi	Simon, 1884		buxusrens spin
581	106	Philodromus	caespitum	(Walckenaer, 1802)		gewone rens spin
582	106	Philodromus	collinus	C.L. Koch, 1835		dennenrens spin
583	106	Philodromus	dispar	Walckenaer, 1826	1825	zwartrugrens spin
584	106	Philodromus	emarginatus	(Schrank, 1803)		grauwe rens spin
585	106	Philodromus	fallax	Sundevall, 1833		kustrens spin
586	106	Philodromus	histrio	(Latreille, 1819)		heiderens spin
587	106	Philodromus	margaritatus	(Clerck, 1757)		korstmoss spin
588	106	Philodromus	praedatus	O. P.-Cambridge, 1871	Segers, 1987	boomrens spin
589	106	Philodromus	rufus	Walckenaer, 1826	1825	bonte rens spin
590	106	Thanatus	arenarius	L. Koch, 1872	Thorell, 1872	zandrens spin
591	106	Thanatus	formicinus	(Clerck, 1757)		grote rens spin
592	106	Thanatus	striatus	C.L. Koch, 1845		duinrens spin
593	106	Tibellus	maritimus	(Menge, 1875)		stippelspiet spin
594	106	Tibellus	oblongus	(Walckenaer, 1802)		gewone spiet spin
595	107	Coriarachne	depressa	(C.L. Koch, 1837)		platte krab spin
596	107	Diaea	dorsata	(Fabricius, 1777)		groene krab spin
597	107	Heriades	graminicola	(Doleschall, 1852)	H. hirtus	haarkrab spin
598	107	Misumena	vatica	(Clerck, 1757)		gewone kameleons spin
599	107	Misumenops	tricuspidatus	(Fabricius, 1775)		struikkameleons spin
600	107	Ozyptila	atomaria	(Panzer, 1801)	Gans genus: Oxyptila	grote bodemkrab spin
601	107	Ozyptila	blackwalli	Simon, 1875		middenstreepbodemkrab spin
602	107	Ozyptila	brevipes	(Hahn, 1826)	1831	witrugbodemkrab spin
603	107	Ozyptila	clavata	(Walckenaer, 1837)	O. nigrita	zwarte bodemkrab spin
604	107	Ozyptila	pratensis	(C.L. Koch, 1837)		gewone bodemkrab spin
605	107	Ozyptila	pullata	(Thorell, 1875)	Janssen, 1992	kalkbodem spin
606	107	Ozyptila	sanctuarina	(O. P.-Cambridge, 1871)		bleke bodemkrab spin
607	107	Ozyptila	scabricula	(Westring, 1851)		mierbodemkrab spin
608	107	Ozyptila	simplex	(O. P.-Cambridge, 1862)		bonte bodemkrab spin
609	107	Ozyptila	trux	(Blackwall, 1846)		grasbodemkrab spin
610	107	Pistius	truncatus	(Pallas, 1772)		stompe krab spin
611	107	Synema	globosum	(Fabricius, 1775)	Synaema g.	blinkende krab spin
612	107	Thomisus	onustus	Walckenaer, 1805	1806	bloemkrab spin
613	107	Tmarus	piger	(Walckenaer, 1802)		schorskrab spin
614	107	Xysticus	acerbus	Thorell, 1872		heidekrab spin
615	107	Xysticus	audax	(Schrank, 1803)	Segers & Pollet, 1988	tweelingkrab spin
616	107	Xysticus	bifasciatus	C.L. Koch, 1837		steppekrab spin
617	107	Xysticus	cristatus	(Clerck, 1757)		gewone krab spin
618	107	Xysticus	erraticus	(Blackwall, 1834)		graskrab spin
619	107	Xysticus	ferrugineus	Menge, 1876		roestkrab spin
620	107	Xysticus	kempeleni	Thorell, 1872	X. kempelini	kempelini's krab spin
621	107	Xysticus	kochi	Thorell, 1872		kochs krab spin

Nr	F	Genus	Soort	Auteur	Opmerkingen en veranderingen	Nederlandse naam
622	107	Xysticus	lanio	C.L. Koch, 1835	1824	boskrabspin
623	107	Xysticus	lineatus	(Westring, 1851)	1951	gestreepte krabspin
624	107	Xysticus	luctator	L. Koch, 1870		cambridges krabspin
625	107	Xysticus	luctuosus	(Blackwall, 1836)		woudkrabspin
626	107	Xysticus	ninnii	Thorell, 1872	Janssen & Bonte, 1998	duinkrabspin
627	107	Xysticus	robustus	(Hahn, 1832)		steenkrabspin
628	107	Xysticus	sabulosus	(Hahn, 1832)		zandkrabspin
629	107	Xysticus	striatipes	L. Koch, 1870	(L. Koch, 1870)	renkrabspin
630	107	Xysticus	ulmi	(Hahn, 1831)	1832	moeraskrabspin
631	108	Aelurillus	v-insignitus	(Clerck, 1757)		v-viekspringspin
632	108	Ballus	chalybeius	(Walckenaer, 1802)	B. depressus	eikenpringspin
633	108	Dendryphantus	rudis	(Sundevall, 1833)		glanzende dennenspringer
634	108	Euophrys	frontalis	(Walckenaer, 1802)		gewone zwartkop(springspin)
635	108	Evarcha	arcuata	(Clerck, 1757)		bonte grasspringspin
636	108	Evarcha	falcata	(Clerck, 1757)		bonte springspin
637	108	Evarcha	laetabunda	(C.L. Koch, 1846)	1848	zeldzame grasspringspin
638	108	Heliophanus	aeneus	(Hahn, 1832)	1834	rechte blinker
639	108	Heliophanus	auratus	C.L. Koch, 1835		moerasbinker
640	108	Heliophanus	cupreus	(Walckenaer, 1802)		gehaakte blinker
641	108	Heliophanus	dampfi	Schenkel, 1923		hoogveenbinker
642	108	Heliophanus	dubius	C.L. Koch, 1835	1834	gevekte blinker
643	108	Heliophanus	flavipes	(Hahn, 1832)		gewone blinker
644	108	Heliophanus	tribulosus	Simon, 1868		driepuntsbinker
645	108	Leptorchestes	berolinensis	(C.L. Koch, 1846)		grote mierspringspin
646	108	Macaroeris	nidicolens	(Walckenaer, 1802)	Dendryphantus n.	ovale dennenspringer
647	108	Marpissa	muscosa	(Clerck, 1757)		schorsmarpissa
648	108	Marpissa	nivoyi	(Lucas, 1846)		helmmarpissa
649	108	Marpissa	pomatia	(Walckenaer, 1802)		goudbandmarpissa
650	108	Marpissa	radiata	(Grube, 1859)		rietmarpissa
651	108	Myrmarachne	formicaria	(De Geer, 1778)		bosmierspringspin
652	108	Neon	rayi	(Simon, 1875)		ray's neon
653	108	Neon	reticulatus	(Blackwall, 1853)		gewone neon
654	108	Neon	valentulus	Falconer, 1912	Janssen, 1987b	donkere neon
655	108	Pellenes	tripunctatus	(Walckenaer, 1802)		driepuntspringspin
656	108	Phlegra	fasciata	(Hahn, 1826)		gestreepte springspin
657	108	Pseudeuophrys	erratica	(Walckenaer, 1826)	Euophrys e.	bruine zwartkop
658	108	Pseudeuophrys	lanigera	(Simon, 1871)	Euophrys l.	huisspringspin
659	108	Pseudiculus	encarpatus	(Walckenaer, 1802)	1803	sjirpspringspin
660	108	Salticus	cingulatus	(Panzer, 1797)		boomzebraspin
661	108	Salticus	scenicus	(Clerck, 1757)		huiszebraspin, harlekijn
662	108	Salticus	zebraneus	(C.L. Koch, 1837)		schorszebraspin
663	108	Sibianor	aurocinctus	(Ohlert, 1865)	B. aurocinctus	dikpootspringspin
664	108	Sitticus	caricis	(Westring, 1861)		muisspringspin
665	108	Sitticus	distinguendus	(Simon, 1868)	Attulus helveolus	gevekte moeraspringer
666	108	Sitticus	floricola	(C.L. Koch, 1837)		kustspringspin
667	108	Sitticus	pubescens	(Fabricius, 1775)		harige springspin
668	108	Sitticus	saltator	(O. P.-Cambridge, 1868)	Attulus s. (Simon, 1868)	zandspringspin
669	108	Synageles	hilarulus	(C.L. Koch, 1846)		kleine mierspringspin
670	108	Synageles	venator	(Lucas, 1836)		slanke mierspringspin
671	108	Talavera	aequipes	(O. P.-Cambridge, 1871)	Euophrys ae.	ringpootzwartkop
672	108	Talavera	aperta	(Miller, 1971)	Vanuytven, 1995	zwartlijfzwartkop
673	108	Talavera	petrensis	(C.L. Koch, 1837)	Euophrys p.	bergspringspin

In België gemelde soorten maar met onvolledige verspreidingsgegevens. Nadere gegevens moeten nog worden gepubliceerd.

674	34	Harpactea	rubicunda	(C.L. Koch, 1838)	AMINAL, 2000a	grote celspin
675	61	Eperigone	trilobata	(Emerton, 1882)	AMINAL, 2000b	drielobbege Amerikaanse dwergspin
676	61	Porrothoma	microcavense	Wunderlich, 1990	AMINAL, 2000a	molkeinoogje
677	103	Zora	parallela	Simon, 1878	AMINAL, 2000b	gestreepte stekelpoot
678	106	Philodromus	longipalpis	Simon, 1870	Van Dijk & al., 2001	langpalprensipin
679	107	Ozyptila	rauda	Simon, 1875	Roberts, 1998	bergbodemkrabspin

Nr	F	Genus	Soort	Auteur	Opmerkingen en veranderingen	Nederlandse naam
Ingevoerde soorten, bij ons alleen binnenshuis voorkomend						
	28	Spermophora	senoculata	(Dugès, 1836)	Vanuytven, 2000	kogeltrispin
	51	Uloborus	plumipes	Lucas, 1846	Segers, 1986	kaskaardespinn
	55	Achaearanea	veruculata	(Urquhart, 1885)	Van Keer, 1992	australische kogelspin
	55	Latrodectus	hasselti	Thorell, 1870		redback
	61	Eperigone	eschatologica	(Crosby, 1924)	Bosmans & Vanuytven, 1998	amerikaanse kasdwergspin
	108	Evarcha	jucunda	(Lucas, 1846)	Alderweireldt, 1996; ingevoerd?	mediterrane grasspin
	108	Hasarius	adansoni	(Audouin, 1826)	H. a. (Savigny & Audouin, 1827)	kasspringspin

Soorten afgevoerd van de Belgische lijst

	61	Diplocephalus	connatus	Bertkau, 1889	Baert, 1994	
	93	Zodarion	gallicum	Simon, 1884	Bosmans, 1988	
	91	Clubiona	similis	L. Koch, 1867	Bij ons enkel C. frisia	
	61	Bathypantes	vittiger	Simon, 1884	Deze publicatie	
	61	Lepthyphantes	simoni	(Kulczyn'ski, 1894)	Deze publicatie	
	61	Lepthyphantes	mughi	(Fickert, 1875)	Deze publicatie	
	83	Amaurobius	erberi	(Keyserling, 1863)	Deze publicatie	
	76	Cybaeus	angustiarum	L. Koch, 1868	Deze publicatie	
	106	Philodromus	poecilus	Thorell, 1872	Deze publicatie	
	108	Asianellus	festivus	(C.L. Koch, 1834)	Deze publicatie	

Gemeld maar onvoldoende bewijsmateriaal

	61	Porrhomma	montanum	Jackson, 1913		
	83	Coelotes	atropos	(Walckenaer, 1830)		
	67	Oxyopes	nigripalpis	Kulczyn'ski, 1891		

V.Z.W. ARABEL/ARABEL a.s.b.l.

Richtlijnen aan de auteurs:

Manuscripten bij voorkeur opgesteld in het Nederlands of het Frans, opsturen naar:

Redactie Nieuwsbrief ARABEL, p/a Universiteit Gent, Laboratorium voor Dierenecologie,
Zoögeografie en Natuurbehoud, K.L. Ledeganckstraat 35, B-9000 Gent
(e-mail: frederick.hendrickx@rug.ac.be)

Probeer de tekst op-diskette of via e-mail binnen te leveren (WORD-format)

Recommandations aux auteurs:

Les manuscrits, rédigés de préférence en français ou en néerlandais, sont à envoyer à :
Rédaction Feuille de Contact ARABEL, p/a Universiteit Gent, Laboratorium voor
Dierenecologie, Zoögeografie en Natuurbehoud, K.L. Ledeganckstraat 35, B-9000 Gent
(e-mail: frederick.hendrickx@rug.ac.be)

Envoyez si possible une version du manuscrit sur disquette ou par e-mail

WEBSITE : <http://allserv.rug.ac.be/~sgurdebe/Arabel/index.html>

Inhoud-Sommaire

Speciale editie van de Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging

R. BOSMANS & H. VANUYTVEN

Een herziene soortenlijst van de Belgische Spinnen (Araneae).....44-80

(D. Bonte & F. Hendrickx, Eds. 12-2001)